

Catalogo de los Tenebrionidae (Coleoptera) de Chile.

Luis E. Peña G.

Research Associate in Zoology
Peabody Museum of Natural History
at Yale University

En el »Catálogo de los Coleópteros de Chile« de don Federico Philippi, publicado en los Anales de la Universidad de Chile en el año 1887, aparecen como del país la cantidad de 168 especies de Tenebrionidae. Posteriormente, en la „Check List of Coleopterous Insects of Mexico, Central America, The West Indies and South America“, del Dr. Richard E. Blackwelder, publicado por el United States National Museum en el año 1945, el número aumenta a 241 especies y que más o menos corresponde al „Katalog der Tenebrioniden (Col. Heteromera)“ de Hans Gebien, publicado en el Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 1938/1944 y en Pubblicazione del Museo Entomologico »Pietro Rossi« Duino en 1937.

Durante los años que hemos estado dedicado a explorar el territorio de Chile con especial dedicación a la recolección de Tenebrionidae, se han logrado descubrir numerosas especies y se han compilado enorme cantidad de datos sobre la distribución de las especies y lugares que ellas frecuentan. Esto nos ha inducido a presentar un nuevo catálogo agregando en él las nuevas especies descritas por autores contemporáneos tales como Hans Gebién, Hans Kulzer, Z. Kaszab y Heinz Freude, el primero de ellos ya fallecido.

En estos momentos el número de especies que se ha encontrado en Chile llegan a 367 de las cuales la gran mayoría son especies que han debido ser descritas como nuevas y el resto se debe a descubrimiento de especies ya descritas de Argentina, Bolivia o del Perú que no se habían encontrado anteriormente en nuestro país. Este enorme aumento de la fauna de esta familia, se debe, como dijimos anteriormente, a las continuas expediciones y viajes efectuados y estamos ciertos que si nuestra actividad exploratoria continúa, es muy probable que este número sea muy aumentado, pues hay

muchas regiones de nuestro país completamente desconocidas por los entomólogos y muchas de ellas reunen condiciones muy favorables para hacer interesantes descubrimientos no solo, naturalmente en especies de esta familia, sino que en el resto de los insectos e incluso en aves y mamíferos y otros animales.

La gran mayoría de los Typus de las especies recientemente descritas se hayan depositados en nuestra colección particular y en el Museum Frey.

Santiago, Abril 1966.

Abreviatura Empleada en la Literatura

Ann. Ag. Lyon	Annales de la Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles de Lyon (Lyon, Paris)
Ann. Mag.	Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology (Londres)
Ann. Soc. Ent. Belg.	Annales de la Société Entomologique de Belgique
Ann. Soc. Ent. Fr.	Annales de la Société Entomologique de France (Paris)
Ann. Soc. Nat.	Annales de la Société Naturelle de Paris
An. Univ. Chile	Anales de la Universidad de Chile
Arch. Nat.	Archiv für Naturgeschichte (Berlin)
Berl. Zeit.	Berliner Entomologischen Verein in Berlin
Bull. Mosc.	Bulletin de la Société Impériale de Naturalistes de Moscou
Bull. Paris	Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris
Bull. Soc. Ent. Fr.	Bulletin de la Société Entomologique de France (Paris)
Col. Chilensis.	Coleoptera Chilensis (Paris)
Col. Hefte	Coleopterologische Hefte. Herausgegeben von E. v. Harold (München)
Col. Kat.	Katalog der Tenebrionide (Col. Het.) Teil 1, en Pubblicazioni del Musei Entomologico „Pietro Rossi“ Duino; Teil II y III en Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft
Com. Mus. Bs. As.	Comunicaciones del Museo Bernardino Rivadavia (Buenos Aires)
Deut. Ent. Zeit.	Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berlin)
Ent. Arb. Mus. Frey	Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (München)
Ent. Mag.	The Entomologist's Monthly Magazine (London)

Ent. Syst.	Entomologia Systematica, Hafniae.
Gen. Col.	Histoire Naturelle des Insectes. Généra des Coleoptéres, Band 5 (Heteromera), (Paris)
Gen. Col. Eur.	Manual Entomologique. Genera des Coléoptéres de Europe, Paris 1854 (Tenebrionidae 1861)
Ham. Mag. Samm.	Ergebnisse der Hamburger Magalhaenischen Sammelleise, Lief.
Hist. Chile	Historia Física y Politica de Chile, Claudio Gay (Zoología), (Paris)
Hist. Nat.	Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptéres (Paris)
Ins. Perj.	Los Insectos Perjudiciales a los Productos Almacenados etc., Editorial Universitaria (Santiago)
Mag. Zool. Melas.	Magazin de Zoologie, par F. E. Guérin-Meneville (Paris)
Mem. Act. Torin	Memoire della Reale Accademie delle Science di Torino
Miss. Sc. Cap. Horn	Mission Scientifique du Cap Horn (Paris)
Mitt. Münch. Ent. Ges.	Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft e. V.
Nat. Hist. Juan Fdz.	Natural History of Juan Fernandez and Easter Island, Zoology
Nat. Syst.	Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten ... Käfer
Nov. Act. Ac. Leop. Gar.	Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae-Leopoldino-Carolinae, Naturae Curiosorum, Bonn
Not. Mens. Stgo.	Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile (Santiago)
Opusc. Ent.	Opuscula Entomologica (Lund)
Pet. Nouv.	Petites Nouvelles Entomologiques (Paris)
Phys.	Physis Recueil d'Histoire Naturelles
Proc. Cal. Ac. Sc.	Proceedings of the California Academy of Sciences
Proc. Phil.	Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia
Proc. Zool. Soc.	Proceedings of the Scientific Meeting of the Zoological Society of London (London)
Regne Anim.	Inconographie du regne Animal de G. Cuvier, Insectes
Reise Novara	Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Coleoptera (Viena)
Resa Eugenia	Kongliga Svenska Fregatten Eugenia resa omkring Jorden ... Zoologi, I, Insecta

Reise Wüste Atac.	Reise durch die Wüste Atacama auf Befehl der Chilenischen Regierung im Sommer 1853/1854 unternommen und beschrieben, Halle
Rev. Univ. Cat. Chile	Revista Universitaria. Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales, Universidad Católica de Chile
Rev. Zool.	Revue Zoologique
Stett. Ent. Zeit.	Stettiner Entomologischen Zeitung, Stettin
Studi Ent.	Studi Entomologici Pubblicati per Cura di Flaminio Baudi e di Eugenio Truqui, Torino
Suppl. Ent. Syst.	Supplementum Entomologiae Systematicae, Hafniae
Syst. Eleut.	Systema eletheratorum, Kiliae
Syst. Nat.	Systema Natura per Regna Naturae secundum classes, . . . Holmiae
Tr. Am. Phil. Soc.	Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia
Tr. Ent. Lond.	Transactions of the Entomological Society of London
Tr. Linn. Soc.	Transactions of the Linnean Society of London
Tr. Zool. Lond.	Transactions of the Society of London
Voy Coq.	Voyage autour du monde exécuté par ordre du Roy, sur la Corvette de sa Majesté „Coquille“
Voy D'Orb.	Insectes de l'Amerique Méridionale recueillis par Alcides D'Orbigny, Paris
Voy. du S. Y. Belgia	Expedition antartique belge, résultats du voyage du S.Y. Belgia . . . Zoologie, Paris
Voy. Pole Sud	Voyage du Pole Sud . . . Zoologie, Paris
Zool. Atl.	Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten während Kotzebue's etc 2. Reise um die Welt, 1823–1826 gesammelt. Berlin, Reimer, 1929–1833.

Sinopsis de los generos chilenos de la familia Tenebrionidae

Subfam. Epitragini	Melaphorus	1
Geoborus	2 Subfam. Eurymetopini	
Nyctopetus	12 Arthroconus	1
Parepitragus	1 Hylithus	3
Hypselops	1 Subfam. Thinobatini	
Aspidolobus	2 Thinobatis	6
Omopheres	1 Pseudothinobatis	2
Subfam. Evaniosomini	Cordibates	1
Aryenis	1 Subfam. Trimytini	
Achanius	1 Salax	1

Trilobocara	2	Phaleria	1
Eremoecus	2	Phalerisida	1
Peltolobus	2	Subfam. Crypticini	
		Archeocrypticus	2
Subfam. Stenosini		Subfam. Bolitophagini	
Discopleurus	2	Trachyderas	1
Grammicus	1	Subfam. Dysantini	
Hexagonochilus	2	Ploepsidius	4
Subfam. Nyctoporini		Subfam. Diaperini	
Ammophorus	3	Hoplocephala	1
Subfam. Nycteliini		Platydema	1
Gyriosomus	34	Enneboeus	1
Nyctelia	15	Subfam. Ulomini	
Epipedonota	18	Gnathocerus	1
Psectrascelis	25	Phanerops	2
Auladera	3	Tribolium	2
Mitragenius	2	Oligocara	2
Pilobalia	3	Alphitobius	2
Subfam. Scotobiini		Doliema	1
Psammetichus	7	Subfam. Eutelini	
Diastoleus	2	Pteroderes	1
Scotobius	20	Subfam. Tenebrionini	
Emmalodera	4	Tenebrio	2
Subfam. Eleodini		Toxicum	1
Nycterinus	10	Subfam. Cyphaleini	
Subfam. Physogasterini		Cyphaleus	1
Philorea	5	Subfam. Apocryphini	
Physogaster	6	Apocrypha	2
Entomochilus	10	Subfam. Adeliini	
Subfam. Praocini		Adelium	2
Asidelia	1	Subfam. Misolampini	
Neopraocis	1	Heliofugus	25
Platesthes	4	Myrmecodema	3
Praocis	60	Subfam. Helopini	
Falsopraocis	3	Parahelops	5
Subfam. Pedinini		Hydromedion	5
Opatriinus	1	Chanopterus	1
Blapstinus	2	Brachyhelops	1
Subfam. Opatrini		Dolphus	1
Ectatocnemis	1	Subfam. Strongilini	
Lepidocnemeplatia	1	Homocyrtus	3
Gonocephalum	1	Cuphotes	1
Subfam. Phaleriini			

E p i t r a g i n i Lacordaire

Geoborus Blanchard
= *Deroptatus* Solier

costatus Blanchard 1843, Voy D'Orb., 194, lám. 13, f. 1. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, 133, lám. 18, f. 4 e/f. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 67/68.

Loc: Prov. Coquimbo, Valparaíso y Santiago (Zonas arboladas), sobre plantas.

rugipennis (Solier) 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 134/135. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 68/69.

= *pilosus* Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit., 25, p. 331/332.

Loc: Prov. Atacama y Coquimbo (zonas áridas), sobre plantas y flores.

Nyctopetus Guérin

niger Germain 1855, An. Univ. Chile, p. 397/398. – Philippi 1864, Stett. Ent. Ges. 49, p. 71/72.

= *laticollis* Philippi l. c. 327/328.

= *carbonarius* Philippi l. c. 329.

Loc: Prov. Santiago y Colchagua sobre los 3.000 mts. Bajo piedras o plantas.

ssp. **parvus** Philippi l. c. 328/329. – Freude l. c. 74.

Loc: Prov. Valdivia (Corral).

argentinus Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 74/76.

Loc: Prov. Malleco (Liucura, El Arco, etc.), Prov. Aysén (Chile-Chico).

neuquensis Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 76/77.

Loc: Prov. Coquimbo (Cordillera de Illapel).

nitidus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 331. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ges. 49, p. 78/79.

Loc: Prov. Curicó y Colchagua (zonas arboladas).

carinatus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 330/331. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 79/80.

Loc: Prov. Colchagua.

rengensis Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 81/82.

Loc: Prov. Santiago y O'Higgins (Sobre arbustos en zona pre-andina).

ssp. **illapelensis** Freude 1959, l. c. 82/83.

Loc: Prov. Coquimbo (zona andina de Illapel, sobre arbustos).

kaszabi Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 83/84.

Loc: Prov. Santiago a Linares (Cordillera). Coquimbo (Elqui). Prov. Concepción (Contulmo). (Sobre arbustos).

manni Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 84/86.

Loc: Prov. Santiago (Renca, Alhué, Aculeo, etc.); Valparaíso (Limache, Quilpué). Zona andina desde Santiago a Linares. (Sobre plantas).

leechi Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 86/87.

Loc: Prov. Coquimbo (Huanta, Elqui, Paihuano, Zona andina de Illapel, Zona costera de Pullalli).

maculipennis (Laporte) 1840, Hist. Nat. 2, p. 215. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 132, lám. 18, f. 4 a/d. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 89/90.

= var. *lividipennis* (Blanchard) 1843, Voy. D'Orb., p. 194 lám. 13, f. 2.

Loc: Prov. Coquimbo, Aconcagua y Santiago (Zona andina), sobre arbustos y árboles.

penai Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 87/89.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo); Coquimbo (Illapel, Ovalle, Vicuña, Combarbalá, Serena); Aconcagua.

tenebrioides Guérin 1830, Voy. Coq. 2, p. 98, lám. 4, f. 7. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 215. – Solier 1851, in Gay Hist. Chile 5, p. 131. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 91/92.

Loc: Prov. Maule (Curanipe); Ñuble (zona preandina). Sobre árboles y arbustos.

ssp. *rossi* Freude 1959, l. c. 92/93.

Loc: Prov. Bío-Bío (Laguna del Laja, Pemehue); Malleco (La Fusta, Lonquimay, etc.); Cautín; Arauco (Cordillera de Nahuelbuta). Sobre árboles y arbustos.

ssp. *rubripes* Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 329/330. – Freude l. c. 93/94.

Loc: Prov. Santiago a Talca (Zona precordillera de los Andes y de la cordillera de la Costa), sobre árboles y arbustos.

ssp. *gaudichaudi* (Laporte) 1840 l. c. 215. – Solier l. c. 132. – Freude l. c. 95/96.

= *quadricollis* Laporte l. c. 215. – Solier l. c. 132.

Loc: Prov. Valparaíso y Santiago (zonas boscosas y arbustivas).

Parepitragus Casey**pulverulentus** Erichson 1847, Arch. Nat. 13, p. 117. – Peña 1961, Not. Mens.

Stgo., V, p. 1.

Loc: Prov. Tarapacá (Valle de Azapa).

Hypselops Solier**oblonga** Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 135, lám. 18, f. 5.

Loc: Prov. Atacama (Domeyko) en zonas áridas.

Aspidolobus Redtenbacher**piliger** Redtenbacher 1868, Reise Novara 2, p. 119.

Loc: Prov. Santiago (Quilicura).

penai Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 48.

Loc: Coquimbo (Playa de Talinay), bajo piedras.

Omopheres Casey**porteri** Brêthes 1922, Rev. Chile Hist. Nat., p. 170.

Loc: indeterminada.

Evaniosomini Lacordaire**Aryenis** Bates**unicolor** Blanchard 1843, Voy. D'Orb. p. 199, lám. 15. – Peña 1961, Not.

Mens. Stgo., V, p. 1.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama y Toconao), bajo piedras.

Achanius Erichson**piceus** Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 902/903.

Loc: Prov. Tarapacá (Camarones, Lluta), bajo piedras?

Melaphorus Guérin= *Stenholma* Solier**elegans** Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 895/896.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica Camarones, pajo piedras?).

Eurymetopini Casey**Arthroconus** Solier= *Gymnognathus* Solier**elongatus** Solier 1851 en Gay, Hist. Chile 5, p. 240.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel), Talca (Rio Maule), precordillera, bajo piedras.

fuscus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 137, lám. 18, f. 6.

= *piceus* Solier l. c. 239, lám. 20, f. 8.

Loc: Prov. Antofagasta a Linares bajo piedras, troncos, pasto, plantas, etc. o vagando durante el día.

Hylithus Guérin

humilis Erichson 1847, Arch. Nat. 13, I, p. 113. – Peña 1961, Not. Mens.

Stgo. V, p. 1.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre) bajo piedras en zona andina sobre los 3.200 mts.

tentyrioides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 287. – Guerin 1834, Mag.

Zool. Cl. IX, 12, p. 108. – Solier 1835, Ann. Soc. Ent. Fr. 4, p. 410, lám. 9, f. 15/17.

= *brevicornis* (Solier) 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 136.

Loc: Prov. Antofagasta a Atacama bajo piedras y plantas en zona andina sobre los 3.200 mts.

ssp. **atacamensis** Kaszab 1964, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. 56, p. 380.

Loc: Prov. Atacama (Vallenar). Bajo piedras y plantas.

forsteri Kaszab 1964, l. c. p. 380.

Loc: Prov. Tarapaca (Arica), bajo piedras y plantas.

ssp. **penai** Kaszab 1964, l. c. p. 382.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre, W. volcán Láskar, 3.500 mts.) bajo piedras y plantas.

Thinobatini Lacordaire

Thinobatis Eschscholtz

= *Trinobatis* Laporte

ferruginea Eschscholtz 1831, Zool. Atl. 4, 9, lám. 18, f. 3. – Laporte 1840,

Hist. Nat. 2, p. 196. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges. p. 25/26.

= *minuta* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 126/127, lám. 18, f. 1. –

Freude l. c. p. 26.

Loc: Prov. Atacama a Valparaíso zona de la costa, en dunas.

intermedia Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 327. – Freude 1960, Mitt.

Münch. Ent. Ges., p. 26/27.

Loc: Prov. Valdivia a Chiloé, zona costera, en dunas.

rufipes Solier 1835, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, p. 407/408, lám. 9, f. 11. –

Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 27/28.

Loc. Prov. Coquimbo a Maule, zona costera, en dunas.

ssp. penai Freude. l. c. p. 28.

Loc: Prov. Osorno a Chiloé, zona costera en dunas.

rotundicollis Waterhouse 1845, Ann. Mag. XVI, p. 320. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 29.

Loc: Prov. Coquimbo (Sur), a Colchagua, zona costera en dunas.

kuscheli Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, 3, p. 903/905. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 30.

Loc: Prov. Antofagasta (Rinconada).

melcheri Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 30.

Loc: Prov. Atacama, zona costera en dunas.

brevicollis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 51.

Loc: Prov. Valparaíso (Vina del Mar; Sn. Jerónimo; Algarrobo).

Pseudothinobatis Freude

ohausi (Kulzer) 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 905. – Freude 1960, Mitt.

Münch. Ent. Ges., p. 34.

Loc. Prov. Tarapacá (?).

calderana Kulzer, 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 49.

Loc: Prov. Atacama (Caldera).

Cordibates Kulzer

chilensis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 910/911.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta. Zona costera, llega a la luz.

Trimytiny Casey

Salax Guérin

lacordairei Guérin 1843, Mag. Zool. Cl. IX, II, lám. 107. – Lacordaire 1859,

Gen. Col. lám. 48, f. 1. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

= *salax* Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 288.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, etc.), Zona andina, bajo piedras en zonas húmedas salobres.

Trilobocara Solier

= *Tribolocara* Lacordaire

= *Edrotinus* Fairmaire

ciliata Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 129.

Loc: Prov. Aconcagua y Coquimbo.

erotoyloides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 288. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

Loc: Santiago, probablemente haya confusión con la especie anterior, Consideramos dudosa la presencia de esta especie en Chile.

Eremoecus Lacordaire

= *Hyperops* Solier

cordicollis Kirsch 1873, Berl. Zeit. 17, p. 402.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre), sobre 3.200 mts. Bajo piedras.

eschscholtzi (Solier) 1951 in Gay, Hist. Chile 5, p. 128, lám. I, f. 2.

Loc: Coquimbo (?).

Peltolobus Lacordaire

= *Megalophrys* Waterhouse

= *Albuena* Kulzer

patagonica (Waterhouse) 1845, Ann. Mag. 16, p. 322. – Burmeister 1875,

Stett. Zeit. 36, p. 462. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

Loc: Prov. Magallanes (Natales, Cerro Payne), bajo piedras.

waterhousei Bates 1873, Ent. Mag. 10, p. 47.

= *penai* Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 912; 1962, l. c. 13, p. 100.

Loc: Santiago Cordillera de la Costa (Alhué), en troncos en descomposición, en bosques.

stenosini Lacordaire

Discopleurus Lacodaire

= *Pleurophorus* Solier

acuminatus Reitter 1886, Deut. Ent. Zeit. 30, p. 99.

Loc: indeterminada

quadricollis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 163, lám. 18, f. 1.

Loc: Prov. Coquimbo, zona costera (Longotoma).

Grammicus Waterhouse

chilensis Waterhouse 1845, Ann. Mag. 16, p. 324.

= *rouleti* Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 162, lám. 18, f. II.

Loc: Prov. Coquimbo a Santiago en regiones áridas desde la costa hasta los 2.200 mts. bajo piedras, por lo general en colonias.

Hexagonochilus Solier

dilaticollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 169, lám. 19, f. 3.

Loc: Prov. Coquimbo a Curicó, bajo piedras o maderas.

tuberculatus Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 399.

Loc: indeterminada.

Nyctoporini Lacordaire**Ammophorus** Guérin

= *Selenoma* Solier

peruvianus Guérin 1830, Voy. Coq. 2, p. 94, lám. 4, f. 4; 1834, Mag. Zool.

Cl. 9, p. 26. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 41, lám. 2, f. 1/5. –

Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 303. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 170, lám. 19, f. 4.

Loc: Prov. Coquimbo a Santiago.

rubripes Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 42.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta, zona costera, bajo piedras etc. en partes áridas.

costatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melas. 26. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent.

Fr. 7, p. 43. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 203. – Peña 1961, Not.

Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica).

Nycteliini Solier**Gyriosomus** Guérin

elongatus Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 259. – Fairmaire 1876, Ann.

Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 144. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 145/148, lám. VII, f. 3. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 531, lám. 11, f. 1.

Loc: Prov. Atacama (Chañaral de Aceituno). En dunas.

gebieni Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 531/533, lám. 11, f. 2.

Loc: Prov. Atacama (Quebrada de Chañaral), en planicies arenosas. Costa sur de la provincia, vagando.

luczoti Chevrolat in Guér. Régne Anim. lám. 28, f. 5. – Laporte 1840, Hist.

Nat. 2, p. 189. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 221. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 150. – Gebien 1944, Mitt. Münch.

Ent. Ges. 34, p. 141/145. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.

= *curvilineatus* Guérin 1834, Mag. Zool. Melas. lám. 103, f. 2.

= *crispaticollis* Fairmaire 1866, Bull. Soc. Ent. Fr. CLXX.

Loc: Prov. Coquimbo, en muy diversos ambientes desérticos, vagando.

bridgesi Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 258. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 222. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 151. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 148/150. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533, lám. 11, f. 3.
= *carinatus* Solier 1848, Studi Ent. p. 365 (219).

Loc: Prov. Coquimbo, zona de la costa, diversos ambientes, vagando.

whitei Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 50. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 150 (nec. *whitei* Solier, var *waterhousei* Fairmaire l. c. p. 151, IX.). – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 150/153. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.

Loc: Provincia Atacama, zona costera del sur, vagando.

kingi Reed 1873, Ent. Mag. 9, p. 207. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 149. – Blair 1935, Ent. Mag. 71, p. 104. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 153/155, VII, f. 4. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
= *affinis* Reed l. c. 208. – Fairmaire l. c. 149.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo), laderas arbustivas.

planatus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 219. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 145. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 155/158, lám. X. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.

Loc: Prov. Atacama (Huasco, Freirina), en laderas de lomajes suaves, vagando.

planicollis Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 161/163, lám. XII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo), en zonas planas y arbustivas, vagando.

batesi Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 148. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 166/169, lám. XIII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
= *whitei* Solier 1851 in Gay. Hist. Chile 5, p. 224.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Norte de Vallenar), vagando.

atacamensis Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 146. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 164/166. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 534.

Loc: Prov. Atacama (Freirina), vagando en zonas planas.

peñai Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 534, lám. 11, f. 4.
Loc: Prov. Atacama (S. Oeste), vagando en planicies.

subrugatus Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 147. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 169/171, lám. VIII, f. 2, lám. X, f. 2. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.

Loc: Prov. Atacama (Zona sur: Huasco, Freirina, El Colorado), vagando en laderas.

angustus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. p. 347. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 148. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 171/173. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.

Loc: Esta especie ha sido dada como des Perú, lo que es muy dudoso. Solo se conoce 1 ejemplar en la colección Sommer (Museo de München).

parvus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 222. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 145. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 158/161, lám. VIII, f. 1, lám. XI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.

= *incertus* Solier l. c. 218. – Fairmaire l. c. 147.

Loc: Prov. Atacama (Canto del Agua, Freirina, Huasco, Copiapó?), vagando en planicies desérticas.

amabilis Kulzer 1950, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535/537, lám. 11, f. 5/6.

Loc: Coquimbo (Llano de la Higuera), vagando en planicies.

barriai Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 537/538, lám. 11, f. 7/8.

Loc: Prov. Coquimbo (Región norte) (Choros Bajos), vagando en planicies.

hopei Gray 1832 in Griff, Animal Kingdom Index, lám. 50, f. 6, lám. 69, f. 6. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 189. – Solier 1848, Studi Ent. p. 363 (Sep. pág. 217). – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 152. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 173/176. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 538.

= *semipunctatus* Solier l. c. 364 (Sep. 218); in Gay Hist. Chile 5, p. 223.

Loc: Prov. Coquimbo (Serena, Socos, Rio Limarí etc.), vagando en planicies en la zona costera.

reedi Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 150; 1959 l. c. 10, p. 538/539.

Loc: Prov. Coquimbo (Quilitapia, Punitaqui, Socos, etc.), vagando en lomajes suaves, arbustivos.

leechi Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 148, lám. 9, f. 1; 1959 l. c. 10, p. 538.

Loc: Prov. Coquimbo (Barraza, Socos, Cuesta Buenos Aires), vagando en lomajes suaves.

marmoratus Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 250. – Fairmaire 1876,

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 154. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 179/181, lám. XV. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539.
Loc: Prov. Coquimbo (Vicuña, Guampulla, Condoríaco, Cuesta de Buenos Aires etc.), vagando en planicies.

laevigatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melas., p. 6, lám. 103, f. 3. – Solier 1848, Studi Ent. p. 361, lám. 15, f. 14/17; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 218, lám. 20, f. 1. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 155. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 189/192, lám. XVII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539.

Loc: Prov. Aconcagua, Santiago, Atacama, vagando en lomajes suaves.

granocostatus Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. p. CLXX. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Grs. 34, p. 187/189, lám. VIII, f. 5. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539.

Loc: Prov. Coquimbo (Combarbalá, Illapel, Punitaqui), vagando en laderas arbustivas.

foveopunctatus Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 153. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 185/187. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 359.

Loc: Prov. Coquimbo (Ovalle, Illapel).

ssp. laevis Kulzer l. c. 539/541, lám. 12, f. 1.

Loc: Prov. Coquimbo (Guampulla, Illapel), vagando en laderas arbustivas.

freyi Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 181 y 184, lám. XVI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 541, lám. XII, f. 2.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos, Socos, Cuesta de Buenos Aires, Manquehua, Alcones), vagando en lomajes arbustivos.

peniciliger Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 181/183, lám. XVI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 541.

Loc: Prov. Coquimbo (Tongoy, Talinay), vagando en laderas y planicies.

lucens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 542/543.

Loc: Prov. Coquimbo (Hda. Illapel 1800 mts. El Calabazo), vagando en planicies arbustivas.

pumilus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 543/544.

Loc: Prov. Coquimbo (Hda. Illapel, Cuesta Los Hornos, Sur de Punitaqui, Norte de Combarbalá), vagando en planicies muy poco vegetadas, o bajo piedras.

paulseni Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. p. CLXX. – Gebien 1944, Mitt.

Münch. Ent. Ges. 34, p. 192/194. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 544.

Loc: Prov. Coquimbo (Huilmo, Salamanca, Quilitapia, Puerto Oscuro), vagando en lomajes pastosos.

modestus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 544/545.

Loc: Prov. Coquimbo (Huentelauquén), vagando en planicies muy poco vegetadas, o bajo piedras.

melcheri Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 545/546.

Loc: Prov. Coquimbo (Puerto Oscuro, Rio Choapa, al SW de Illapel), en laderas pastosas.

impressus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. p. 6. – Solier 1848, Studi Ent. p. 359 (Sep. p. 213); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 220. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 155. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 176/179, lám. VIII, f. 3. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547.

= *fossulatus* Solier l. c. 359 (Sep. 213).

Loc: Prov. Atacama (Huasco) y Coquimbo.

curtisi Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 153. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547, lám. 12, f. 6.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo?), Atacama (Carrizalillo, Carrizal Bajo), Coquimbo (Choros Bajos, NE de El Tofo), en laderas arbustivas y pedregosas.

coriaceus Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. CLXX. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 194. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos).

lineatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. t. – Fairmaire 1886, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 146.

Loc: Esta especie se ha dado del Perú, lo que consideramos muy dudoso, creemos que se trata de una especie chilena.

Nyctelia Latreille

= *Nyctelioma* Casey

fitzroyi Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 109. – Curtis 1845, Tr. Linn. Soc., p. 463, lám. 41, f. 11. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 140. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 156. – Burmeister 1877, Stett. Zeit. 38, p. 69. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 20, lám. I, f. 1. Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), en zonas esteparias, vagando.

darwini Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 108; 1842, Ann. Mag. 10, p. 135. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 472, 38; 1877, 69. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 157 (Mon.). – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 20, lám. 1, f. 2.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), vagando en zonas esteparias planas.

laevis Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 105; 1842, Ann. Mag. 10, p. 132; 1844, 50. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 159. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 21.

Loc: Sur de Chile, probablemente cordillera de la Prov. de Llanquihue.

stephensi Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 113; 1842, Ann. Mag. 10, p. 139. – Fairmaire 1879, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 158. – Peña 1861, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 24, lám. I, f. 7.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), Zona esteparia.

crassescostata Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 295. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 27, lám. II, f. 1.

Loc: Prov. Malleco (Cordillera de Las Raices, Lonquimay, El Arco, etc.), en regiones planas, pastosas y abiertas.

vulcanica Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 170. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 38, lám. III, f. 4.

Loc: Prov. Santiago (Lo Valdés), Zona andina sobre los 2.400 mts. vagando o bajo piedras.

solieri Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 108; 1842, Ann. Mag. 10, p. 134. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 163. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 44/45, lám. IV, f. 2.
= *rectestriata* Fairmaire l. c. p. 162. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), Magallanes (Cerro Guido).

plicata Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 107; 1842, Ann. Mag. 10, p. 133. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 473. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 165. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 45/46, lám. IV, f. 3.

Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas).

geometrica Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 292. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 55, lám. V, f. 3.

Loc: Prov. Llanquihue (Río Huemules?), Prov. Aysén (Puerto Ibáñez, Chile-Chico), vagando en regiones planas y esteparias.

- bremei** Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 48. – Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. XIX, p. 464, lám. 41, f. 13. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167; 1906, Voy. du S. Y. Belgia (Zool. Ins. p. 41, lám. 1, f. 11). – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 56, lám. V, f. 5.
Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas), vagando en zonas esteparias.
- multicristata** Blanchard 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 141; 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 143, lám. 10, f. 1. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 58/59.
Loc: Prov. Magallanes (Natales, Puerto Hambre).
- granulata** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 109; 1842, Ann. Mag. 10, p. 136. – Curtis 1845, Trans. Linn. Soc. Lond. 19, p. 464, lám. 41, f. 12. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. I, p. 59. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 59, lám. V, f. 8.
= *granulosa* Gemminger 1870, Col. Hefte 6, p. 122. – Fairmaire 1. c., p. 168. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas, Norte Isla Grande de Tierra del Fuego), vagando en regiones pastosas planas y esteparias.
- varipes** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 169. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 62, lám. VI, f. 2.
Loc: Prov. Talca, Curicó, Malleco en zonas sobre los 800 mts. en el borde del bosque. Prov. Concepción (Arauco), zona costera.
- unicosta** Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 294. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 63/64, lám. VI, f. 4.
Loc: Prov. Aysén (Río Galera, Balmaceda), zona alta plana y de pastizales, vagando.
- corrugata** Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. XIX, p. 465, lám. 41, f. 14. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 164. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 66/67, lám. VI, f. 7.
= *longeplicata* Fairmaire 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44, p. 111; 1906, Voy. du S. Y. Belgia, p. 41, lám. 1, f. 12. – Blair 1935, Ent. Mag. 71, p. 104.
Loc: Prov. Magallanes (Natales).

Epipedonota Solier
= *Callyntra* Solier

- multicostata** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 5. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 337, lám. 7, f. 10/13. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 189.

– Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 154, lám. 18, f. 10. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 341. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 152.

= *rufipes* Solier l. c. 340; l. c. 155. – Fairmaire l. c. 342.

= *vicina* Solier l. c. 339. – Fairmaire l. c. 342.

Loc: Prov. Valparaiso a Maule zona costera arenosa. Vagando en planicies.

servillei (Solier) 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 341. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

Loc: desconocida.

laticollis Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 333. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 343. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

= *expansicollis* Fairmaire l. c. 344.

Loc: Prov. O'Higgins (zona andina).

rugulosa Gemminger 1870, Col. Hefte Münch. 6, p. 122. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 345. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

= *rugosa* (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 155.

Loc: Prov. Curicó y Talca (zona andina), vagando en partes abiertas y pastosas.

rugosa Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 117. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 158. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 345. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154.

= *anthracina* Germain 1854, Ann. Univ. Chile, p. 331.

Loc: Prov. Santiago (Farellones); O'Higgins (Rengo), zona andina sobre los 2.000 m. vagando o bajo piedras o bajo guano de vacunos en planicies.

paulseni Fairmaire 1855, Bull. Soc. Ent. Fr. CLVI. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154.

Loc: Prov. Valparaiso a Arauco, vagando o bajo piedras en zonas de coirones sobre los 1.500 m. en la cordillera de la costa.

penai Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154/155, lám. 9, f. 2.

Loc: Santiago (Alhué) en alturas, en bosques de Nothofagus, siempre vagando en sus deslindes (Cordillera de la costa).

rossi Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 155/157, lám. 9, f. 3.

Loc: Prov. Arauco, en coironales sobre los 1.100 mts. en la cordillera de Nahuelbuta.

riverai Kulzer 1962, Ent. Arb. Mus. Frey 13, p. 83/84.

Loc: Prov. Linares (zona andina de Parral).

- carbonaria** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 334. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 346. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Ñuble y Bío-Bío (zona andina, vagando en coironales).
- macrocosta** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 4. – Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 48. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
= *major* Germain 1851, Ann. Univ. Chile 5, p. 329.
Loc: Prov. Santiago a Talca (zona andina).
- andina** Germain 1854, Ann. Univ. Chile, p. 329. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 347. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Santiago (Farellones, etc.), en planicies, vagando o bajo guano de vacuno o piedras.
- unicosta** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 156. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 347. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Curicó (Zona andina), vagando o bajo plantas en zonas abiertas de montaña sobre los 1.100 mts.
- planiuscula** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 348. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157/158.
Loc: Prov. Linares (zona Andina).
- lata** Waterhouse 1841, Proc. Soc. Lond., p. 119; 1842, Ann. Mag. 10, p. 146.
– Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 478. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 349. – Berg 1901, Com. Mus. Bs. As., p. 268. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 160/161. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes. Vagando en zonas esteparias.
- monilis** ssp. **angustata** Burmeister 1875, Stett. Zeit., p. 479. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 353. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 161. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Antofagasta (Mucar), altiplano a 4.000 mts. vagando en laderas arenosas.
- tricostata** Burmeister 1875, Stett. Zeit., p. 479. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 354. – Berg 1901, Com. Mus. Bs. As., p. 267. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 164/165. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Magallanes (Natales, Cerro León).
- subplana** Gebien 1910, Col. Kat. 15, p. 145. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 165.
= *planiuscula* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 297.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), vagando en zonas esteparias.

Psectrascelis SolierSubg. **Psectrascelis s. str.**

aequalis Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 363. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 171.

Loc: Prov. Coquimbo (Baños del Toro), zona andina.

cariosicollis Fairmaire 1904, Bull. Fr., p. 64. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Antofagasta (Salar Punta Negra).

intricaticollis Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 356. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre, Talabre, etc.) zona andina sobre los 3.000 mts. bajo piedras o plantas.

subdepressa Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 318. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 357. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc. Prov. Atacama (Quebrada de San Andrés), zona desértica, bajo arbustos.

penai Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175/176, lám. 9, f. 9.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Socos), bajo piedras en zonas áridas.

elongata Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 144. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 358. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

Loc: Prov. Atacama (Copiapó); Coquimbo (Valle del Elqui), bajo piedras.

crassiventris Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 483/484.

Loc: Prov. Atacama (Desierto entre Copiapó y Vallenar), zonas arenosas, enterrados bajo arbustos, muy rara vez sobre ellos.

pilipes Guérin 1834, Mag. Zool. Melás, p. 4, lám. 102, f. 1. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 314, lám. 6, f. 9/15; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 143, lám. 18, f. 8. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 188. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 358. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

= *brevis* Solier l. c. 146. – Fairmaire l. c. 359.

= *guerini* Solier l. c. 317; l. c. 144. – Fairmaire l. c. 314.

= *sulcicollis* Solier l. c. 314.

Loc: Prov. Atacama a Coquimbo; Aconcagua (?) bajo piedras o plantas en zonas áridas.

davidsi Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 53.

Loc: Prov. Coquimbo (Manquehua, Majada Blanca, Canela Alta), bajo piedras en laderas de los cerros.

sublaevicollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 146. – Fairmaire 1876,

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 356. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

Loc: Prov. Atacama (Freirina); Coquimbo (Elqui).

pilosa Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 147. – Fairmaire 1876, Ann. Soc.

Ent. Fr. (5) 6, p. 359. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177/178.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Vallenar) en zonas desérticas bajo piedras y plantas.

kuscheli Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 178/179.

Loc: Prov. Coquimbo (Herradura, Fray Jorge, Tongoy etc.) en arenas, bajo plantas.

Subg. **Cerostena** Solier

confinis Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 484/485.

Loc: Prov. Antofagasta (Mucar, Quisquiro, Pujsa, etc.). Zona andina sobre 4.000 mts. en planicies, bajo piedras y plantas.

alutacea Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 182/183.

Loc: Antofagasta (Socaire).

strigosula Gebien 1910 (nom. nov.), Co. Kat. 15, p. 147. – Kulzer 1954,

Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 190. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

= *semistrigosa* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 298.

Loc: Prov. Talca (Laguna del Maule), planicies andinas.

pilosipes Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 191/192, lám. 14, f. 8.

Loc: Punta Acol. (?)

arenaria Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 399. – Fairmaire 1876, Ann.

Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 365. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192.

Loc: Prov. Santiago (zona costera) bajo plantas en planicies arenosas.

subcostata Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 398. – Fairmaire 1876,

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 367. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192.

= *parallela* Germain l. c. 398.

Loc: Prov. Santiago a O'Higgins (zona Andina).

difficilis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 54.

Loc: Coquimbo (Hda. Illapel).

impressicollis Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 398. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 366. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192/193.

Loc: Prov. Santiago (Farellones, Chicauma, Cerro Vizcachas), zona Andina abierta, sobre los 1.800 m., bajo plantas y piedras.

crassicosta Fairmaire 1878, Rev. Mag. Zool. 269. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 193.

Loc: Deconocida.

cinerea Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 147. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 367. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 194.

Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Santiago (Alhué).

pudens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 557/558.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Quebrada El Teniente), zona arenosa de la costa, bajo plantas.

similis Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 194/195.

Loc: Prov. Valparaiso (Horcones a Viña del Mar), región costera, bajo plantas en lugares arenosos.

plicicollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 145. – Fairmaire 1876, Ann.

Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 357. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 195/196.

Loc: Prov. Coquimbo (zona andina).

Auladera Solier

= *Aulacodera* Gemminger & Harold

andicola (Lacordaire) 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 278. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 334, lám. 7, f. 9; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 152. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 375. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208.

= *rugicollis* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 332. – Fairmaire l. c. p. 360.

Loc: Prov. Aconcagua y Santiago zona preandina, bajo piedras y plantas en laderas pedregosas.

crenicosta Guérin 1834, Mag. Zool. Melás, p. 5. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 9, p. 333, lám. 7, f. 4/8; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 152, lám. 18, f. 9. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 375. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208.

= *jugeleti* Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 43.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Molles, Puerto Oscuro, Punitaqui, etc.) en zonas áridas bajo plantas o piedras, preferiblemente en planicies.

atronitens Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208/209, lám. 10, f. 7.
Loc: desconocida.

Mitragenius Solier

tristis Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 558/559.

Loc: Prov. Malleco (Pino Hachado) en portezuelos a 1.300 mts. bajo piedras.

gibbosus Blanchard 1843, Voy. D'Orb., p. 195, lám. 13, f. 8. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 481. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 372 (scr. gibbus). – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 210. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.
= *araneiformis* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond., p. 466, lám. 41, f. 15.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico) bajo piedras y plantas en zonas esteparias.

Pilobalia Burmeister

decorata ssp. **immaculata** Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 2. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 220. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

= *opaca* Kirsch 1886, Berl. Zeit. 30, p. 333.

= *alticola* Kirsch l. c. 332.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y plantas.

oblonga Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 3. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 226, lám. 11, f. 9.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y plantas.

elegans Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 5. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 380. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 235, lám. 12, f. 8. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y arbustas.

Scotobiini Lacordaire

Psammetichus Latreille

costatus Guérin 1830, Voy. Coq., p. 95, lám. 4, f. 8. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 37, lám. 1, f. 7/10. – Laporte 1840, Hist. Nat. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 165. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 385/386. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique), zona de la costa, bajo plantas secas y basuras; Valparaiso (?), muy dudoso.

carinatus Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 37. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 386/387.

Loc: Tarapacá (Dept. Arica).

crassicornis Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 54. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 166, lám. 19, f. 2. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 387/388.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo); Coquimbo (Elqui, Ovalle) bajo piedras y plantas en cordillera y costa.

gracilis Erichson 1834, Nov. Act. Leop. Gar. 16, p. 245, lám. 38, f. 4. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 388.

Loc: Desconocida (norte del pais).

pilipes Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 19. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 167. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 388/389.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo); Atacama (Copiapó, Caldera, Carrizal Bajo etc.) bajo piedras, en especial grandes y planas, en zonas áridas.

gebieni Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 389/390, lám. XX, f. 1.

Loc: Prov. Atacama (Pintados, Mamiña) bajo piedras y plantas.

penai Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 390/391, lám. XX, f. 2.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique), bajo piedras y plantas.

Diastoleus Solier

bicarinatus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 181. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 399/400.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo); Atacama (Sur de Huasco); Coquimbo (Carrizalillo), bajo piedras, en especial grandes.

collaris Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17, lám. 110, f. 4. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 69, lám. 3, f. 7/12; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 180. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 198. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 129. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 400/401.

Loc: Coquimbo (Punitaqui, Talinay, Puerto Oscuro), bajo piedras y arbustos, en zonas áridas.

Scotobius Germar

akidiodes Waterhouse 1845, Ann. Mag. 16, p. 319. – Burmeister 1875, 36, p. 465. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 401/402, lám. XX, f. 2.

– Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Aysén (Lago General Carrera), bajo arbustos y piedras, en zonas esteparias.

ssp. *bicostatus* Kulzer 1955, l. c. 402/403, lám. XX, f. 6. – Peña l. c. 230.

Loc: la misma de la especie típica.

crassus Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 406/407, lám. XX, p. 7.

Loc: Desconocida (Probable zona costera del extremo norte).

costatus Guérin 1830, Voy. Coq.; 1834, Mag. Zool. Melás., p. 16, lám. 110,

f. 2. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 64. – Kulzer 1955, Ent. Arb.

Mus. Frey 6, p. 408/409. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Antofagasta y Tarapacá (Zona desértica) en oasis bajo piedras donde hay algo de humedad.

obscurus Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 428/429, lám. XXII, f. 4.

Loc: Prov. Malleco (Liucura, Marimenuco etc.), zona esteparia, bajo plantas en especial *Mulinus* sp.

punctatus Eschscholtz 1831, Zool. Atl. 4, p. 11, lám. 18, f. 5. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 65. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 429/430.

Loc: Prov. Aconcagua (Piscicultura); Santiago (Lo Valdés); Concepción, Malleco, Arauco.

bullatus Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. 19, p. 459. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 178. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 430.

= *antarcticus* Guérin i. l.

Loc: Prov. Coquimbo a Valdivia. Magallanes? (Puerto Hambre?).

kirbyi Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 61. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 431. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Coquimbo y Santiago.

asperatus Erichson 1834, Nov. Act. Car. 16, p. 247. – Curtis 1845, Tr. Lin. Soc. Lond. 19, p. 459. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 176. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 431/432, lám. XXII, f. 5.

Loc: Coquimbo a Santiago (zona andina y Preandina).

rugosulus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17, lám. 110, f. 5. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 173, lám. 19, f. 6. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 432/433, lám. XII, f. 6.

Loc: Prov. Coquimbo a Concepción.

gayi Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 62; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 177, lám. 3, f. 2. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 433/434, lám. XXII, f. 7.

Loc: Prov. Coquimbo (Combarbalá, y zona costera).

crenicollis Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 337. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 434/435, lám. XXII, f. 8.

Loc: Prov. Coquimbo, Copiapó?.

rugicollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 178. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 435/436, lám. XXII, f. 9.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel).

emarginicollis Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 437/438, lám. XXIII, f. 2.

Loc: Prov. Valparaíso (Quillota).

planatus Erichson 1834, Nov. Act. Car. 16 (12 Marz.), lám. XXXVIII, f. 5. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 441/443.

= *substriatus* Guérin 1834, Mag. Zool. (Jun), p. 16. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr, 7, p. 66.

= *cribricollis* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 289.

= *punctatellus* Blanchard 1843, Voy. D'Orb., p. 195, lám. 13, f. 5. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 466.

Loc: Prov. Santiago. Es posible que se encuentre en región andina del extremo norte.

atacamensis Germain 1855, Ann. Univ. Chile, p. 399. – Philippi 1860, Reise Wüste Atac., p. 172. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 443/444.

Loc: Prov. Tarapacá (Camarones, Mamiña etc.), Antofagasta (Caracoles, Toconao etc.), bajo piedras, plantas etc. en lugares algo húmedos.

planicosta Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 444/445. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo, Ciudad de Antofagasta etc.), bajo plantas, piedras etc.

laeviuscula Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 336. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 445/446.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta (zona costera), bajo piedras y plantas.

vulgaris Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 16. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 50, lám. 2, f. 12/16; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 172, lám. 19, f. 5.

Loc: Norte del país (?)

brevipes Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 53. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 173. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 447/448.

Loc: Prov. Atacama y Antofagasta (zona de la costa).

brevis Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 336. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 448/450.
Loc: Prov. Tarapacá (Arica).

Emmalodera Solier

obesa Guérin 1841, Rev. Zool. p. 215. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 182, lám. 19, f. 7. – Blanchard 1858, Voy. Pol. Sud., p. 146, lám. 10, f. 9. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. 1, p. 462/463, lám. XXIII, f. 7.
Loc: Prov. Magallanes (Pto. Hambre, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego). En zona esteparia, bajo plantas.

nitens Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 465/466. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), zona esteparia, bajo plantas y piedras, en especial en zona arenosas.

multipunctata Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 461, lám. 41, f. 8. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 468. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 467, lám. XXIV, f. 2.
= *granocostata* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 290.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes (Natales, Tierra del Fuego, Punta Arenas), en zonas esteparias.

ssp. **curvidens** Kulzer l. c. 467/468.
Loc: Prov. Magallanes (Laguna Amarga), bajo piedras y plantas.

hirtipes Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 471/472, lám. XXIV, f. 6.
Loc: dudosa.

Eleodini Eschscholtz

Nycterinus Eschscholtz

abdominalis Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 14. – Solier 1848, Studi Ent. 269 (123), 271 (125); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 215. – Germain 1903, An. Univ. Chile, p. 12. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 550/551, f. 1a.
= *abreviatus* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25. p. 347.
= *rufipes* Solier l. c. 272 (126).
= *spinolai* Solier l. c. 272 (126).
= *gracilipes* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 345. – Germain 1903, An. Univ. Chile. p. 12.
Loc: Prov. Coquimbo a Chiloé (zona costera), bajo plantas en arenas.

genei Solier 1848, Studi Ent., p. 269 (123), 274 (128); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 216. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 17. – Kulzer

- 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 551, f. 16.
 = *costulatus* Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 344.
 Loc: Prov. Coquimbo (zona de la costa).
- rugiceps** Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 468. – Erichson 1847, Arch. Nat. 13, I, p. 116. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 22. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 551/552, f. 2 b.
 = *elongatus* Solier 1848, Studi Ent. 269 (123).
 Loc: Prov. Antofagasta (Toconao, San Pedro de Atacama); Coquimbo a Concepción.
- angusticollis** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 346. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 15. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 552, f. 2 a.
 = *quadricollis* Germain l. c. p. 14.
 Loc: Prov. Coquimbo (Costa desértica).
- penai** Kulzer 1961, Ent. Arb. Mus. Frey 12, p. 210/211, f. 1.
 Loc: Prov. Antofagasta (La Chimba, Taltal), bajo plantas.
- mannerheimi** Solier 1848, Studi Ent. 275 (129); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 216. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 15. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 552.
- thoracicus** Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 13, lám. 14, f. 17. – Guérin 1830, Voy. Coq. II, 2, p. 93. – Solier 1848, Studi Ent. 270 (124); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 19. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553, f. 3 a.
 Loc: Prov. Nuble a Malleco.
- laevigatus** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 345. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 21. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553, f. 3 b.
 Loc: Prov. Santiago a Malleco.
- substriatus** Solier 1848, Studi Ent. 271 (125); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 214. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553/554, f. 4 a, 4 b.
 Loc: Prov. Aconcagua, Valparaíso, Santiago y O'Higgins.
- rossi** Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 554, f. 4 c, 4 d.
 Loc: Aconcagua, Valparaíso y Santiago.

P h y s o g a s t e r i n i Lacordaire

Philorea Erichson

= *Polpocara* Solier

pilosula Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 923/924.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica), bajo plantas o piedras.

setipennis Lesn  1911, Bull. Paris, p. 295; 1917, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 72. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 927. – Pe a 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapac  (Chapiqui a, Putre, Camarones); Antofagasta (Tumbre, Chinina), bajo piedras en zonas『 ridas de altura.

kuscheli Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 927.

Loc: Prov. Tarapac  (Alc rreca, Chapiqui a), bajo piedras en zonas altipl nicas.

brevicornis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 928.

Loc: Prov. Tarapac  (Putre, Caritaya); Antofagasta (Pocos, Talabre), en zonas『 ridas de altura, bajo piedras.

brevipes Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 928/929.

Loc: Prov. Tarapac ? (Pampa del Toco).

Physogaster Gu rin

globulus Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensis 2, p. 4. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 936.

Loc: Prov. Atacama (Domeyko, Rio Copiap ), bajo piedras en planicies『 ridas.

penai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 200/201.

Loc: Prov. Atacama (Caldera a Huasco), bajo plantas en arenas.

oblongulus Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensis 2, p. 4. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 937.

Loc: Desconocida..

nitidus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 937/938.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, Pocos, Chinina, Tumbre etc.), bajo plantas peque as y rastleras o piedras en planicies des rticas.

haagi Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 938/939.

Loc: Prov. Atacama (Freirina, Carrizal Bajo), bajo piedras o plantas en zonas『 ridas planas.

setifer Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 939/940.

Loc: Prov. Tarapac  (Pisagua, Champaja); Antofagasta (Cerro del Quimal), bajo plantas o piedras en zonas『 ridas.

Entomochilus Solier

pilosus Solier 1844, Mem. Ac. Torin (2) 6, p. 261 (49), l am. 2, f. 20/23. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl., l am. 53, f. 1. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 941/942.

Loc: Prov. Atacama (Copiapó); Coquimbo (zona costera), Ovalle, Monte Patria; Santiago (Lo Valdés), bajo piedras.

tomentosus (Guérin) 1834, Mag. Zool. Melás. 3, p. 3. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile, p. 206. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 184. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942.

Loc: Prov. Coquimbo, Aconcagua y Santiago, bajo piedras en zonas áridas.

laevipennis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 207. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942.

Loc: Zona norte del pais (Lugar desconocido).

parvus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 207. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942/943.

Loc: Norte del pais (Lugar desconocido).

hirtipes Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 943/944.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo); Atacama (Caldera, Copiapó), bajo piedras en zonas áridas.

quadratus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 944/945.

Loc: Prov. Atacama (Huasco, Copiapó, El Colorado, etc.); Coquimbo (El Tofo, Cuesta de Buenos Aires, etc.), bajo piedras o ramas, en zonas desérticas.

minor Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 945/946.

Loc: Prov. Atacama (Bombas, El Colorado); Coquimbo (Norte de la Serena, Llano de La Higuera, Rio Elqui), bajo piedras en zonas áridas.

nitens Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 946/947.

Loc: Prov. Antofagasta (Quepiaco); Tarapacá (Tacora, Alcerreca etc.), bajo piedras en zonas altiplánicas.

rugosus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 947/948.

Loc: Prov. Antofagasta (Conchi, El Tatío, Ojos rio San Pedro, Linzor), bajo piedras en zonas de altura.

varius Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 948/949.

Loc: Prov. Tarapacá (Socorama, Caritaya, Zapahuira, Pisagua?); Antofagasta (Cerro Aguas Dulce); Atacama (Salar de Maricunga), bajo plantas y piedras en laderas andinas.

ssp. **collaris** Kulzer l. c. 949.

Loc: Prov. Antofagasta (Talabre); Tarapacá (Mamiña), bajo piedras en laderas andinas.

ssp. **laevis** Kulzer l. c. 949/950.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, Pocos), bajo piedras y plantas en zonas áridas.

P r a o c i n i Solier

Asidelia Fairmaire

contracta Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 296. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 5/6. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile, p. 230.

Loc: Prov. Aysén (Balmaceda), bajo piedras.

Neopraocis Kulzer

reflexicollis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 144, lám. 10, f. 2.

Loc: Prov. Magallanes (Natales, Punta Arenas, Tierra del Fuego), bajo plantas o troncos y piedras.

Platesthes Waterhouse

kuscheli Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 10/11.

Loc: Prov. Aysén (Balmaceda, Chile-Chico), bajo piedras, zona esteparia.

depressa (Guérin) 1841, Rev. Zool., p. 215. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 145, lám. 10, f. 3. – Haag-Rutenberg 1877, Stett. Zeit. 38, p. 155. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. 1, p. 60. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 953; 1958 l. c. 9, p. 11.

Loc: Prov. Magallanes (Bahía Inutil, Bahía Municiones, Punta Arenas), bajo plantas en zonas arenosas.

similis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 953/954.

Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas, Natales), bajo piedras en laderas.

nigra Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 956/957; 1958 l. c. 9, p. 11. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Magallanes (Salto del Payne), bajo piedras en laderas.

Praocis Eschscholtz

= *Coelus* Solier

Subg. **Praocis** s. str.

rufipes Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 6, lám. 14, f. 2. – Solier 1940, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 221; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 186. – Laporte

1840, Hist. Nat. 2, p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 14/15.

= *mannerheimi* Fischer 1844, Bull. Mosc. 18, 1, p. 63. – Motschulsky 1845, Bull. Mosc. 18, 1, p. 63.

= *interrupta* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 187.

Loc: Prov. Coquimbo a Maule (zona costera), bajo plantas o vagando en dunas.

costata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 222; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 15.

= *ciliata* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.

Loc: Prov. Arauco a Llanquihue (zona costera), bajo plantas y vagando en dunas.

audouini Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 222. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 15/16.

Loc: Prov. Coquimbo (Huentelauquen, Los Vilos), bajo piedras.

sanguinolenta Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 223; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 192. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 16.

Loc: Prov. Coquimbo a Santiago (zona de la costa), bajo piedras y arbustos.

quadrисulcata Germain 1856, An. Univ. Chile (2), p. 399. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 16/17.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos); Valparaíso (Algarrobo), bajo piedras o arbustos.

curta Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 226; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 191. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 17.

= *nigroaenea* Solier l. c. 226; l. c. 191.

= *rugipennis* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.

Loc: Prov. Coquimbo (Barraza, Los Vilos, Puerto Oscuro); Valparaíso y Santiago (zona de la costa), refugiados bajo piedras y plantas, en planicies.

hirtella Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 18/19, f. 3.

Loc: Prov. Coquimbo (zona costera entre La Serena y el río Choapa), refugiados bajo piedras y plantas.

sulcata Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 7. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 235. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 19/20.

= *rotundata* Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 284.

Loc: Prov. Coquimbo (Desde Serena al sur); Aconcagua a Maule, bajo piedras y plantas en zonas planas y áridas.

subsulcata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 224, lám. 9, f. 5; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 189. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 20.
= var. *confusa* Solier l. c. 224.

Loc: Prov. Coquimbo (Llano de la Higuera, Quillaycillo, La Pampilla, Rio Elqui, etc.).

spinolai Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 223, lám. 9, f. 6/8; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 20/21.

Loc: Prov. Coquimbo (Desde Serena al rio Limari), zona costera bajo piedras, y plantas.

bicostata Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 341. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 21/22.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel)

rufitarsis Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 227; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 194.

Loc: Prov. Coquimbo (Puerto Oscuro), bajo piedras y plantas en lomajes suaves.

aenea Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 227; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 193. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 22/23.

Loc: Prov. Coquimbo.

parva Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 232; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 194. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 23/24.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel).

tibialis Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 225; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 193. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 24.

= *aeneipennis* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Talinay, Tongoy, Fray Jorge), bajo piedras y plantas.

submetallica Guérin 1834, Mag. Zool., p. 9, lám. 105, f. 3. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 224; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 190. – Laporte 1840, Hist. Nat., p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 24/25.

= *angusta* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 342.

= *elliptica* Philippi l. c. 342.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Ovalle, Los Molles, Puerto Oscuro), bajo piedras y plantas.

subaenea Erichson 1834, Nov. Act. Ac. Leop. Gar. 16, Suppl. p. 248. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 26.

= *laevicosta* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 457.

Loc: Prov. Coquimbo (Huettelauquen, Ovalle, Los Vilos, Socos, Guampulla, etc.), bajo piedras, ramas y plantas.

marginata Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent.

Arb. Mus. Frey 9, p. 26/27.

Loc: Desconocida.

Subg. *Mesopraocis* Kulzer

pilula Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 31/32.

= *hirticollis* Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 212, lám. 9, f. 1 bis 4; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188, lám. 19, f. 18.

Loc: Prov. Atacama (Huasco, Copiapó, Caldera, Sur de Chañaral); Coquimbo (Serena, Totoralillo), en zonas arenosas, bajo plantitas bajo la arena.

flava Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 32.

Loc: Prov. Coquimbo (Serena); Valparaíso.

calderana Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 32/33.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Copiapó, Norte Caldera), bajo plantas y piedras en zonas arenosas.

nitens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 561/562, lám. 12, f. 9.

Loc: Prov. Atacama (Huasco), en dunas, bajo la arena entre plantas.

Subg. *Postpraocis* Kulzer

curtisi Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 192. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 33.

Loc: Prov. Atacama (Extremo sur); Coquimbo (Cuesta Buenos Aires, Puerto Oscuro), bajo plantas y piedras.

costatula Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 228; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 191. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 33/34.

= *angulifera* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 344.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, Lo Valdes, Barrancas, Maipú), bajo piedras y arbustos.

pubescens Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 324. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 34/35.

Loc: Coquimbo (Ovalle, Socos, Cerrillos Pobres), bajo piedras en planicies áridas.

pentachorda ssp. *minor* Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 36.

Loc: Prov. Antofagasta (Lever y Mucar), zona altiplánica sobre los 4.200 mts.

aenescens Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 37.

Loc: Prov. Valparaiso (La Ligua).

Subg. *Anthrasomus* Guérin

chevrolati Guérin 1834, Mag. Zool., p. 32. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 229, lám. 9, f. 9. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 187 y 204. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 39.

= *gayi* Solier l. c. 231; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 195.

= *hispidula* Philippi 1864, Stett. Zeit., p. 343.

= *laticollis* Philippi l. c. 343.

Loc: Prov. Coquimbo (Socos, Elqui, Illapel, Tofo); Valparaiso (Quillota); Santiago (San Cristobal, etc.), bajo plantas y piedras.

ssp. *subcostata* Solier l. c. 231; 1851 l. c. 195. – Kulzer l. c. 40.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Cavilolén, Canela Alta); Aconcagua, bajo piedras y arbustos.

ssp. *nigra* Kulzer l. c. 41.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Fray Jorge, Huentelauquen, Quillaycillo); Aconcagua (Papudo), bajo piedras y plantas.

hirtuosa Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 232; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 41/42.

= *pubens* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 339.

Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Santiago (El Canelo, La Obra, El Manzano); Colchagua (zona andina), bajo plantas y piedras en laderas preandinas.

nuda Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 92.

Loc: Prov. Aconcagua.

Subg. *Filotarsus* Solier

tenuicornis Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 339; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 43/44.

Loc: Prov. Coquimbo (Valle rio Elqui), bajo piedras y plantas.

castanea Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 400. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 44.

Loc: Prov. Coquimbo (Rapelcillo); Aconcagua (Chincolco); Santiago (El Canelo, La Obra, El Peumo, San Cristobal), bajo piedras en zona precordillerana.

rufilabris Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 233; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 44/45.

Loc: Prov. Aconcagua; Santiago (Los Maitenes, Lo Valdes), bajo piedras y plantas en zona andina.

uretai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 45/46, f. 4.

Loc: Prov. Santiago (zona andina).

reedi Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 46/47.

Loc: Prov. Santiago (zona andina).

oblonga Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 196. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 47.

Loc: Prov. Antofagasta (Talabre, Tumbre, Salar Punta Negra, Laguna de Lejía, etc.); Coquimbo (Elqui). Bajo piedras y plantas en zonas sobre los 2.500 mts.

forsteri Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 48/49, f. 5.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta (zona andina sobre los 3.500 mts.).

Subg. **Hemipraocis** Kulzer

striolicollis Fairmaire 1833, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), p. 494. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 62.

Prov. Magallanes (Punta Arenas); Aysén (Balmaceda, Rio Galera).

Subg. **Praonoda** Kulzer

bicarinata Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 495. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 66. – Peña 1961. Not. Mens. Stgo. 5, p. 6.

= *silphomorpha* Fairmaire 1833, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 3, p. 495. – Berg 1884, Bull. Fr., p. XCVIII.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes (Laguna Amarga, C° Guido etc.). Zona esteparia, bajo piedras.

Subg. **Orthogonoderus** Solier

cribrata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 233; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 202. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 68/69.

Loc: Prov. Santiago (Lo Valdes, El Canelo); O'Higgins (Las Nieves); Concepción?, en zona preandina y andina, bajo piedras y plantas.

adspersa Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 402. – Kulzer 1958, Ent.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel); Precordillera, bajo piedras y plantas Arb. Mus. Frey 9, p. 69.

- depresicollis** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 402. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 69.
Loc: Prov. Santiago. Lugar desconocido.
- ecostata** Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 69/71, f. 11.
Loc: Prov. Antofagasta (Mucar, Lever, Puripicar). Zona altiplánica sobre 4.000 mts. bajo plantas en planicies.
- subreticulata** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 234; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 198. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 71.
Loc: Prov. Atacama (Freirina); Coquimbo (Los Molles, Punta Teatinos, Quebrada Honda).
- dentipes** Germain 1855. An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 71/72.
= *convexa* Germain l. c. 402.
Loc: Prov. Santiago a Talca (zona andina); Maule (Nogueche). Zona preandina de la Cordillera de Los Andes y Cordillera de la Costa. Bajo troncos en bosques de Nothofagus de altura.
- pleuroptera** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 234; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 200. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 72/73.
Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Valparaíso; Santiago (Calera de Tango, Lo Valdés, Cocalán, El Canelo); Concepción (Contulmo), en zonas precordilleranas y andinas, abiertas y de coironales, bajo plantas y piedras.
- plicicollis** Germain 1855, An. Univ. Chile, p. 403. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 73.
Loc: Prov. Valparaíso (Quillota); Santiago (Chicauma, Leyda, Farellones). En zonas precordilleranas y andinas, bajo piedras y plantas.
- laevicollis** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 338. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 73/74.
= *nitidicollis* Philippi l. c. 337.
Loc: Prov. Santiago a Talca y Valparaíso; Arauco (Cordillera de Nahuelbuta). En zonas de altura, vagando o bajo piedras y plantas.
- ebenina** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 74/75.
Loc: Desconocida.
- picipes** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 403. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 75/76.
= *consobrina* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 339.
= *rotundicollis* Philippi l. c. 340.

Loc: Prov. Santiago (Cerro Ramón, El Manzano). Sobre los 2.500 mts, bajo piedras y arbustos.

costipennis Solier 1951 in Gay Hist. Chile 5, p. 202. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 76.

Loc: Provincias Centrales (?).

rugata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 243; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 200. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 76.

= *sublaevigata* Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Philippi 1860, Reise Wüste Atac., p. 172.

Loc: Prov. Antofagasta (Mucar); Aconcagua (Los Andes); Santiago (Cerro Ramón, El Manzano). Zonas altas, bajo plantas y piedras.

punctata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 236; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 201. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 76/77.

Loc: Prov. Coquimbo (Zona andina).

penai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 79/80, f. 12.

Loc: Antofagasta (Pocos, Cerro Aguas Dulce, Catarape, Salar Punta Negra, Ojos San Pedro etc.). Vagando en zonas arenosas de altura y refugiados bajo plantas. Prov. Curicó (El Coigual) (error).

chilensis (Gray) 1832 in Griff. An. Kingdom 2, p. 783, lám. 124, f. 1. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 188. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 217. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 80/82.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Huasco); Coquimbo?, Valparaíso?. Vagando en arenas.

insularis Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 82.

Loc: Prov. Atacama (Isla Guacolda). Vagando en arenas.

Incerta sedis

pentagona Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 285. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Desconocida (Chile?).

squalida Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 285. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Desconocida (Andes?).

silphoides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 284. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Prov. Santiago (Desconocida).

spinipes Laporte 1840, Hist. Nat., p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 94.

Loc: Desconocida.

Falsopraocis Kulzer

richardae (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 214. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 102/103.

Loc: Prov. Coquimbo (Manquehua, Illapel); Santiago y Aconcagua (zona andina). Bajo piedras.

weiseri Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 103. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Antofagasta (Laguna Lejía). Bajo piedras en zonas altas sobre 4.000 mts.

subnudus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 562/563.

Loc: Prov. Antofagasta (Laguna Verde, Alita). Bajo piedras y plantas en zonas de altura sobre los 4.200 mts.

Pedinini Solier

Opatrinus Latrielle

= *Zidalus* Mulsant & Rey

= *Zodinus* Mulsant & Rey

striatus Guérin 1830, Voy. Coq. 2, 99, f. 4, f. 12 a/e.

Loc: Desconocida.

Blapstinus Waterhouse

= *Aspidius* Mulsant & Rey

= *Lodinus* Mulsant & Rey

= *Heteropus* Laporte

punctulatus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 233, lám. 20, f. 4.

= *nigroaenus* Mulsant & Rey 1859, Ann. Agr. Lyon, p. 195; 1859, Opusc. Ent. 9, p. 131.

= *punctatus* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 469.

Loc: Prov. Coquimbo a Osorno (en muy diversos ambientes, vagando o bajo piedras, palos, plantas etc.).

holosericeus Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 221.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica, Camarones, etc.); Antofagasta (Calama, María Elena, etc.). Por lo general en zonas regadas, bajo piedras, palos etc.

Opatrini Laporte

Ectatocnemis Horn

multilineata Horn 1866, Proc. Phil., p. 400.

Loc: Prov. Coquimbo.

Lepidocnemeplatia Kaszab

1938, Ent. Tidskrift, p. 80.

1942, Mitt. Münch. Ent. Ges. 32, p. 41.

1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, 1966, p. 39.

Loc: indeterminada.

murina Kaszab, l. c., p. 42.= *Cnemeplatia murina* Germain i. l.**Gonocephalum Chevrolat****brevicolle** Philippi 1860, Reise Wüste Atacama, p. 172.

Loc: Antofagasta?

Phalerini Mulsant & Rey**Phaleria** Latreille**gayi** Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 219. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 244, lám. 20, f. 10.= *marginata* Solier l. c. 244.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique). Bajo algas marinas en el litoral.

Phalerisida Kulzer**maculata** Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 564/565.

Loc: Prov. Coquimbo a Aconcagua (bajo algas, etc. en arenales del litoral).

ssp. *flava* Kulzer l. c., p. 565/566, f. 6.

Loc: Prov. Atacama (Río Copiapó), bajo algas marinas en el litoral.

Crypticini Mls. & Rey**Archeocrypticus** Kaszab**patagonicus** Kaszab, Ann. Hist. Hung. 56, p. 364.

Loc: desconocida, probablemente zonas esteparias o andinas de las provincias de Llanquihue y de Aysén.

topali Kaszab l. c., p. 361.

Loc: Prov. Santiago; Concepción.

Bolitophagini Mulsant & Rey**Trachyderas** Philippi**costulata** Fairmaire & Germain 1860, Col. Chilensis 2.= *cancellatum* Philippi 1864, Stett. Zeit., p. 350.

Loc: Prov. Cautín (Cherquenco), a Chiloé (Huillinco, Quellón). Bajo corteza de troncos secos.

D y s a n t i n i Gebien

Phloeopsidius Gebien

angustatus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 242. – Lacordaire 1834,

Gen. Col. 2, p. 360, nota 3.

Loc: Prov. Valdivia.

flexuosus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 241, lám. 20, f. 9. – Lacordaire 1854, Gen. Col. 2, p. 360, nota 3.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, Peñololén); Linares (Fundo Malcho); Arauco y Malleco (Cordillera de Nahuelbuta). Bajo corteza secas.

regularis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 61.

Loc: Prov. Chiloé (Huillinco).

collaris Kulzer 1966, l. c. p. 62.

Loc: Prov. Cautin (Cherquenco).

D i a p e r i n i Geoffroy

Hoplocephala Laporte & Brullé

= *Arrhenoplita* Kirby

= *Evoplus* Leconte

= *Neomida* Latreille

quadrituberculata Curtis 1845, Tr. Lin. Soc. 19, p. 468.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Platydema Laporte & Brullé

= *Neomida* Motschulsky

= *Histeropsis* Chevrolat

= *Typhobia* Pascoe

rubida Chevrolat 1877, Pet. Nouv. 2, p. 178.

Loc: Desconocida.

Enneboeus Waterhouse

bäckströmi Pic 1924, Nat. Hist. Juan Fdz. 3, Zool. p. 380

Loc: Islas de Juan Fernandez.

Ulomini Mulsant**Gnathocerus** Thunberg= *Cerandria* Lucas= *Echocerus* Horn**cornutus** (Fabricius) 1798, Suppl. Ent. Syst. 51.

Loc: Todo el pais (Introducida).

Phanerops Solier**elongata** Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 234, lám. 20, f. 5.

Loc: Prov. Arauco a Chillán y Aysén. Bajo corteza en zonas boscosas.

unicolor Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 405.

Loc: Desconocida.

Tribolium MacLeay**castaneum** (Herbst) 1797, Nat. Syst. 7. – Duran 1952, Ins. Perj. p. 34/37.

Loc: Todo el pais (Introducida).

confusum Duval 1868, Gen. Col. Eur. 181, nota 1. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 34/37.

Loc: Todo el pais (Introducida).

Oligocara Solier**nitidum** Solier 1848, Studi Ent. 227 (81), lám. 10, f. 1/7; in Gay Hist. Chile

5, p. 226, lám. 20, f. 2. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl. Lam. 54, f. 4.

Loc: Prov. Santiago a Chiloé (Zona de bosques de Nothofagus, bajo cortezas y troncos en lugares húmedos).

tibialis Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey. 9, p. 201/202.

Loc: Desconocida.

Alphitobius Stephens= *Cryptops* Solier**ulomoides** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 236, lám. 20, f. 6 a/c.

Loc: Valparaíso (?), seg. Gay.

Doliema Pascal= *Adelina* LeConte**plana** (Fabricius) 1801, Syst. Eleut. 2, p. 94.= *depressa* Erichson 1847, Arch. Nat. 13, 1, p. 119.= *lecontei* Horn 1870, Tr. Am. Phil. Soc. 13, 1, p. 119.= *scidaria* Reitter 1876, Col. Hefte 15, p. 44.

Loc: Todo el pais (Introducida).

E u t e l i n i Lacordaire**Pteroderes** Germain**tuberosa** Germain 1894, An. Univ. Chile 87, p. 446 (4).

Loc: Desconocida.

T e n e b r i o n i n i Redtenbacher**Tenebrio** Linné**molitor** Linné 1758, Syst. Nat., p. 417. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 37/40.

Loc: Todo el País (Introducida).

obscurum Fabricius 1792, Ent. Syst. 111. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 37/40.

Loc: Todo el país (Introducido).

Toxicum Latreille**cribrarium** Blanchard 1851 (gen. dub.) in Gay Hist. Chile 5, p. 441, lám. 26,

f. 10.

Loc: Desconocida.

C y p h a l e i n i Lacordaire**Cyphaleus** Westwood**valdivianus** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 350.

Loc: Prov. Valdivia a Chiloé (en ramas secas dentro del bosque húmedo, entre hojas).

A p o c r y p h i n i Lacordaire**Apocrypha** Eschscholtz= *Compsomorphus* Solier**elegans** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 210, lám. 19. f. 11 a/g.

Loc: Prov. Valparaíso (Algarrobo); Santiago (Lo Valdés, Leyda, Los Maitenes); Linares (Estero de Leiva), Bajo piedras y otros objetos, por lo general en pequeños grupos en zonas abiertas.

ovipennis Kulzer 1962, Ent. Arb. Mus. Frey 13, p. 98/100.

Loc: Prov. Linares (Las Cruces).

A d e l i i n i Lacordaire**Adelium** Kirby= *Tropidopterus* Blanchard**aeneum** Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensis 2, p. 5,

Loc: Prov. Cautín (Cherquenco).

sulcatulum Fairmaire y Germain 1860, Col. Chilensis 2.

Loc: Desconocida.

Misolampini Lacordaire**Heliofugus** Guérin= *Euschatia* Solier= *Heliophygus* AgassizSubg. **Collariheliofugus** Freude

collaris (Germain) 1855, An. Univ. Chile 12, p. 404. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 191. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 126.
Loc: Prov. O'Higgins (Rancagua); Temuco?

cryptocephalus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 248/349. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 192. – Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 126/128.

Loc. Prov. Colchagua (zona andina).

ssp. **curicoensis** Freude l. c. 128.

Loc: Prov. Curicó (El Coigual). Bajo troncos caídos o cortezas en bosques de Nothofagus.

Subg. **Rugosiheliofugus** Freude

sulcatus (Gemminger) 1870, Col. Heft. VI, p. 123. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 192. – Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 128/129.

= *sulcatus* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 230.

Loc: Santiago (Quebrada de Macul, Rio Molina, El Canelo, Cerro Ramón etc.). Zona preandina y andina bajo cortezas o en el cuello de plantas, o bajo troncos.

Subg. **Inscutoheliofugus** Freude

kuscheli Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 130/131.

Loc: Desconocida.

Subg. **Heliofugus** sensu stricto

sulcatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 27, f. 113. – Bréme 1842, Rev. Zool. 113 (23). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 197. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 131/132.

Loc: Desconocida.

impressus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 27. – Bréme 1842, Rev. Zool., p. 113 (23). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 194. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 132/135.

Loc: Prov. Maule a Llanquihue (en bosques de Nothofagus, bajo corteza o troncos).

ssp. **punctatus** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 228/229, lám. 20, f. 3 a/e. – Freude l. c. 135.

Loc: Prov. Santiago?; Linares; Nuble; Malleco (zona precordillerana, bajo cortezas, troncos etc., en bosques).

ssp. **cribricephalus** Freude 1960, l. c. 160.

Loc: Desconocida.

punctatostriatus (Fairmaire & Germain) 1861, Col. Chilensis, p. 5. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 194. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 136.

Loc: Desconocida.

tenuipunctatus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 349. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 136/137.

Loc: Prov. Colchagua (zona andina).

laticollis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 230. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 193. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, p. 137/139.

Loc: Desconocida (Provincias centrales).

cribriceps Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 196. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 139/140.

Loc: Valdivia.

penai Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 140/141.

Loc: Prov. Santiago (Alhué), en bosques de Nothofagus, bajo cortezas y troncos en zonas altas.

ssp. **ohigginsi** Freude l. c., p. 141.

Loc: Prov. O'Higgins (Cerro Poqui). En bosques de Nothofagus, bajo palos y cortezas, en zonas altas.

colasi Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 142.

Loc: Desconocida.

sulcipennis (Germain) 1855, An. Univ. Chile 12, p. 404. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 142/143.

Loc: Prov. Chillán; Santiago (Aculeo).

ssp. **brevipennis** Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 197/198. – Freude l. c. 143.

Loc: Prov. Santiago.

barossi Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 143.

Loc: Prov. Santiago (Alhué); Valparaíso (Quillota).

ventriosus Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, p. 144/146.

Loc: Prov. O'Higgins (Cerro Poqui). Bajo cortezas y ramas en bosques de Nothofagus, en alturas.

proximoides Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 146/147.

Loc: Prov. Colchagua (Nancagua). En zonas de basques.

ssp. rotundangulus Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 147.

Loc: Prov. Coquimbo (Quebrada de Amolanas). En el cuello de plantas en zonas desérticas.

leechi Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 147/148.

Loc: Prov. Curicó (Buchén, El Coigual). Bajo corteza y troncos en bosques de Nothofagus en planicies sobre los 800 mts.

ssp. maulensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 148.

Loc: Prov. Maule (Tregualemu). En bosques de Nothofagus de la zona costera, bajo troncos o cortezas.

quillotaensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 148/150.

Loc: Prov. Valparaíso (Quillota, Los Perales). En zonas boscosas, bajo cortezas y troncos.

biobioensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 149.

Loc: Prov. Ñuble (Cordillera de Curicó). Bio Bio.

fairmairei Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 150/151.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, El Manzano, Peñalolén, Guayacán); O'Higgins (Bosque de Los Conservadores). Bajo cortezas y troncos.

arenosus Guérin 1830, Voy. Coq. Zool. t. II, p. 96/97, lám. IV, f. 6. – Bréme 1842, Rev. Zool. 112 (22). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 199. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 151/152.

= *parvus* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 229.

Loc: Prov. Maule (Constitución, Chovellén, Tregualemu); Ñuble (Cobquecura); Concepción (Dichato); zona costera, bajo palos y basuras a orilla del mar, en lugares arenosos.

coquimbensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 152/153.

Loc: Prov. Coquimbo (Bosque de Fray Jorge, Bosque de Talinay). Bajo palos o cortezas.

rossi Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 153/154.

Loc: Prov. Arauco y Malleco (Cordillera de Nahuelbuta); Malleco (Icalma); Cautín (Cherquenco). En zonas de Araucaria araucana, bajo corteza y troncos.

proximus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 229. – Fairmaire 1875, Ann.

Soc. Ent. Fr., p. 198 (nota). — Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 154/155.

Loc: Prov. Santiago; Maule (Tregualemu); Linares (Estero de Leiva); Concepción.

ssp. *punctatosulcatus* Fairmaire l. c. 197. — Freude l. c. 155.

Loc: Prov. Nuble (San Carlos).

germaini Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 157/158.

Loc: Prov. Curicó a Ñuble (Zona preandina). En bosques de Nothofagus, bajo palos o cortezas.

Myrmecodema Gebien

= *Myrmecosoma* Germain

nycterinoides (Germain) 1955, An. Univ. Chile 12, p. 404. — Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 161/162.

Loc: Santiago (El Canelo, Peñalolén, Quebrada de Macul); O'Higgins (Las Nieves); Curicó (Palos Negros). En zonas altas sobre el límite de bosques, bajo piedras y raíces de plantas.

kochi Kulzer 1950, Ent. Arb. Mus. Frey 1, p. 29/30. — Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 162.

Loc: Desconocida.

michelbacheri Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 163/165.

Loc: Prov. Coquimbo (Bosques de Fray Jorge y de Talinay, Huaquén, Pichidangui). Bajo palos y cortezas en bosques húmedos.

Helopini LeConte

Parahelops Waterhouse

darwini Waterhouse 1875, Tr. Lond., p. 334. — Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 48, lám. 2, f. 2. — Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 605/606.

Loc: Prov. Aysén y Magallanes (zona insular y de bosques) (Isla Tierra del Fuego, Isla Wellington, Puerto Edén, Islas Hermites etc.), bajo palos.

angulicollis Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. 6 (5), p. 56; 1891, Miss. Sc. Cap. Horn. VI, 2, p. 51, lám. 2, f. 3. — Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 606/607.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego), bajo palos en bosques.

pubescens Waterhouse 1875, Tr. Lond., p. 334. — Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 49, lám. 2, f. 2. — Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 607/609, lám. 1.

= *seriatus* Kolbe 1907, Erg. Hamb. Mag. Samm. 8, 4, p. 114.

Loc: Prov. Magallanes (Isla de Navarino, Isla Hoste, Isla Picton, Tierra del Fuego). Bajo palos en bosques.

kuscheli Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 611/612.

Loc: Prov. Magallanes (Co. Guido, Cerro Cazador).

Hydromedion Waterhouse

= *Mylops* Fairmaire

variegatus Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 336. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 617/619.

Loc: Prov. Magallanes (Isla Wellington, Puerto Edén).

anomocerum Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, p. 54. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 619.

Loc: Prov. Magallanes (Canal Beagle: Isla Picton, Navarino y Cabo Snipe).

elongatum Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 333. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 619/621.

= *distinguendum* Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 53.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

magellanicum (Fairmaire) 1883, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 3, p. 500. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 621/622.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego, Puerto Williams, Sur de Cameron, Porvenir).

oblongiusculum (Blanchard) 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 171, lám. 11, f. 13. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 623.

Loc: Prov. Magallanes (Puerto Hambre).

Chanopterus Boheman

= *Chitoniscus* Waterhouse

paradoxus Boheman 1858, Resa Eugenia, p. 98. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 625/626.

= *brevipennis* Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 331.

= *brevissimus* Fairmaire 1891, Miss. Sc. Cap. Horn VI, 2, Col., p. 39.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Brachyhelops Fairmaire

hahni Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 57; 1891, Miss. Sc. Cap. Horn VI, p. 53, lám. 2, f. 5. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 626/628, lám. 6.

Loc: Prov. Magallanes (Bahía Orange, Isla Bertrand).

Dolphus Blanchard

globipennis Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 171, lám. 11, f. 12.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Strongylini Lacordaire**Homocyrtus** Reitter

= *Cyphonotus* Guérin

= *Schlinkus* Lucas

bonni (Germain) 1897, An. Univ. Chile 97, p. 283 (11).

Loc: Desconocida.

dives (Germain) 1855, An. Univ. Chile, p. 405, op. cit. 97; 1897, p. 284 (12).

Loc: Prov. Curicó a Valdivia, Valparaíso? (en bosques, sobre ramas de arbustos y de árboles).

dromedarius (Guérin) 1830, Voy. Coq. 2, p. 103, lám. 5, f. 4. – Laporte 1840, Hist. Nat. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 263, lám. 21, f. 6. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl., lám. 58, f. 3. – Germain 1855, Ann. Univ. Chile 97, p. 281 (9).

Loc: Prov. Arauco a Aysén (en bosques sobre ramas).

Cuphotes Champion

= *Phygoscotus* Schulz

= *Spheniscus* Kirby

mercurius (Thomson) 1897, Phys. I. 2, p. 132.

Loc: Prov. Chillán (Atacalco); Linares (Malcho); Bio-Bio y Malleco (zona preandina). Sobre ramas de árboles y arbustos.

INDEX

Subfamilias, Generos, Subgeneros

- Achanius Er. 404
Adeliini Lac. 440
Adelina LeConte 439
Adelium Kirby 440
Alhuena Klzr. 407
Alphitobius Steph. 439
Ammophorus Guér. 408
Anthrasomus Guér. 432
Apocrypha Esch. 440
Apocryphini Lac. 440
Ardseocrypticus Kasz. 437
Arrhenoplita Kirby 438
Arthroconus Sol. 404
Aryenis Bates 404
Asidelia Fairm. 428
Aspidius Muls. & Rey 436
Aspidolobus Redt. 404
Aulacodera Gemm. & Har. 419
Auladera Sol. 419

Blapstinus Wat. 436
Bolitophagini Muls. & Rey 437
Brachyhelops Fair. 445

Callyntra Sol. 414
Cerandria Luc. 439
Cerostena Sol. 418
Chanopterus Boh. 445
Chitoniscus Wat. 445
Collariheliofugus Freude 441
Coelus Sol. 428
Compsomorphus Sol. 440
Cordibates Klzr. 406
Crypticini Muls. & Rey 437
Cryptops Sol. 439
Cupholes Champ. 446
Cyphaleini Lac. 440
Cyphaleus West. 440
Cyphonotus Guér. 446

Deroplatys Sol. 402
Diaperini Geoff. 438

Diastoleus Sol. 421
Dysantini Geb. 438
Discopleurus Lac. 407
Doliema Pasc. 439
Dolphus Bl. 446

Echocerus Horn 436
Ectatocnemis Horn 436
Edrotinus Fairm. 406
Eleodini Esch. 424
Emmalodera Sol. 424
Enneboeus Wat. 438
Entomochilus Sol. 426
Epipedonota Sol. 414
Epitragini Lac. 402
Eremoecus Lac. 407
Eurimetopini Cas. 404
Euschatia Sol. 441
Eutelini Lac. 440
Evaniosomini Lac. 404
Evoplus Lac. 438

Falsopraocis Klzr. 436
Filotarsus Sol. 432

Geoborus Bl. 402
Gnathocerus Thunb. 439
Gonocephalium Chevr. 437
Grammicus Wat. 407
Gymnognathus Sol. 404
Gyriosomus Guér. 408

Heliofugus Guér. 441
Heliophygus Agassis 441
Helopini Lac. 444
Hemipraocis Klzr. 433
Heteropus Lap. 436
Hexagonochilus Sol. 408
Histeropsis Chevr. 438
Homocyrtus Reitt. 446
Hoplocephala Lap. & Brullé 438
Hydromedion Wat. 445

- Hylithus* Guér. 405
Hyperops Sol. 407
Hypselops Sol. 404
- Inscutoheliofugus* Freude 441
- Lepidocuemeplatia* Kasz. 437
Lodinus Muls. & Rey 436
- Megalophrys* Wat. 407
Melaphorus Guér. 404
Mesopraocis Klzr. 431
Misolampini Lac. 441
Mitragenius Sol. 420
Mylops Fairm. 445
Myrmecodema Geb. 444
Myrmecosoma Germ. 444
- Neomida* Mots. 438
Neomida Latr. 438
Neopraocis Klzr. 428
Nyctelia Latr. 412
Nycteliini Sol. 408
Nyctelioma Casey 412
Nycterinus Esch. 424
Nyctopetus Guér. 402
Nyctoporini Lac. 408
- Oligocara* Sol. 439
Omopheres Cas. 404
Opatriini Lap. 436
Opatriinus Latr. 436
Orthogonoderus Sol. 433
- Parahelops* Wat. 444
Parepitragus Cas. 404
Pedinini Sol. 436
Peltolobus Lac. 407
Phaleria Latr. 437
Phaleriini Muls. & Rey 437
Phalerisida Klzr. 437
Phanerops Sol. 439
Philorea Erich. 425
Ploepsidius Geb. 438
Phygoscotus Sch. 446
- Physogaster* Guér. 426
Physogasterini Lac. 425
Pilobalia Burm. 420
Platesthes Wat. 428
Platydema Lap. & Brullé 438
Pleurophorus Sol. 407
Polpocara Sol. 425
Postpraocis Klzr. 431
Praocini Sol. 428
Praocis Esch. 428
Praonoda Klzr. 433
Psammetichus Latr. 420
Psectrascelis Sol. 417
Pseudeothinobatis Fr. 406
Pteroderes Germ. 440
- Rugosiheliofugus* Freude 441
- Salax* Guér. 406
Schlinkus Lucas 446
Scotobiini Lac. 420
Scotobius Germar 421
Selenoma Sol. 408
Spheniscus Kirby 446
Stenholma Sol. 404
Stenosini Lac. 407
Strongyliini Lac. 446
- Tenebrio* L. 440
Tenebrionini Redt. 440
Thinobatini Lac. 405
Thinobatis Esch. 405
Toxicum Latr. 440
Trachyeras Phil. 437
Tribolium McLeay 439
Tribolocara Lac. 406
Trilobocara Sol. 406
Trimytiini Cas. 406
Trinobatis Lap. 405
Tropidopterus Bl. 440
Typhobia Pascoe 438
- Ulomini* Muls. 439
- Zidalus* Muls. & Rey 436
Zodinus Muls. & Rey 436

Especies, Subespecies

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| abdominalis Esch. | 424 | brevicornis Klzr. | 426 |
| abbreviatus Phil. | 424 | <i>brevicornis</i> (Sol.) | 405 |
| acuminatus Reitt. | 407 | <i>brevipennis</i> Fairm. | 442 |
| adspersa Germ. | 433 | <i>brevipennis</i> Waterh. | 445 |
| aenea Sol. | 430 | <i>brevipes</i> Klzr. | 426 |
| <i>aeneipennis</i> Germ. | 430 | <i>brevipes</i> Waterh. | 423 |
| aenescens Klzr. | 432 | <i>brevis</i> Phil. | 424 |
| aeneum Fairm. & Germ. | 440 | <i>brevis</i> Sol. | 417 |
| aequalis Fairm. | 417 | <i>brevissimus</i> Fairm. | 445 |
| <i>affinis</i> Reed. | 409 | <i>bridgesi</i> Wat. | 409 |
| akidiodes Wat. | 421 | <i>bullatus</i> Curt. | 422 |
| <i>alticola</i> Kirch. | 420 |
 | |
| alutacea Klzr. | 418 | <i>calderana</i> Klzr. | 431 |
| amabilis Klzr. | 410 | <i>calderana</i> Klzr. | 406 |
| andicola (Lac.) | 419 | <i>cancelatum</i> Phil. | 437 |
| andina Germ. | 416 | <i>carbonaria</i> Phil. | 416 |
| <i>angulicollis</i> Fairm. | 444 | <i>carbonarius</i> Phil. | 402 |
| <i>angulifera</i> Phil. | 431 | <i>carinatus</i> Phil. | 402 |
| <i>angusta</i> Phil. | 430 | <i>carinatus</i> Sol. | 409 |
| <i>angustata</i> Burm. | 416 | <i>carinatus</i> Sol. | 421 |
| <i>angustatus</i> (Sol.) | 438 | <i>cariosicollis</i> Fairm. | 417 |
| <i>angustus</i> Phil. | 410 | <i>castanea</i> Germ. | 432 |
| <i>angusticollis</i> Phil. | 425 | <i>castaneum</i> (Herb.) | 439 |
| <i>anomocerum</i> Fairm. | 445 | <i>chevrolati</i> Guér. | 432 |
| <i>antarcticum</i> Fairm. | | <i>chilensis</i> (Gray) | 435 |
| <i>antarcticus</i> Guér. | 422 | <i>chilensis</i> Klzr. | 406 |
| <i>anthracina</i> Germ. | 415 | <i>chilensis</i> Wat. | 407 |
| <i>araneiformis</i> Curt. | 420 | <i>ciliata</i> Germ. | 429 |
| <i>arenaria</i> Germ. | 418 | <i>ciliata</i> Sol. | 406 |
| <i>arenosus</i> Guér. | 443 | <i>cinerea</i> Sol. | 419 |
| <i>argentinus</i> Freude | 402 | <i>colasi</i> Freude | 442 |
| <i>asperatus</i> Erich. | 422 | <i>collaris</i> Guér. | 421 |
| <i>atacamensis</i> Fairm. | 409 | <i>collaris</i> (Germ.) | 441 |
| <i>atacamensis</i> Germ. | 423 | <i>collaris</i> Klzr. | 427 |
| <i>atacamensis</i> Kasz. | 405 | <i>collaris</i> Klzr. | 438 |
| <i>atronitens</i> Klzr. | 420 | <i>confinis</i> Klzr. | 418 |
| <i>audouini</i> Sol. | 429 | <i>confusa</i> Sol. | 430 |
|
 | | <i>confusum</i> Duval | 439 |
| <i>bäckströmi</i> Pic | 438 | <i>consobrina</i> Phil. | 434 |
| <i>barriai</i> Klzr. | 410 | <i>contracta</i> Fairm. | 428 |
| <i>barrosi</i> Freude | 442 | <i>convexa</i> Germ. | 434 |
| <i>batesi</i> Fairm. | 409 | <i>coquimbensis</i> Freude | 443 |
| <i>bicarinata</i> Burm. | 433 | <i>cordicollis</i> Kirsch | 407 |
| <i>bicarinatus</i> Sol. | 421 | <i>coriaceus</i> Fairm. | 412 |
| <i>bicostata</i> Phil. | 430 | <i>cornutus</i> (Fabr.) | 439 |
| <i>bicostatus</i> Klzr. | 422 | <i>corrugata</i> Curt. | 414 |
| <i>biobioensis</i> Freude | 443 | <i>costata</i> Sol. | 429 |
| <i>bonni</i> (Germ.) | 446 | <i>costatula</i> Sol. | 431 |
| <i>bremei</i> Wat. | 414 | <i>costatus</i> Bl. | 402 |
| <i>brevicollis</i> Klzr. | 406 | <i>costatus</i> Guér. | 408 |
| <i>brevicolle</i> Phil. | 437 | <i>costatus</i> Guér. | 420 |

- costatus Guér. 422
 costipennis Sol. 435
 costulata Fairm. & Germ. 437
costulatus Phil. 425
 crassescostata Fairm. 413
 crassicornis Wat. 421
 crassicosta Fairm. 419
 crassiventris Klzr. 417
 crassus Klzr. 422
 crenicollis Phil. 423
 crenicosta Guér. 419
 cibrarium Bl. 440
 cibrata Sol. 433
 cibriceps Fairm. 442
 cibricephalus Freude 442
cibricollis Fairm. 423
crispaticollis Fairm. 408
 cryptocephalus Phil. 441
 curicoensis Freude 441
 curta Sol. 429
 curtisi Fairm. 412
 curtisi Sol. 431
 curvidens Klzr. 424
curvilineatus Guér. 408

 darwini Waterh. 413
 darwini Waterh. 444
 davidi Klzr. 418
 decorata Erich. 420
 dentipes Germ. 434
 depressa (Guér.) 428
depressa Erich. 439
 depressicollis Germ. 434
 difficilis Klzr. 418
 dilaticollis Sol. 408
distinguendum Fairm. 445
 dives Germ. 446
 dromedarius (Guér.) 446

 ebenina Germ. 434
 ecostata Klzr. 434
 elegans Bl. 420
 elegans Klzr. 404
 elegans (Sol.) 440
 elongata Sol. 417
 elongata Sol. 439
 elongatus Sol. 404
elongatus Sol. 425
 elongatum Waterh. 445
 elongatus Waterh. 408
elliptica Phil. 430
 emarginicollis Klzr. 423
 erotyloides Lac. 407

 eschscholtzi (Sol.) 407
expansicollis Fairm. 415

 fairmairei Fr. 443
 ferruginea Esch. 405
 fitzroyi Waterh. 412
 flava Wat.
 flava Klzr. 431
 flava Klzr. 437
 flexuosus (Sol.) 438
 forsteri Klzr. 433
 forsteri Kasz. 405
fossulatus Sol. 412
foveopunctatus Fairm. 411
 freyi Geb. 411
 fuscus (Sol.) 405

 gaudichaudi (Lap.) 403
 gayi Lap. 437
gayi Sol. 432
 gayi Sol. 422
 gebieni Klzr. 408
 gebieni Klzr. 421
 genei Sol. 424
 geometrica Fairm. 413
 germaini Freude 444
 gibbosus Bl. 420
 globulus Fairm. & Germ. 426
 globipennis Bl. 446
gracilipes Phil. 424
 gracilis Erich. 421
granocostata Fairm. 424
granocostatus Fairm. 411
 granulata Waterh. 414
granulosa Gemm. 414
 guerini Sol. 417

 haagi Klzr. 426
 hahni Fairm. 445
 hirtella Klzr. 429
hirticollis Sol. 431
 hirtipes Klzr. 427
 hirtipes Klzr. 424
 hirtuosa Sol. 432
hispidula Phil. 432
 holosericeus Lap. 436
 hopei Gray 410
 humilis Erich. 405

 illapelensis Freude 402
 impressicollis Germ. 419
 impressus Guér. 412
 impressus Guér. 441

- incertus* Sol. 410
inmaculata Bl. 420
insularis Klzr. 435
intermedia Phil. 405
interrupta Sol. 429
intricaticollis Fairm. 417
jugeleti Wat. 419
- kaszabi* Freude 402
kingi Reed 409
kirbyi Sol. 422
kochi Klzr. 444
kuscheli Freude 441
kuscheli Klzr. 406
kuscheli Klzr. 418
kuscheli Klzr. 426
kuscheli Klzr. 428
kuscheli Klzr. 445
- lacordairei* Guér. 406
laevicollis Phil. 434
laevicosta Curt. 431
laevigatus Guér. 411
laevigatus Phil. 425
laevipennis (Sol.) 427
laevis Klzr. 411
laevis Klzr. 427
laevis Waterh. 413
laeviuscula Phil. 423
lata Waterh. 416
laticollis Phil. 432
laticollis Phil. 402
laticollis Phil. 415
laticollis (Sol.) 442
lecontei Horn 439
leechi Freude 403
leechi Freude 443
leechi Klzr. 410
lineatus Guér. 412
lividipennis (Bl.) 403
longeplicata Fairm. 414
lucens Klzr. 411
luczoti Chevr. 408
- macrocosta* Guér. 416
maculata Klzr. 437
maculipennis (Lap.) 403
magellanicum (Fairm.) 445
major Germ. 416
mannerheimi Fischer 429
mannerheimi Sol. 425
manni Freude 403
marginata Germ. 431
- marginata* Sol. 437
marmoratus Waterh. 410
maulensis Freude 443
melcheri Freude 406
melcheri Klzr. 412
mercurius (Thom.) 446
michelbacheri Freude 444
minor Klzr. 427
minor Klzr. 431
minuta Sol. 405
modestus Klzr. 412
molitor L. 440
monilis Lac. 416
multicostata Guér. 414
multicristata Bl. 414
multilineata Horn 436
multipunctata Curt. 424
murina Kasz. 437
murina Germ. 437
- neuquensis* Freude 402
niger Germ. 402
nigra Klzr. 428
nigra Klzr. 432
nigroaenea Sol. 429
nigroaenus Muls. & Rey 436
nitens Klzr. 424
nitens Klzr. 427
nitens Klzr. 431
nitidicollis Phil. 434
nitidum Sol. 439
nitidus Klzr. 426
nitidus Phil. 402
nuda Klzr. 432
nycterinoides (Germ.) 444
- obesa* Guér. 424
oblonga Bl. 420
oblonga Sol. 404
oblonga Sol. 433
oblongiusculum (Bl.) 445
oblongulus Fairm. 426
obscurum Fabr. 440
obscurus Klzr. 422
ohausi (Klzr.) 406
o'higginsi Freude 442
opaca Kirsch 420
ovipennis Klzr. 440
- paradoxus* Boh. 445
paralella Germ. 418
parva Sol. 430
parvus Phil. 402

- parvus* Sol. 410
parvus (Sol.) 427
parvus Sol. 443
patagonica (Wat.) 407
patagonicus Kasz. 437
paulseni Fairm. 411
paulseni Fairm. 415
penai Freude 403
penai Freude 406
penai Freude 442
penai Kasz. 405
penai Klzr. 404
penai Klzr. 409
penai Klzr. 415
penai Klzr. 417
penai Klzr. 421
penai Klzr. 425
penai Klzr. 426
penai Klzr. 435
penai Klzr. 407
peniciliger Geb. 411
pentachorda Phil. 431
pentagona Lac. 435
peruvianus Guér. 408
piceus Klzr. 404
piceus Sol. 405
picipes Germ. 434
piliger Redt. 404
pilipes Guér. 417
pilipes Guér. 421
pilosa Sol. 418
pilosipes Klzr. 418
pilosula Klzr. 425
pilosus Phil. 402
pilosus Sol. 426
pilula Lap. 431
plana (Fabr.) 439
planatus Erich. 423
planatus Sol. 409
planicollis Geb. 409
planicosta Guér. 423
planiuscula Fairm. 416
planiuscula Fairm. 416
pleuroptera Sol. 434
plicata Waterh. 413
plicicollis Germ. 434
plicicollis Sol. 419
porteri Brêthes 404
proximoides Freude 443
proximus (Sol.) 443
pubens Phil. 432
pubescens Phil. 431
pubescens Wat. 444
pudens Klzr. 419
pulverulentus Erich. 404
pumilus Klzr. 411
punctata Sol. 435
punctatellus Bl. 423
punctostriatus Fairm. & Germ. 442
punctatosulcatus Fairm. 444
punctatus Curt.
punctatus Curt. 436
punctatus Esch. 422
punctatus (Sol.) 442
punctulatus Sol. 436

quadratus Klzr. 427
quadricollis Germ. 425
quadricollis Lap. 403
quadricollis (Sol.) 407
quadrисulcata Germ. 429
quadrituberculata Curt. 438
quillotaensis Freude 443

rectestriata Fairm. 413
reedi Klzr. 410
reedi Klzr. 433
reflexicollis (Sol.) 428
regularis Klzr. 438
rengensis Freude 402
richardae (Sol.) 436
riverai Klzr. 415
rossi Freude 403
rossi Freude 443
rossi Klzr. 415
rossi Klzr. 425
rotundangulus Freude 443
rotundata Lac. 429
rotundicollis Phil. 434
rotundicollis Waterh. 406
rouleti Sol. 407
rubida Chevr. 438
rubripes Phil. 403
rubripes Sol. 408
rufilabris Sol. 433
rufipes Esch. 428
rufipes Sol. 405
rufipes Sol. 415
rufipes (Sol.) 424
rufitarsis Sol. 430
rugata Sol. 435
rugiceps Curt. 425
rugicollis Phil. 419
rugicollis Sol. 423
rugipennis (Sol.) 402
rugipennis Germ. 429

- rugosa* (Sol.) 415
rugosa Wat. 415
rugosulus Guér. 422
rugosus Klzr. 427
rugulosa Gemm. 415
- salax* Lac. 406
sanguinolenta Sol. 429
scidaria Reit. 439
semipunctatus Sol. 410
semistrigosa Fairm. 418
seriatus Kolbe 444
servillei (Sol.) 415
setifer Klzr. 426
setipennis Lesn  426
silphoides Lac. 435
silphomorpha Fairm. 433
similis Klzr. 428
similis Klzr. 419
solieri Waterh. 413
spinipes Lap. 435
spinolai Sol. 430
spinolai Sol. 424
squalida Lac. 435
stephensi Wat. 413
striatus Gu r. 436
strigosula Geb. 418
striolicollis Fairm. 433
subaenea Erich. 430
subcostata Germ. 418
subcostata Sol. 432
subdepressa Sol. 417
sublaevicollis Sol. 418
sublaevigata Germ. 435
submetallica Gu r. 430
subnudus Klzr. 436
subplana Geb. 416
subreticulata Sol. 434
subrugatus Fairm. 410
substriatus Gu r. 423
substriatus Sol. 425
subsulcata Sol. 430
- sulcata* Esch. 429
sulcatulus (Gemm.) 441
sulcatulum Fairm. & Germ. 440
sulcatus Gu r. 441
sulcatus Sol. 441
sulcicollis Sol. 417
sulpipennis (Germ.) 442
- tenebrioides* Gu r. 403
tentyroides Lac. 405
tenuicornis Sol. 432
tenuipunctatus Phil. 442
thoracicus Esch. 425
tibialis Klzr. 439
tibialis Sol. 430
tomentosus (Gu r.) 427
topali Kasz. 437
tricostata Burm. 416
tristis Klzr. 420
tuberculatus Germ. 408
tuberosa Germ. 440
- ulomoides* (Sol.) 439
unicolor Bl. 404
unicolor Germ. 439
unicosta Fairm. 414
unicosta (Sol.) 416
uretai Klzr. 433
- valdivianus* Phil. 440
varipes Fairm. 414
variegatus Waterh. 445
varius Klzr. 427
ventriosus Freude 443
vicina Sol. 415
vulcanica Fairm. 413
vulgaris Gu r. 423
- waterhousei* Bates 407
weiseri Klzr. 436
withei Sol. 409
withei Waterh. 409

Anschrift des Verfassers:

Luis e. Pe a, Casilla 2974, Santiago de Chile



BHL

Biodiversity Heritage Library

Peaa G, L E. 1966. "Catalogo De Los Tenebrionidae (Coleoptera) De Chile." *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey Tutzing bei München* 17, 397–453.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/173049>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/143684>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In Copyright. Digitized with the permission of the rights holder

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.