NOTE XXXVIII.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE EUCAMPTOGNATHUS, CHAUD.

PAR

J. R. H. NEERVOORT van de POLL.

Eucamptognathus fulgidicinctus, v. d. Poll.

Niger, capitis pars superior, vitta lata utrinque prothoracis et elytrorum interstitiae 4—7 *laete cupreae, aureo-internitentes. Caput impunctatum. Prothorax linea media longitudinali obsoleta, ad basin utrinque impressione paullo profunda, antice posticeque emarginatus, lateraliter pone medium paullisper emarginatus, apicem versus rotundato-angustatus. Elytra disco plano, in medio nonnihil dilatata, proinde rotundato-attenuata, interstitiarum* 3tiae *et* 5tae *pars posterior elevata, carinam acutam efficiens, interstitia* 7ma *magis elevata, antice posticeque acuta, juxta margines punctis aliquot instructa, ceterum impunctata. Subtus glaber, segmentis abdominis in medio punctis geminis setiferis.*

Long. 28 mm., lat. 9 mm.

Hab. Madagascar. — In mus. nostro.

Le dessus de la tête avec l'épistôme, une large bande de chaque côté du corselet, allant d'un bout à l'autre et les 4me—7me intervalles des élytres sont d'une couleur rouge-cuivreuse brillante, avec des reflets dorés, tout le reste du corps, y compris le rebord latéral du corselet, d'un noir profond et très brillant.

Tête glabre, avec l'épistôme faiblement émarginée et avec deux impressions longitudinales peu marquées sur le front.

Corselet avec une faible ligne médiane, les fossettes des côtés de la base larges mais peu profondes, la base et la marge frontale assez fortement échancrées, les côtés au dessous du milieu faiblement émarginés, arrondis en s'atténuant un peu vers l'apex.

Elytres assez planes sur le disque, quelque peu élargies vers le milieu, arrondies postérieurement, l'extrémité des troisième et cinquième intervalles relevée en carène assez tranchante, tout le septième intervalle est plus relevé que les autres, avec la partie antérieure et postérieure tranchante, une rangée de quelques points éparses lelong du bord latéral, tout le reste imponctué.

Le dessous est glabre, les segments abdominaux chacun avec un couple de points sétifères au milieu.

Cette espèce est très voisine de l'*E. Lafertei* Chevr., mais elle en diffère par sa stature plus petite, sans être comparativement plus étroite, d'où résulte sa forme trapue, en outre les côtés du corselet sont plus faiblement arrondis en avant, l'échancrure de la base, de la marge frontale, et des côtés est moins profonde, les élytres sont plus planes sur le disque, plus dilatées au milieu, enfin la couleur cuivreuse occupe un nombre plus grand des intervalles des élytres.

Neervoort van de Poll, J. R. H. 1886. "Description d'une espèce nouvelle du genre Eucamptognathus, Chaud." *Notes from the Leyden Museum* 8, 229–230.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/37333
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/150603

Holding Institution
Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by
Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse
Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 16 April 2022 at 10:25 UTC