

glänzender als der übrige Metathorax, in der Mitte längsrundlich, hinten durch eine deutlichere Leiste begrenzt als beim ♀. Während beim ♀ der Petiolus sich allmählich in den Postpetiolus verbreitert, sodaß beim ♀ der Postpetiolus am Ende am breitesten ist, ist beim ♂ der Postpetiolus plötzlich verbreitert, fast quadratisch und wird nach dem Ende zu nicht breiter, sondern hat von den Luftlöchern an nach hinten fast parallele Seitenränder. Zweites Segment beim ♂ fast um ein Drittel länger als breit, die übrigen Segmente quer, aber nicht so schmal wie beim ♀. 4. Segment ohne Bauchfalte. Seitenränder der Segmente 3—5 beim ♂ parallel. Gastrocoelen beim ♂ deutlicher als beim ♀, aber nicht tief, etwas glänzend. Hinterleib schwarz, Vorderecken und Seitenrand des 3. Segmentes deutlich bleichgelb, Vorderrand dieses Segmentes sowie Mitte des Vorderrandes des 2. Segmentes zwischen den Gastrocoelen undeutlich bleichgelb. Beine wie beim ♀, jedoch sind die vorderen und mittleren Schenkel unten am Grunde schwärzlich, alle Trochanteren am Ende mit deutlichem gelben Rande, die Hintertarsen einfarbig eigelblich ohne dunklere Gliederenden.

♂ 16 mm, ♀ 14 mm.

Beide Geschlechter wurden von Herrn Eberhard Jäckh-Bremen am 19. August 1926 am Stillupp-Gletscher in den Tiroler Alpen bei ca. 2400 m gefangen.

Typen in meiner Sammlung.

Systematische Zusammenstellung einer Sammel- ausbeute aus Transbaikalien und dem Ussuri- gebiete. (Col.)

Von Prof. Karl Mandl, Wien.

II. Teil.¹⁾

Der erste, weitaus umfangreichere Teil dieser Zusammenstellung einer durch meine Kriegsgefangenschaft bedingten Sammelausbeute ist vor Jahren (1931) in der Wiener Entomologischen Zeitung erschienen. Der vorliegende zweite Teil umfaßt größtenteils dort noch nicht behandelte Familien, aber auch Nachträge zum ersten Teil, die erst nach dessen Drucklegung

¹⁾ I. Teil veröffentlicht in Wien. Ent. Ztg., 48. Bd., 1. Heft, S. 1—28.

bestimmt worden sind, außerdem auch Fundortnachträge. Als Anhang ist eine Zusammenstellung von Druckfehlern, Auslassungen und Verbesserungen gegeben.

Abkürzungen der Fundortangaben:

N = Nikolsk-Ussurijsk, in der russischen Küstenprovinz am japanischen Meer, etwa 200 km von der Küste entfernt, am Sui-fun gelegen.

W = Werchne-Udinsk, am Zusammenfluß der Selenga und der Uda in Transbaikalien, jetzt in Ulan-Ude umbenannt.

T = Tschita, an der Ingoda im östlichen und

Tr = Troitzkossawsk, im südlichen Transbaikalien gelegen.

Alle übrigen Fundorte sind ausgeschrieben.

Die Arten sind nach dem Catalogus Coleopterum regionis palaearcticae von A. Winkler geordnet. Arten, die nach diesem Katalog in dem in Rede stehenden Faunengebiet noch nicht aufgefunden wurden, sind gesperrt, neue Arten und Formen fett gedruckt. Bei letzteren ist der Ort der Veröffentlichung angegeben.

Cicindelidae.

Cicindela germanica obliquefasciata Adams, W.

Carabidae.

Nebria livida L. aus Werchne-Udinsk ist nicht ssp. *sibirica* Csiki, sondern eine andere Rasse, die einen besonderen Namen haben sollte (laut schriftlicher Mitteilung M. Bänningers, Gießen; siehe auch Bänninger, Ent. Mitt. XIV, 1925, S. 193 Fußnote 2).

Bembidion 4-guttatum Ol. ist synonym mit dem in der ersten Liste angegebenen *B. 4-pustulatum* Serv., N.

Epaphius chinensis Jean., N.- sp. nov., N.

Chlaenius Stschukini Mén., W. - *nigricornis* v. *melanocornis* Dej., W. - *alutaceus* Gebl., W.

Badister sp. nov., N.

Harpalus (Ophonus) nikolskyi Jedl. sp. nov., N. - (*Harpalus*) *tardus* Panz., W. - *anxius* Duft., W. - sp., W.

Stenolophus Mandli Jedl. sp. nov., N.

Acupalpus hilaris Tschit., N. - *limbatus* Gebl., N.

Trichocellus Mannerheimi Sahlb., W. - *punctatellus* Rtt., W. - *cognatus* Gyll., W.

Amara tridens Mor., W. - *similata* Gyll., W. - **picolissima** Jedl., W. - *montivaga* a. *violacea* Motsch., W. - *nitida* Sturm, W. - *communis* Panz., W. - *affinis* Motsch., W., T. - *viatica* Motsch., W., T. Tr. - *biarticulata* Motsch., W., T., Tr. - *familiaris* Duft., N. - *chalcophaea* Bat., W. - *rupicola* Zim., W. - *infima* Duft., W. - *laevissima* Sahlb., W. - *consors* Tschit., W. - *majuscula* Chd., W. - *distinguenda* Mor., W. - *aurichalcea* Germ., W., T. - (*Cyrtonotus*) sp., W. - *convexiuscula* Motsch., W. - *brevicollis* Chd., W. - *fodinae* Mannh., W. - *Dejeani* Putz., W. - *harpaloides* Dej., W. - (*Amathitis*) *cordata* Putz., W., T. Tr.

Agonum bicolor Dej., W., - *impressum* Panz., W. - *sempunctatum* L., W. - *gracilipes* Duft., W. - *dolens* Sahlb., N., W. - *nitidum* Motsch., W., T. - **Mandli** Jedl. sp. nov.¹⁾ N. - *scintillans* Boh., W. - sp., W.

Platinus assimilis Payk., W.

Lebia crux minor L., W.

Demetrias amurensis Motsch., N.

Dromius amurensis Rtt., W.

Metabletes pallipes Dej., W. - *truncatellus* L., W.

Microlestes minutulus Gze., W.

Cymindis binotata Fisch., W., T. - *rivularis* Motsch., W.

Die Bestimmung dieser restlichen Carabiden wurde wieder von Herrn A. Jedlička, Prag, durchgeführt.

Silphidae.

Necrophorus investigator Zett., W. - *japonicus* Har., N. - *vespilloides* a. *sylvaticus* Rtt., W., T. - *dauricus* Motsch., W. - (*Acanthopsilus*) *concolor* Kr., N.

Necrodes asiaticus Port., N.

Thanatophilus distinctus Port., N. - *sinuatus* Fab., N. - *latericarinatus* Motsch., W., T., Tr.

Oeceoptoma thoracicum L., N., W., T.

Aclypea vicina Jacovl., W., T. - *daurica* Gebl. (*hexastigma* Sols.), N.

Silpha perforata Gebl., N., W. - *perforata* ssp. **Mandli** Portevin, W.²⁾ - *Jeanelli* Port., W.

¹⁾ Jedlička, A., Ent. Nachrichtenbl. 7. Bd., S. 86.

²⁾ Portevin teilte mir hierzu brieflich mit: „Forme très remarquable, distincte du type par la disparition complète, ou presque complète, des côtes elytrales.“ — (Die bei der Art stark ausgeprägten Rippen verschwinden bei der neuen Form bis auf geringfügige Erhöhungen!)

Phosphuga atrata L., W. *Pteroloma Forstroemi* Gyll.¹⁾, W.
Sciodrepa fumatus Spence, N.

Die Arten dieser Familien wurden von Herrn G. Portevin, Paris, bestimmt. Außer der oben beschriebenen neuen Form ist nichts Bemerkenswertes zu sagen.

Buprestidae.

Herr Dr. Jan Obenberger, Prag, hat mich ersucht, ihm meine Buprestiden-Ausbeute zur Ansicht zu senden. Er machte hierzu folgende Bemerkungen:

„Sehr interessant ist das Vorkommen der *Melanophila* (*Phaenops*) *Formaneki* in Sibirien. . . . Die neue Art *Agrilus transbaicalicus* Obbgr. liegt in vielen Exemplaren vom Fluß Tschikol-Sharigol vor. . . . *Melanophila fulvoguttata* Harris ist eine nordamerikanische Art und der *guttulata* Gebl. nur ähnlich, systematisch aber weit verschieden. . . . Als sicher ausgeschlossen kann das Vorkommen von *Agrilus aurichalceus* Redt. in Sibirien gelten; *Agrilus sinuatus* Ol. kommt nur in einer speziellen Rasse vor, auch *Agrilus sinensis* Thoms., der eine südchinesische Art ist, dürfte eine Art der Verwandtschaft des *Agrilus ataman* Obbgr. sein. Fraglich ist auch die Varietät *foveolatus* Ab. des *Agrilus chrysoderus* Ab.

Anthaxia morio dürfte ostwärts den Ural nicht überschreiten.

Anthaxia 4-signata Obbgr., früher als Rasse zu *4-punctata* gestellt, ist eine gute, selbständige, rein sibirische Art.“

Nach seiner Ansicht wäre demnach zu setzen:

Statt *Melanophila fulvoguttata* Harr. . . . *guttulata* Gebl., W., T.

„ *Anthaxia morio* Fab. . . . *burjatica* Obbgr., N.

„ „ *4-punctata* L. . . . *4-signata* Mannh., N., W., T.
 und *transbaicalica* Obbgr., T.

„ *Agrilus viridis* a. *linearis* . . . *viridis* ssp. *melantatus* Obbgr., W.

„ „ *aurichalceus* Redt. . . . *ecarinatus* Mannh., N. W.
 und *transbaicalicus* Obbgr. n. sp., W. und *transbaicalicus* a. *fagiformis* Obbgr. nov. ab., W.

Agrilus sinuatus Ol.?

Statt *Agrilus chinensis* Thoms. . . . *Agr. Ataman* Obbgr. Pogranitschnaja.

¹⁾ Jedenfalls handelt es sich bei dieser Art nicht um die typische Form, sondern um die neu aufgestellte Art *sibiricum* Székessy: Székessy. Kol. Rdsch., XXI, 1935, S. 176.

Agrilus chrysoderes Ab. v. *foveolatus* A.?

Statt *Trachys minuta* L. . . . *minuta* var.!

Hinzu kommt noch eine im ersten Teil nicht aufgeführte Art: *Sphenoptera canaliculata* Pallas = *daurica* (Mannh.) Mars.

Ostomidae.

Calitys scabra Thunbg. (*dentata* F.), W.

Zimioma grossum L., W.

Ostoma ferruginea L., W., T.

Grynocharis oblonga L., N., W.

Nitidulidae.

Cataretes bipustulatus Payk., N.

Cyllodes ater Hbst., W.

Cryptophagidae.

Cryptophagus subfumatus Kr., W., *quadrimaculatus* Rtt., W.,
acutangulus Gyll., W., T.

Othniidae.

Othnius Kraatzi Rtt., N.

Anthicidae.

Notoxus simulans Hbdt., W.

Anthicus Confucii Mars. N., *scapularis* Laf., W., *scapularis a. Gebleri* Mäkl., W., spec. nov. prope *turkestanicus* Pic., W., *umbrinus* Laf., W.

Scarabaeidae (Nachtrag)

Aphodius Pečirkai Balth. sp. nov., W.¹⁾, *Haroldianus* Balth. nom. nov. var. **propraetor** Balth. var. nov., N.²⁾.

Statt *Trox Komareki* Balth. (S. 28) ist zu setzen *Tr. cadaverinus* ssp. **Komareki** Balth.³⁾

Statt *Trox cadaverinus* Illig. (S. 19) ist zu setzen *Tr. mitis* Balth.⁴⁾

Die Liste der neu aufgefundenen *Trox*-Arten heißt demnach vollständig:

Trox Mandli Balth., W., *ussuriensis* Balth., N., *cadaverinus Komareki* Balth., N., **mitis** Balth., N., **Vimmeri** Balth., N., **ineptus** Balth., W., **Zoufali** Balth., N., *sabulosus* L., W.⁴⁾

¹⁾ Balthasar, Vlad., Entom. Nachrichtenbl., VI. Bd., S. 40.

²⁾ Balthasar, Vlad., loc. cit., VI. Bd., S. 1.

³⁾ Balthasar, Vlad., Entomol. Nachrichtenbl., 7. Bd., 3. Heft, S. 81.

⁴⁾ Balthasar, Vlad., Entomol. Blätter, 27. Jahrg. 1931, S. 128.

Cerambycidae.

Statt *anaesthetis testacea* F. (S. 23 der Zusammenstellung) ist zu setzen *Anaest. confossicollis* Bec. Diese Art ist nach einer brieflichen Mitteilung des Herrn N. N. Plawiltschikoff nicht synonym mit *Anaest. obrioides* Bat., sondern eine gute Art. N.

Statt *Phytoecia cylindrica* L. (S. 23) ist zu setzen *Eumecocera impustulata* Motsch., laut brieflicher Mitteilung des gleichen Herrn.

Statt *Trichoferus turkestanicus* Heyd. ist zu setzen *Tr. campestris* Fald. N.

Chrysomelidae.

Plateumaris discolor Panz., N. W.

Syneta betulae v. *amurensis* Pic, N. *Pedrilla annulata* Baly, N.¹⁾, *annulata* a. *disconotata* Pic, N.¹⁾

Lema Erichsoni Suffr., N., *tristis* Suffr., N. T., *scutellaris* Kr., N. *Crioceris* 12-punctata L., N., W., 14-punctata v. *sibirica* Wse., N., W.

Liliocerus merdigera L., N.

Clytraxeloma cyanipennis Kr. N.

Labidostomus bipunctatus Mannh., W., *cyanicornis* Germ., N., W.

Coptocephala unifasciata a. *femoralis* Küst., W.

Cryptocephalus Mannerheimi Gebl., W., *ochroloma* Gebl., W., *crux* Gebl., W., *coryli* a. *Benoiti* Pic, W., *distinguendis* Schneid., W., *limbellus* Suffr., W., *regalis* Gebl., N., *hypochaeridis* L., N., W., *coerulans* Mars., N., W., *fortunatus* Baly, W., *placidus* Wse., W., *Koltzei* Wse., N., *bivulneratus* Fald., W.

Nodostoma fulvipes Motsch., N., *fulvipes* a. *aeneipenne* Motsch., N., a. *coerulescens* Wse., N., a. *pivicolle* Wse., N., a. *atripes* Motsch., N.

Pagria signata Motsch., N.

Colasposoma dauricum Mannh., N., W., *dauricum* a. *cyaneum* Motsch., N., W.

Adoxus obscurus L., N., W., *obscurus* a. *villosus* Schrk., N., W.

Crysochus gonostoma Wse. N., W.²⁾

Ambrostoma quadriimpressum Motsch., N.

Chrysomela marginalis Duft., W., *aurichalcea* Mannh., N., W., *aurichalcea* v. *collaris* Wse. (*recticollis* Wse.), N., W., gra-

¹⁾ Auf *Evonymus alatus* Thunb.

²⁾ Auf *Asclepias* sp.

minis ssp. *auraria* Motsch., N., ssp. *virgata* Motsch., N., *exanthematica* Wied. (*guttata* Gebl.), N., *guttifera* Motsch., W., *limbata* v. *Hochhuthi* Suffr., W., *aeruginosa* v. *tarda* Motsch., W., *rufilabris* Fald., W.

Colaphellus foveolatus Gebl., W.

Gastroidea polygoni L., W., *viridula* Deg., W., *atrocyanea* Motsch., N.

Plagioderia versicolora Laich. ab., W.

Melasoma aenea L., N., *lapponica* L., W., *populi* L., N., W., T., Tr., *tremulae* F., W.

Phytodecta fulvus Motsch., N., *salicis* Motsch., W.

Entomoscelis orientalis Motsch., N.

Dactylispa angulosa Solsky, N.

Die Bestimmung dieser Familie besorgte Herr J. Breit, Wien.

Curculionidae.

Statt *Coenorrhynchus pauxillus* Germ. ist zu setzen: *Coen. Thomsoni* Faust, N. Dazu kommen noch folgende Arten:

Apoderus coryli a. *kamtschaticus* Motsch., W., T., *erythropterus* a. *frontalis* Faust, N.

Apion curtirostre Germ., N., W., *minimum* Hbst., N., (*Catapion*) sp., N., *onopordi* Kby., N., W., *Gyllenhali* Kirby. N., *viciae* a. *Griesebachii* Steph., N., T., *rectirostre* Schils., N., (*Protapion*) sp., W., *Apion* sp., N.

Otiorrhynchus ovatus L., W., *cribrosicollis* Boh., W.

Myllocerops obliquesignatus Rtt., N., **Penekei** Voß spec. nov., N.

Phyllobius brevis Gyll. (*sulcirostris* Boh.), W., *pomoniae* Ol., W., T., *femoralis* W., *maculatus* Tourn., W., *profanus* Faust, W., *crassus* Motsch., N.

Polydrosus obesulus a. *obscuripes* Schilsk., N., *ligurinus* Gyll., N., W.

Blosyrus falcatus Faust, N.

Dactylotus trivialis Fst., W.

Heydenia crassicornis Tourn., W.

Sitona tibialis Hbst., W., *ovipennis* Hbst., W., *flavescens* Msh., W., *lineellus* Bonsd., N., *foedus* Gyll., W., *amurensis* Fst., N., *cylindricollis* Fahrs., N., W.

Piazomias humilis Fst., N.

Leptomias Schönherri Fst., N.

Thylacites pilosus F., W.

- Chlorophanus sibiricus* Gyll., N., W., *circumcinctus* v. *plicatirostris* Rtt., W., *Schönherri* Fst., W.
- Tanimecus palliatus* F., W.
- Cyphicerus tessellatus* Motsch., N.
- Pseudocneorrhynus obesus* Roel., N.
- Larinus sturnus* Schall., W., *subvariolosus* Petri, N., *scabrirostris* Fald., W.
- Lixestus* spec. nov., W.
- Lixus vibex* Pallas, W., *posticus* Fst., N., *amurensis* Fst., N., *fasciculatus* Boh., N., spec. nov. oder *depressipennis* Roels., N.
- Chromonotus humeralis* Zuobk., W., T., *humeralis* a. *bipunctatus* Zoubk., W.
- Pleurocleonus sollicitus* Gyll., N., W.
- Coniocleonus ferrugineus* Fahrsh., W., T., Tr., **familiaris** Voß sp. nov., W.
- Stephanolceonus perscitus* v. *connectus* Faust, W., *lobatus* Chevr., W., *nubilis* Fahrs., W.
- Entimetopus Perofskyi* Faust, W., T., Tr.
- Bothynoderes foveicollis* Gebl., T., spec. ?, W.
- Chromoderus declivius* Ol., N., W., T.
- Cleonus piger* v. *japonicus* Faust, N., W.
- Adosomus Karelini* Fahrs., W.
- Eremotus ater* L., W.
- Bagous glabrirostris* Hbst., N.
- Dorytomus taeniatus* F., N., *cinereus* Hochh., W., *occalescens* Gyll., W., *imbecillus* Fst., W., *minutus* Gyll., W., *flavipes* Panz., N., *subcinctus* Fst., W.
- Notaris acridulus* L., N., W.
- Grypus equiseti* F., W.
- Elleschus infirmus* Hbst., N.
- Acalyptus carpinii* Hbst., N.
- Tychius albolineatus* Motsch., W.
- Anthonomus pedicularis* L., W., *terreus* Gyll., N., W.
- Furcipes rectirostris* L., W.
- Bradybatus Sharpi* Tourn., N.
- Curculio conjugal* Fst., N., *Dieckmanni* Fst., N., *crux* F., N., spec., N.
- Pissodes notatus* F., W., *pini* L., W.

- Magdalis ruficornis* L., W., *phlegmatica* Hbst., W., *violacea* L., W., *frontalis* ssp. **transbaicalica** Voß, ssp. nov., W., T., *Formaneki* Rtr., W.
- Lepyrus arcticus* Payk., W., *arcticus* ab. *quadrinotatus* Boh., N., W., *nebulosus* Motsch., N., W.
- Hylobius abietis* L., W., T., Tr., *piceus* Degeer, W., T., *longulus* Fst., N.
- Trichalophus rudis* Boh., N., W., *albonotatus* a. *bistriola* Rtr., N.
- Fronto bimaculatus* Petri, N.
- Phytonomus incitus* Boh., W., *rumicis* L., N., W., *Gestroi* Petri N., *viciae* Gyll., N.
- Gronops inaequalis* Boh., N., W., T., spec., W., Tr.
- Sipalis hypocrita* Boh. ?, N.
- Cryptorhynchidius lapathi* L., N., W.
- Coelosternis electus* Roel., N.
- Baris artemisia* v. *rufitarsis* Motsch., N., W., *Spitzyi* a. *nesapia* Fst., W., *dispilota* Sols., N.
- Limnobaris pilistrata* Steph., N., W.
- Coeliodes* spec., N.
- Zacladis fallax* Boh., N., *radula* Hochh., N.
- Cidnorrhynus quadrimaculatus* L., N.
- Ceutorrhynchus pyrrhorhynchus* Ms., N., *pleurostigma* Marsh., N., *griseus* Bris., N., *ignitus* Germ., N.
- Rhinoncus sibiricus* Fst., N., *perpendicularis* Reich., N.
- Tapinotus sellatus* F., N.
- Miarus longirostris* Gyll., N., *graminis* v. *subfulvus* Rtr., W.
- Rhynchaenus mutabilis* Boh., (auf *Ulmus*), W., *similis* Fst., N., *subbifasciatus* Fst., N., *testaceus* a. *pubescens* Stev., N., W., *decoratus* Germ., N.

Die Bestimmung dieser Familie wurde von Herrn E. Voß, Berlin-Charlottenburg durchgeführt.

Ausständig ist noch die Familie *Staphylinidae*, die von Herrn Dr. O. Scheerpeltz bearbeitet wird, und einige kleinere Familien. Sie sollen in einem dritten Teil publiziert werden.

Berichtigungen zu

„Systematische Zusammenstellung einer Sammelausbeute aus Transbaikalien und dem Ussuri-Gebiete“.

(Wien. Ent. Zeitg., Bd. 48, S. 1—28.)

Seite	2, linke Spalte, Zeile	4 von unten: füge hinzu Tr.
"	4, " " " "	16 " " : streiche W.
"	5, " " " "	5 " oben: setze W statt N.

Seite	5, linke Spalte, Zeile	26	von oben: füge hinzu T.
"	6, " " "	24	" " : <i>Harpalus Jurečki</i> Jedl. statt <i>Jurečkai</i> .
"	7, " " " "	11	" " : setze W statt N.
"	10, " " " "	4	" unten: setze W statt N.
"	10, rechte " " "	3	" " : <i>raminicornis</i> .
"	11, " " " "	24	" " : <i>punctaticollis</i> .
"	17, " " " "	1	" oben: <i>melanostoma</i> .
"	18, linke " " "	17	" " : <i>Mesomorphus villiger</i> .
"	19, rechte " " "	10	" " : setze T statt W.
"	19, " " " "	14	" " : streiche a nach <i>hippocastani</i> .
"	19, " " " "	17	" " : setze W statt N.
"	20, " " " "	14	" " : setze <i>Rutelinae</i> statt <i>Cetoniinae</i> .
"	20, linke " " "	19	" " : <i>Lucanus Hopei</i> Parry v. <i>maculifemoratus</i> Motsch.
"	20, rechte " " "	10	" " : <i>Oxycetonia</i> .
"	20, " " " "	7	" unten: <i>Tetropium</i> .
"	21, " " " "	4	" " : <i>variabilis</i> a. <i>testaceimetricis</i> statt <i>bifasciatus</i> .
"	22, linke " " "	1	" oben: <i>interrogationis</i> a. <i>punctatus</i> statt <i>punctatus</i> .
"	22, " " " "	2	" " : <i>interrogationis</i> a. <i>Kraatzi</i> Gglb.
"	24, " " " "	14	" " : Jakobs.
"	24, rechte " " "	10	" " : setze W statt N.
"	25, linke " " "	10	" " : streiche N.
"	27, rechte " " "	12	" " : <i>subcyaneus</i> gehört kursiv gesperrt.
"	28, " " "	8	" unten: es soll heißen: Nach <i>Aphodius indagator</i> Mannh. ist etc.
"	28, " " "	4	" unten: <i>A. Jouravliowi</i> Rttr. W.
"	28, " " "	3	" " : <i>A. Jouravliowi</i> v. <i>latonius</i> Rttr. W.
"	28, " " "	1	" " : <i>A. Emerichi</i> Rttr. N.

Neue und interessante Insektenfunde aus dem Faunengebiete Südbayerns.

4. **Hom. Cicadinae.** *Cicadetta megerlei* Fieb. Fundorte in Südbayern:¹⁾ 1. Grünwald, südl. von München (leg. Dr. Engel) 1 St., eine Larvenhaut (leg. Knoerzer). 2. Pupplinger Au bei Wolfratshausen (leg. Knoerzer) 27. VI. 37 und 18. VII. 39, je 1 Stück. 3. Oberstdorf, am Gaisalensee (1300 m), 5 Stück (leg. Bileck) 7. 36. Schrainbachalm über dem Königsee 1 Stück (leg. Bileck), 25. VI. 38. 4. Eisenburg bei Memmingen (ca. 600 m) 23. VI. 40 (leg. Dr. Forster).

¹⁾ Zum Artikel in den „Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft“ XXVIII. Jahrg. 1938, Heft I, *Cicadetta megerlei* in Südbayern, von Alb. Knoerzer.



Mandl, Karl. 1941. "Systematische Zusammenstellung einer Sammelausbeute aus Transbaikalien und dem Ussuri-Gebiete (Col.)." *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* 31, 785–794.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/91976>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/200645>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.