

NOUVEAUX CRYPTOCEPHALIDES D'AFRIQUE [COL.],

PAR M. M. PIC.

(2^e Partie.)

Les espèces et variétés décrites ici appartiennent au genre *Cryptocephalus* Geoff., c'est-à-dire qu'elles ont toutes les ongles des tarses dépourvus de dents, et les antennes non robustes plus ou moins longues. Les types, tous uniques, font partie des Collections du Muséum national de Paris.

CRYPTOCEPHALUS CALLIAS Suf.

Aux variétés décrites chez cette espèce j'ajoute les deux suivantes, très distinctes, et voisines de la v. *Sheppardi* Jac., les deux provenant des chasses de G. Vasse au Mozambique.

Var. nov. *Vassei*.

Élytres ornés d'une macule humérale verte et d'une sorte d'anneau postérieur discal également vert, suture verte.

Var. nov. *sungonensis*.

Élytres ornés d'une bande discale verte, à contours irréguliers, suture verte.

Cryptocephalus viridiceps nov. sp.

Subovatus, nitidus, infra niger, supra rufo-testaceus, capite scutelloque viridibus, elytris viridi notatis.

Subovalaire, brillant, convexe, noir en dessous, roux-testacé en dessus avec les élytres plus clairs, ceux-ci à suture verte et ornés d'une macule humérale et d'une postmédiane discale allongées vertes; en outre tête et écusson verts, membres testacés, base des cuisses postérieures et sommet des antennes rembrunis. Tête fortement et densément ponctuée, yeux assez écartés, antennes assez courtes, épaissies à l'extrémité; prothorax assez court, rétréci en avant, à ponctuation assez forte, irrégulière; élytres à

rangées de points moyens, avec les intervalles ponctués et un peu plissés; pattes robustes. Longueur, 3 millimètres.

Bechuanaland : Gaberones, sept. 1915 (V. Ellenberger).

Espèce voisine de *C. callias* Suf. et distincte, à première vue, par sa tête métallique; par cette tête métallique se rapproche de *C. vittiger* Suf., mais le dessin élytral de ce dernier est tout autre, et toutes les cuisses sont foncées.

***Cryptocephalus 4-luteolineatus* nov. sp.**

Subovatus, valde nitidus, rufo-testaceus, antennis apice, scutello elytrisque nigris, his luteo bivittatis, vittis postice junctis, thorace nigro bimaculato.

Subovalaire, convexe, très brillant, roux-testacé avec le prothoraxbimaculé de noir en avant, l'extrémité des antennes, l'écusson et les élytres noirs, ces derniers ornés de deux bandes longitudinales jaunes jointes en arrière. Tête à ponctuation pas très forte, écartée, yeux gris distants, antennes peu longues, assez grêles; prothorax court, un peu rétréci en avant, à ponctuation espacée, fine, bord postérieur noir; élytres fortement ponctués en rangées avec des traces de stries, ornés chacun de deux bandes jaunes placées l'une près du bord externe, l'autre près de la suture et se joignant par un trait transversal pas loin du sommet; pattes assez robustes. Long., 3 millim. 5.

Congo : Ogoué à Samkita, 1910 (R. Ellenberger).

Espèce voisine de la précédente et des plus distinctes par la particulière coloration de ses élytres.

***Cryptocephalus curticornis* nov. sp.**

Oblongus, nitidus, infra niger, capite membrisque pro parte nigris, pro parte rufo-testaceis, thorace rufo, flavo marginato, elytris flavis, ad humeros nigro maculatis, pro parte nigro marginatis, pygidio flavo.

Oblong, peu convexe, brillant, largement foncé en dessous et clair en dessus avec les élytres marqués de noir. Tête testacé-roussâtre au milieu, noire sur le pourtour, en outre une ligne frontale noire, médiocrement ponctuée, antennes courtes, grêles, noires à base testacée; prothorax court, rétréci en avant, à peine ponctué, roux avec le pourtour et une ligne médiane pâles; écusson noir, taché de flave; élytres assez courts, un peu rétrécis en arrière, très finement ponctués en rangées, flaves avec le pourtour, moins les côtés antérieurs et la suture étroitement noirs, en outre une macule humérale noire; dessous du corps noir, sommet de l'abdomen

et pygidium flaves; pattes assez robustes, testacé-roussâtres, cuisses postérieures maculées de noir. Long., 3 millimètres.

Province du Cap : East London, sept. 1915 (R. Ellenberger).

Ressemble à *C. sindonicus* Mars. et voisins, distinct, à première vue, par sa bordure noire des élytres.

Cryptocephalus Regnieri nov. sp.

Oblongus, nitidus, rufus, elytris nigris, antice late et postice brevis luteo maculatis.

Oblong, brillant, convexe, roux avec les élytres ornés de deux macules jaunes isolées des bords, la première antérieure grande, subtransversale, élargie sur son côté interne, la deuxième subarrondie, près du sommet. Tête assez fortement ponctuée, yeux gris, un peu distants; antennes grêles et assez longues; prothorax court, rétréci en avant, finement ponctué; élytres à rangées de points médiocres, substriés sur les côtés; pattes assez robustes. Long., 3 millim. 5.

Congo français : Brazzaville, 1898 (M. L. Régnier).

Très voisin de *C. Stanleyi* Pic, en diffère par le prothorax non marqué de foncé à la base et la macule antérieure des élytres dilatée au côté interne et plus rapprochée de la base.

Cryptocephalus limbativentris nov. sp.

Curtus, sat latus, nitidus, rufo-testaceus, antennis apice, scutello et infra corpore nigris, thorace elytrisque signaturis nigris ornatis.

Court et assez large, brillant, roux-testacé avec le sommet des antennes, l'écusson et le dessous noirs, prothorax roux, orné, de chaque côté postérieurement, d'une grande macule noire lobée, élytres jaunes, bordés de noir et ornés chacun de 5 macules noires (2, 1, 2), les 2 internes communes sur la suture, l'interne antérieure jointe aussi à la 3^e macule suturale, la postérieure externe isolée de la suturale voisine, mais touchant le bord latéral. Tête rousse et jaune, maculée de foncé près des yeux, irrégulièrement ponctuée, yeux gris, écartés, antennes longues et grêles; prothorax court, rétréci en avant, peu ponctué; élytres courts et assez larges, à peine atténués postérieurement, à rangées de points fins et espacés; abdomen bordé de flave sur les côtés supérieurs; pattes testacé-roussâtres, robustes. Long., 5 millimètres.

Province du Cap : East London, sept. 1915 (R. Ellenberger).

Paraît voisin de *C. angolensis* Er.; espèce caractérisée par un dessin élytral particulier.

Cryptocephalus subdisjunctus nov. sp.

Elongatus, nitidus, niger, pro parte flavo aut testaceo notatus, thorace rufo, nigro binotato, elytris luteis, longitudinaliter nigro vittatis.

Allongé, brillant, convexe, dessous, membres et tête noirs marqués par places de flave ou de testacé, prothorax roux, orné, de chaque côté sur la base, d'une macule allongée noire, élytres jaunes, ornés de trois bandes longitudinales noires n'atteignant pas le sommet, l'une discale sur chacun et presque droite, l'autre commune sur la suture, un peu sagittiforme. Tête modérément ponctuée, foncée, marquée de flave au-dessus du labre et près des yeux, qui sont un peu écartés, antennes assez longues et grêles, foncées, tachées de testacé à la base; prothorax finement et éparsément ponctué; élytres assez longs, atténués postérieurement, à rangées de points plus forts sur les parties noires; dessous du corps et pygidium noirs, tachés de testacé; pattes bicolores, assez robustes. Long., 4,5 millimètres.

Bechuanaland : Gaberones, fév. 1915 (R. Ellenberger).

Voisin de *C. subconnectens* Jac., tête autrement colorée, bandes du prothorax moins longues, bande sagittiforme suturale rétrécie en avant.

CRYPTOCEPHALUS SUBCONNECTENS, v. nov. trijunctus.

Élytres ornés chacun d'une bande discale noire complète se réunissant postérieurement à la suturale et ainsi très distinct de la forme type ayant des dessins disjoints.

Rhodesia : Selukwe, mars 1915 (R. Ellenberger).

CRYPTOCEPHALUS 10-NOTATUS, v. nov. andradanus.

Élytres jaunes, ornés sur chacun des dessins noirs suivants : deux grosses macules antérieures obliques, une macule subfasciée postmédiane et présuturale à contours irréguliers, plusieurs petits traits allongés près de la suture; ces derniers dessins particuliers caractérisent cette variété.

Mozambique : environs d'Andrada, déc. 1905 (G. Vasse).

Cryptocephalus undulatovittatus nov. sp.

Oblongus, parum nitidus, testaceus, elytris nigro cinctis et in disco nigro undulato-fasciatis.

Oblong, peu brillant, assez convexe, testacé avec les élytres bordés de noir et ornés d'une bande ondulée étroite qui part du calus huméral largement noir, se courbe un peu et se dirige sur le disque en arrière sans atteindre le sommet. Tête à peine ponctuée, subsillonnée sur le vertex, yeux écartés, antennes grêles, assez longues, rembrunies à l'extrémité; prothorax à peine ponctué, bord postérieur noir; écusson testacé, bordé de noir; élytres assez courts et larges, à rangées de points forts et faiblement striés; pattes peu épaisses. Long., 5 millimètres.

Mozambique : Guengère, février 1906 (G. Vasse).

Espèce très distincte par sa bande discale étroite et non droite. Peut se placer près de *C. decoratus* Reic.

Cryptocephalus Ellenbergeri nov. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, pallido-testaceus, thorace elytrisque ad medium rufo-castaneis.

Oblong allongé, peu convexe, brillant, testacé pâle avec le prothorax et les élytres sur le milieu largement roux châtain, le prothorax étant un peu plus foncé vers la base et la bande élytrale en avant. Tête modérément ponctuée, sillonnée entre les yeux, ces derniers se touchant presque et très grands, antennes longues et grêles; prothorax à peine ponctué; élytres peu longs, un peu étranglés au milieu, à rangées de points moyens, substriés; dessous entièrement testacé; pattes peu épaisses. Long., 9 millimètres.

Gabon : Ogoué, à Lambariné, 1912 (R. Ellenberger).

Espèce très distincte par sa particulière coloration et ses yeux se touchant presque. Peut prendre place près de *C. bipunctatus* L.

Cryptocephalus Burgeoni nov. sp.

Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, infra corpore nigro, testaceo notato; thorace nigro bimaculato; elytris ad humeros nigro maculatis.

Oblong, convexe, brillant, testacé-roussâtre en dessus et sur les membres, avec le prothorax bimaculé de noir et les élytres ornés d'une macule humérale également noire, dessous noir, marqué de testacé par places, notamment sur le pourtour de l'abdomen, pygidium testacé, impressionné et marqué de noir à la base. Tête à ponctuation assez forte, irrégulière, impressionnée entre les yeux qui sont écartés; prothorax à peine ponctué; élytres assez courts, à peine atténués postérieurement, à rangées pas com-

plètement régulières, de points médiocres; pattes peu robustes. Long., 6 millimètres.

Congo Belge : Prov. de Maniéma, à Kindu, 1917 (L. Burgeon).

De faciès et coloration rappelle *C. Ahlvarthi* Rein., mais la macule noire est plus grosse et atteint la base; en outre structure tarsale différente. Sans doute voisin de *C. maceratus* Rein.

***Cryptocephalus kinduensis* nov. sp.**

Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, thorace in disco late nigro, scutello nigro, elytris caeruleo-metallicis, apice rufo notatis.

Oblong, convexe, brillant, roux-testacé avec l'écusson et le milieu du prothorax largement noirs, les élytres d'un bleu métallique à sommet roux-testacé. Tête éparsément ponctuée, subsillonnée sur le vertex, yeux gris, écartés, antennes longues et grêles; prothorax à peine ponctué; élytres courts et larges, un peu atténués postérieurement, à rangées de points médiocres; pattes peu épaisses. Long., 5 millimètres.

Congo Belge : Prov. de Maniéma, à Kindu, 1917 (L. Burgeon).

Très voisin de *C. Delhaisei* Clav., en diffère, à première vue, par les élytres bleus, au lieu d'être noirs.

***Cryptocephalus Gromieri* nov. sp.**

Parum elongatus, nitidus, nigro-viridescens, elytris cyaneis, apice luteo maculatis.

Peu allongé, subsinué latéralement, brillant en dessus, d'un noir verdâtre avec les élytres bleus, maculés de jaune au sommet. Tête fortement ponctuée, yeux pas très écartés, antennes foncées, tachées de flave en dessous sur la base; prothorax médiocrement ponctué sur les côtés, presque lisse au milieu; élytres à rangées de points forts, intervalles en partie plissés ou subruguleux; pattes assez longues. Long., 3,5 millimètres.

Congo Belge : Volcans du Kivou, avril 1911 (Dr Gromier).

Rappelle *C. pyrrhocnemis* Rein. par sa coloration, mais sa forme est plus allongée et la macule apicale est jaune au lieu d'être ferrugineuse.



Pic, Maurice. 1923. "Nouveaux Cryptocephalides d'Afrique [Col.] (2e Partie)."
*Bulletin du
Muse
um national d'histoire naturelle* 29(7), 509–514.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/213221>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/203995>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.