

Verzeichniss

der von Herrn Dr. W. Horn auf Ceylon gesammelten

Ruteliden.

Von

Dr. Fr. Ohaus.

1. *Anomala (Heteroplia) varians* Oliv. 1 ♂ von Anuradhapura, 6 ♀ von Nalanda, Puttalam und Negombo.
2. *A. (Heteroplia) ypsilon* Wiedem. 18 ♂ von Negombo, Puttalam, Nalanda, Laxapana, Hatton, Anuradhapura und Kandy; 1 ♀ von Matala.
3. *A. (Heteroplia) testacea* Blanch. 1 ♂ von Matala, 1 ♀ von Kandy.
4. *A. varicolor* Gyllenh. 4 ♂ und 4 ♀ von Colombo.
5. *A. (Euchlora) perplexa* Hope. 2 ♀ von Anuradhapura resp. Nalanda.
6. *Mimela Mac Leayana* Vigors. 2 ♀ von Matala resp. Kandy.
7. *M. xanthorhina* Hope. 1 ♂ von Laxapana.
8. *Popillia complanata* Newm. Von dieser in der Färbung sehr veränderlichen Art liegen 11 ♂ und 10 ♀ von Pentotta, Hatton und Laxapana vor, darunter die Varietäten *lateralis* Kr. (3), *semilimbata* m. (4), *humeralis* m. (3), *discalis* Walker (2), *microphthalmica* m. (1), *stolata* m. (1), *diffusa* m. (1), *apicalis* m. (2), *viridissima* m. (4).
9. *Adoretus pallens* Blanch. 1 ♂ von Negombo.
10. *A. lasiopygus* Burm. 1 ♂ von Paradna.
11. *A. singhalensis* nov. spec. Nitidus, depressus, rufo-fuscus caput tarsisque obscuriora, femora tibiaeque intus flava; caput, thorax et pedes pilis griseo-flavis erectis, elytra et abdomen pilis griseis brevioribus accumbentibus sat dense oblecta, elytra praeterea pilis griseo-flavis longioribus erectis in series quattuor aggregatis ornata. Caput cum clypeo dense et profunde, ad oculos solum confluentem punctatum, clypeus

parabolicus margine parum elevatus; thorax brevis et scutellum dense vix confluentur punctata; elytra costis quattuor (suturali inclusa) vix elevatis praedita, punctis costas delimitantibus in series ordinatis, punctis interstitialibus irregularibus; pygidium elytris obtectum confluentur punctatum et pilis brevibus griseis sicut in abdomine accumbentibus obtectum; hujus segmenta fusca, margine rufa disperse punctata; pedes pilis erectis longis flavidis obsita, tibiae anticae tridentatae, dente apicali sat longo recurvo; antennae rufae.

Long. 12, lat. hum. 5 mm. ♀. Kandy.

Nach der Burmeister'schen Eintheilung würde diese Art in die Nähe seines *A. caliginosus* gehören, dem sie in Größe, Färbung und in der graugelben Behaarung ziemlich gleicht; sie ist jedoch flacher und durch den Bau der Oberlippe von ihr zu unterscheiden. Bei der *singhalensis* ist die Oberlippe rothbraun, glänzend, weitläufig tief punktirt; aus jedem Punkt entspringt ein graugelbes Haar; neben dem Seitenrand verläuft jederseits vom Basalwinkel beginnend eine tiefe, scharfe Furche; die Parthie zwischen dieser und dem Seitenrand ist glänzend, schwarz, punktfrei, ebenso wie der gerade abgestutzte schnabelförmige Fortsatz, der Seitenrand regelmäßig tief crenulirt; das Kinn ist hell röthlich-gelb und an seinem Vorderrand tief ausgebuchtet, sodaß zwischen Oberlippe und Kinn eine halbkreisförmige Vertiefung liegt. Bei *caliginosus* ist diese Vertiefung viel geringer, die Furche neben dem Seitenrand weniger deutlich, die Oberlippe dichter punktirt (bei frischen Stücken auch behaart) und mit einem scharf abgesetzten Längskiel von der Spitze des Schnabels bis zur Mitte der Basis versehen.

Mit Ausnahme der letzten sind alle von Dr. Horn auf Ceylon gesammelten Arten auch auf dem Festland Vorderindiens gefunden worden.



Ohaus, Friedrich. 1900. "Verzeichnis der von Herrn W. Horn auf Ceylon gesammelten Ruteliden." *Entomologische Zeitung* 61, 362–363.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/101768>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/205943>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.