

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES DES ENVIRONS
D'AKBÈS (SYRIE)

par M. Léon Fairmaire.

Hydrous dichromus. — Long. 12 mill. — *Ovatus, postice paulo ampliatus, convexus, supra fusco-olivaceus nitidus, subtus cum pedibus rufotestaceus, antennis pallidis, clava obscura, palpis pallidis, articulo ultimo præcedenti brevior et apice brevissime obscuro; capite antice utrinque arcuatim punctato; prothorace longitudine duplo latiore, antice paulo angustato, lateribus leviter rotundatis, angulis posticis valde obtusis, fere rotundatis, dorso lateribus medio et antice punctis aliquot impresso; elytris sat breviter ovatis, utrinque lineis tribus punctatis, primis vix substriatis, margine externo biseriatim punctato; subtus lævis minus nitidus, prosterno carina antice angulata, postice acutissime spinosa signato, carina pectorali valde compressa, inter coxas anticas terminata.*

Plus petit et plus court que le *flavipes*, d'une coloration bien différente et remarquable par l'épine aiguë qui termine la lame prosternale en arrière.

Choleva major. — Long. 7 mill. — *Oblonga, sat convexa, castaneo-rufescens, subtus cum pedibus dilutior, subtiliter pilosula; antennis sat gracilibus, medium elytrorum longe superantibus, articulo 2^o quinto æquali, ultimo acute appendiculato; prothorace parum transverso, elytris angustiore, antice paulo ampliato et cum angulis rotundato, margine postico recto, ad angulos paulo obliquato, his obtusis, dorso dense subtiliter aspero-punctato, postice utrinque impresso, disco breviter sulcatulo; scutello triangulari sat acuto, subtiliter asperulo; elytris oblongo-ovatis, medio leviter ampliatis, apice sat abrupte rotundatis, dorso dense subtiliter asperatis, transversim levissime plicatulis, leviter striatis, striis 2 primis et omnibus apice profundioribus, intervallis primis paulo convexis, epipleuris latis, concavis, subtiliter asperulis; subtus dense subtiliter asperula, pedibus gracilibus, tarsis anticis, articulis 3 primis dilatatis, 1^o longiore, pedibus posticis valde elongatis, trochanteribus apice acute spinosis; ♂.*

Ressemble assez à l'*angustata*, mais bien plus grand, avec les antennes plus longues, le corselet plus étroit, élargi plus en avant, les élytres plus amples.

Corticus syriacus. — Long. 4 mill. — *Ovatus, convexus, fusco-*

brunneus, nitidulus, terreno-squamosulus, hispidus; capite brevi, inter antennis leviter concavo, his crassis, brevibus, prothoracis medium vix attingentibus, articulis 3-10 transversis, brevibus, ultimo majore, fere truncato, prothorace brevi, elytris parum angustiore, lateribus præcipue et dorso conico-tuberculato; elytris brevibus, ad humeros angulatis, apice rotundatis, dorso utrinque paulo bicostatis, costis crassis, interruptis, asperatis, pedibus brevibus, crassis, hispidis.

Ressemble au *diabolicus*, mais plus court, plus convexe, avec les antennes plus cylindriques, les premiers articles pas plus larges que les autres, le corselet moins prolongé au milieu de la base, les tubercules dorsaux plus saillants, le disque non impressionné au milieu, et les élytres plus hispides, moins tuberculées.

Platycerus Delagrangi. — Long. 11 mill. — *Oblongus, subparallelus, convexiusculus, fusco-cæruleus, paulo nitidulus; capite dense ruguloso-punctato, antice paulo concavo, clypeo sat fortiter emarginato, tuberculis antennariis lævigatis; prothorace valde transverso, antice magis quam postice angustato, lateribus sat late marginato et ante medium obtusissime angulato, angulis posticis obtusis, dorso dense rugosulo-punctato, linea media tenui lævigata; scutello lævi, fere truncato, fere lævi; elytris ad humeros angulatis, lateribus postice marginatis, dorso dense fortiter punctatis, subtiliter striatis, sutura elevata; subtus magis nigrans, dense ac fortiter punctatus; ♂ magis parallelus, mandibulis longioribus, sed capite brevioribus.*

Bien distinct du *caraboides* par sa forme plus allongée, plus parallèle, sa coloration foncée, peu brillante, son corselet densément et assez fortement ponctué ainsi que la tête et les mandibules bien moins longues; les angles antérieures du corselet sont plus obtus. Le *P. caucasicus* Saund. (*Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1864, 60) paraît différer par sa taille plus forte, sa coloration d'un bleu brillant, la ponctuation moins serrée, et les mandibules moins courtes. En voici du reste, la description :

Cæruleus, nitidus; capite parcius punctato, antrorsum profunde emarginato, impresso; mandibulis elongatis, capitis fere longitudine, curvatis, supra sulcatis, extus prope basin angulatis, intus ad basin dente obtuso parvo instructis; prothorace transverso, angulis anticis prominulis, deflexis, lateribus sinuatis, angulis posticis obtusis, parcius sat fortiter punctato; elytris elongatis, parallelis, punctatis, leviter lineatis; corpore subtus nigro; tibiis anticis minute denticulatis, quatuor posticis inermibus. — Long. (mandib. incl.) 6 1/2 lig. (anglaises). — Caucase.

Readily distinguished from its European ally, *P. caraboides*,

by its narrower and more convex form, its prominent and more slender mandibles, its impressed and sparsely punctate head, the sinuate lateral margin of the prothorax, the obtuse posterior angles and punctuation of that segment, and finally, by its more parallel and sparsely punctate elytra, the interstices being smooth.

Triodonta difformipes. — Long. 6 mill. — *Orato-oblonga, convexa, fusca, nitidula, fulvo-pilosa et fulvo-ciliata, elytris, pedibus, ore antennisque fulvo-testaceis, sutura et margine externo anguste infuscatis, capite sat magno, subtiliter rugoso-punctato, antice fere truncato, angulis rotundatis, margine antico et lateribus reflexo, sutura clypeali medio transversim recta, utrinque obliqua, leviter elevata; prothorace longitudine vix latiore, antice a medio angustato, margine postico utrinque obsoletissime sinuato, transversim impressiusculo et subtiliter reflexo, angulis posticis fere rectis, anticis valde deflexis, dorso dense sat subtiliter punctato; scutello oblongo-ogivali, punctato; elytris oblongo-ovatis, medio leviter ampliatis, apice abrupte rotundatis, subtruncatis, dorso striatulis, striis extus obsoletis, intervallis sat dense sat fortiter punctatis, alternatim paulo convexis, sutura paulo elevata; pygidio subtiliter punctulato; corpore subtus longius villosus, dense subtiliter asperulo, pedibus 4 posticis elongatis, tarsis tibiis fere duplo longioribus, pedibus anterioribus brevioribus, tibiis tridentatis, dente supero valde obtuso, apicali elongato, tarsorum articulo ultimo magno, dilatato, unguibus 2 magnis, incurvis armato, externo majore acutissimo, interno brevioris, apice obtuso.*

Cet insecte est plus allongé que ses congénères. La conformation des tarses antérieurs est une exagération de ce que l'on voit chez les ♂ *Triodonta*. La longueur des tarses intermédiaires et postérieurs est plus curieuse. Le menton forme une plaque arrondie qui cache presque la bouche.

Triodonta dispar. — Long. 5 à 5 1/2 mill. — *Oblongo-ovata, ♂ nigra, nitidula, subtiliter fulvo-cinereo-sericans, lateribus fulvo-ciliata, ♀ major, elytris paulo ampliatis, rufo-testacea, fulvo-sericans; capite nigro, prothorace medio vittula longitudinalis et scutello fuscis; pedibus rufo-testaceis; capite sat lato, rugoso-punctato, antice reflexo et leviter rotundato; prothorace transverso, antice leviter angustato, lateribus paulo arcuatis, angulis posticis rectis, anticis valde declivibus, dorso dense punctato; scutello ogivali, punctato; elytris ovatis, apice abrupte rotundatis, dense rugoso-punctatis, sutura et utrinque costulis 2 paulo elevatis; pygidio fere lævi; tibiis anticis sat late tridentatis, dente supero sat obtuso.*

Cette espèce est remarquable par la différence de taille et de coloration dans les 2 sexes. Le ♂ ressemble à *T. luteipes*.

Serica fusconitens. — Long. 8 $\frac{1}{2}$ mill. — *Oblongo-ovata, sat fortiter convexa, fusca, sat nitida, paulo metallescens, capite antice attenuato et leviter reflexo, margine antico sat late sinuato, summo sat subtiliter laxo, antice sat dense fortiter punctato, inter oculos transversim sat late impressiusculo, palpis antennisque ferrugineis; prothorace transverso, antice attenuato, lateribus vix arcuatis, angulis posticis fere rectis, dorso dense sat fortiter punctato; scutello sat acute ogivali, punctato, lateribus lævigato; elytris postice leviter ampliatis, apice abrupte roduntatis, dorso striatulis, intervallis sat grosse fortiter parum dense punctatis, alternatim paulo convexiusculis, striis 2 primis apice paulo convexioribus, suturali apice cum marginali conjuncta; pygidio dense fortiter punctato; subtus dense punctata, mesosterno lato, tibiis obtuse bidentatis.*

Ressemble un peu à *S. mutata*, mais plus grande, avec le chaperon sinué au milieu, le corselet fortement ponctué et les intervalles des élytres plans, alternativement convexes.

La *S. punctatissima* Fald. doit être voisine de cette espèce; mais elle plus est petite (3 $\frac{1}{2}$ l.), avec le corselet finement ponctué, ayant de fossettes sur les côtes et à la base et les élytres avec des côtes assez saillantes.

Homaloplia ursina. — Long. 9 mill. — *Oblongo-ovata, valde convexa, fusco-nigra, nitida, pilis supra nigris, subtus fulvescentibus longe et dense hirta; capite planato, grosse fere ocellato-punctato, margine antico fere truncato, ad angulos sat rotundato, reflexo et cum lateribus reflexo, sutura clypeali fere indistincta; prothorace transverso, elytrorum basi haud angustiore, antice angustato, lateribus rotundato, dorso fortiter sat dense punctato; scutello ogivali, parum dense punctato, lateribus paulo elevato; elytris ovatis, medio paulo ampliatis, apice fortiter rotundatis, dorso striatis, intervallis vix convexiusculis, rugosulis, irregulariter sat laxo et sat grosse punctatis; pygidio et propygidio asperulis; subtus cum pedibus asperulo-punctata, abdomine magis asperato; tibiis anterioribus acute bidentatis, unguibus piceo-rufis.*

Ressemble un peu à l'*holosericea*, mais bien distincte par sa taille plus forte, sa longue villosité et les élytres moins courtes arrondies à l'angle sutural, avec les intervalles plus ponctués ainsi que le corselet; le mésosternum est aussi plus large.

Homaloplia mutilata. — Long. 7 mill. — *Brevissime ovata, valde convexa, nigra, modice nitida, glabra; capite subtiliter punctulata, antice leviter attenuato et fere truncato, utrinque sat obtuse angulato; antennis fuscis; prothorace elytrorum basi paulo latiore, longitudine paulo plus duplo latiore, antice angustato,*

lateribus sat rotundatis, dorso subtiliter sat dense punctulato; scutello triangulari, paulo punctulato; elytris brevibus, lateribus sat rotundatis, apice abrupte truncatis, dorso striatulis, striis parum impressis, sed sat latis, intervallis punctatis; pygidio convexiusculo, subtiliter asperulo; subtus vix nitidior, coxis posticis fortiter punctatis et cum pedibus, nitidioribus. — Smyrne.

Espèce bien distincte par son corps trapu et ses élytres nettement tronquées, paraissant coupées à l'extrémité.

Tanyproctus rugosulus. — Long. 7 à 9 $\frac{1}{2}$ mill. — Cette nouvelle espèce ressemble beaucoup au *T. (Brachydemia) Barryi* Fairm., du Liban central; mais la forme des élytres est plus large, plus courte et leur coloration bien moins sombre, d'un marron assez clair; en outre leur ponctuation est bien plus forte, sans être plus serrée, l'intervalle sutural est fortement ponctué et un peu rugueux, la tête et le corselet sont un peu plus fortement ponctués, le pygidium est à peine plus ponctué; enfin le mésosternum est presque rugueusement ponctué avec les sillons plus marqués, et le petit sillon médian du corselet est bien plus court.

Orthopleura funebris. — Long. 7 mill. — *Elongata, nigra, nitida, sat dense nigro-villosa, abdomine rufo; capite dense punctato, inter oculos impresso; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine haud latiore, dense punctato, antice utrinque obsolete transversim impresso, angulis posticis obtusiusculis; scutello convexo, punctato, elytris elongatis, apice separatim rotundatis, dorso subtiliter punctato-rugosulis, basi paulo fortius, postice punctis setigeris rarius sparsutis; subtus lævius et paulo nitidior.*

Diffère du *sanguinicollis* par sa forme étroite, le corselet n'étant pas plus large que long, sa ponctuation bien plus forte et sa coloration, ses élytres plus longues et plus parallèles.

Colpotus magnicollis. — Long. 10 mill. — *Oblongo-subquadratus, niger, parum nitidus, sat convexus; capite subtiliter dense punctulato, clypeo arcuatim late emarginato, angulis rotundatis; antennis parum gracilibus, prothoracis basin haud attingentibus, articulis paulo nodulosus; prothorace amplo, elytris haud angustiore, transverso, antice paulo angustato, lateribus leviter arcuatis, dorso densissime strigoso-punctato, lateribus densius strigoso, basi late emarginata, angulis parum obtusis, anticis acutiusculis; scutello brevi, obtuso, vix punctulato; elytris apice tantum angustatis et rotundatis, fortiter punctato-striatis, intervallis planis, subtiliter dense punctatis; subtus cum pedibus nitidior, prosterno dense fortiter strigoso, pectore rugoso-punctato lateribus fortius, abdomine subtiliter sat dense punctato, lateribus rugosius et impressiusculo, pedibus validis, femoribus posticis*

subtus dense fulvo-pilosis, tibiis anticis apicem versus dilatatis.

Diffère des autres *Colpotus* par sa forme large, non atténuée en arrière, ses antennes moins grêles, un peu noduleuses; la sculpture du corselet et la forme du bord postérieur le rapprocheraient du *C. byzantinus*, mais la forme générale, la taille et la sculpture des élytres sont bien différentes.

Opatroides curtulus. — Long. 7 mill. — *Oblongus, convexus, niger, nitidulus; capite prothoraceque subtiliter punctatis, illo parum convexo, elytris triangulariter emarginatis, antennis basin prothoracis haud attingentibus, parum crassis, articulis 8-10 transversis, paulo latioribus, ultimo breviter ovato, 3^o sequenti paulo longiore; prothorace transverso, elytris fere latiore, antice vix angustiore, lateribus parum arcuatis, basi fere recta, ante angulos vix sinuata, his fere rectis; scutello punctulato, valde obtuso aut fere truncato; elytris oblongo-ovatis, ad humeros rotundatim angulatis, apice rotundatis, dorso subtiliter substriato-punctatis, intervallis planis, subtilissime punctatis; subtus punctato-rugosulus, prosterno lateribus magis rugoso.*

Très voisin du *subcylindrus*, mais plus court, plus petit, l'échancrure du chaperon plus profonde, l'écusson plus court, ponctué, les élytres plus courtes, mais à sculpture identique, et moins fortement rugueux en dessous.

Mycetochares grandicollis. — Long. 6 1/2 mill. — *Elongata, subparallela, nigro-fusca, nitida, antennis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis, antennis fractis, an apice infuscatis? capite sat lato, punctulato, inter oculos obsolete impressiusculo, epistomate et labro pallide fulvis; prothorace elytris basi haud angustiore, medio paulo ampliato, antice paulo angustiore, sat fortiter sat dense punctato, basi utrinque foveolato, medio impressiusculo, angulis posticis acute rectis; scutello subtiliter punctato, apice fere truncato; elytris oblongis, apice conjunctim rotundatis, punctulato-striatis, striis parum impressis, 2 primis profundioribus, externis fere obsoletis, intervallis sat dense punctatis, paulo rugosulis, planiusculis, 3 primis convexiusculis; subtus fere lævis, prosterno lateribus fortiter punctato.*

Cette *Mycetochares* est remarquable par l'ampleur du corselet qui est aussi large que les élytres.

Mycetochares longior. — Long. 5 mill. — *M. lineari similima et similiter colorata, sed statura angustiore et minore, prothorace brevior, lateribus postice haud ampliatis, dorso minus convexo, impressiusculo, ad angulos posticos deplanato, elytris longioribus, minus convexis, striolatis, striis 3 primis sat profundis, intervallis subtilius rugosulis distincta.*

La *M. rudis* Küst., de Grèce et de Turquie, paraît voisine de cette espèce, mais elle est bien plus grande, finement ponctuée, le corselet est moins court, et les stries des élytres sont toutes subsulciformes.

Cistela forticornis. — Long. 10 mill. — *Oblongo-elliptica, modice convexa, fusco-cærulescens, nitida, elytris testaceo-castaneis; capite sat subtiliter dense punctato, antice transversius sat fortiter impresso, fronte medio leviter foreolata; antennis corpore vix brevioribus, articulo 2° brevissimo, 3° quarto parum brevioribus; prothorace valde transverso, elytris angustiore, antice angustato, lateribus leviter armatis, angulis posticis acute rectis, dorso dense subtiliter punctulato, basi medio et utrinque leviter impresso; scutello valde obtuso, dense punctulato; elytris elongatis, postice angustatis et apice obtusis, sat fortiter striatis, striis sat subtiliter punctatis, intervallis planis, subtiliter et postice obsolete punctulatis; subtus dense subtilissime punctata, tibiis tarsisque fusco-piceis.*

Ressemble beaucoup à la *C. ceramboïdes* mais plus petite, moins convexe, les élytres plus parallèles, les antennes plus longues, à articles non angulés à l'extrémité, le 3^e moins court, la ponctuation de la tête et du corselet est bien distincte, ce dernier a une faible impression au milieu de la base, l'écusson est très obtus, les stries des élytres sont moins ponctuées et les intervalles sont plus plans; la coloration du corps est plus brillante, faiblement métallique et celle des élytres un peu plus rougeâtre.

Cistela flavida. — Long. 10 mill. — *Oblonga, convexa, flava, sat nitida, elytris paulo sulphureis, subtilissime pubescens, antennis obscurioribus; capite brevi, subtiliter densissime punctulato, antice transversim profunde sulcato; antennis validiusculis, articulo 3° quarto vix longiore; prothorace elytris vix angustiore, longitudine fere duplo latiore, lateribus cum angulis anticis rotundatis, angulis posticis obtusis, basi fere recta, dorso densissime subtilissime punctato, postice medio obsolete impresso; scutello obtusissimo, punctulato; elytris oblongo-ovatis, ad humeros angulatum rotundatis, medio indistincte ampliatis, dorso subtiliter striatulis, stria suturali et striis aliis apice distinctioribus, intervallis planis, subtilissime vix perspicue densissime punctulato-alutaceis; subtus fere lævis, prosterno et metasterno angustis, processu intercoxali brevissimo.*

Bien distincte par sa coloration et sa forme assez courte et convexe, et son corselet ample, à angles postérieurs obtus.

Gonodera Delagrangi. — Long. 9 mill. — *Oblongo-elliptica, sat convexa, fusca, nitida, pube subtili fuliginosa dense*

vestita, antennis, ore pedibusque obscure ferrugineis; capite subtiliter dentissime punctulato, antice transversim fortiter impresso, oculis approximatis, antennis validiusculis, corpore parum brevioribus, opacis, articulo 1° excepto, 3° secundo paulo longiore; prothorace brevi, elytris vix angustiore, antice valde angustato, lateribus armatis, dorso subtilissime dense punctulato, basi subtiliter marginato, utrinque sinuato; scutello obtuse triangulari; elytris oblongis, medio haud ampliatis, subtiliter densissime punctulatis, stria suturali impressa et intus striola obsoleta, postice paulo evidentiore; subtus dense punctulata.

Ressemble beaucoup à *H. rufipes*, mais plus allongée, plus noire, avec les antennes plus robustes et plus longues, le 3° article un peu plus long que le 2°, mais atteignant à peine le quart du 4°, en outre les yeux sont un peu plus rapprochés et les côtés du corselet sont moins arrondis.

Gonodera atronitens. — Long. $5\frac{1}{2}$ mill. — *Oblonga, modice convexa, nigra, valde nitida, antennis pedibusque fuscis; capite subtiliter dense punctato, antice fortiter transversim impresso, antennis sat validis, dimidium elytrorum superantibus, articulis apice angulatis, opacis et densissime punctatis, articulo 1° excepto articulis 2°3°que brevibus, æqualibus; prothorace transverso, elytris haud angustiore, a basi antice sat fortiter angustato, lateribus arcuatis, dorso subtiliter punctulato, basi anguste marginato et utrinque leviter firmato, angulis posticis vix rectis; scutello minuto, triangulari; elytris oblongo-ovatis, basi truncatis, pilosulis, subtiliter et subseriatim asperulo-punctatis.*

Dans cette espèce les 2° et 3° articles des antennes sont très courts et égaux; les antennes sont assez fortes et les articles assez fortement angulés à l'extrémité et la ponctuation des élytres est un peu râpeuse.

Eryx asiatica. — Long. 11 mill. — *Oblongo-ovata, sat convexa, nigra, modice nitida, glabra, pedibus piceis, femoribus paulo obscurioribus; capite densissime subtiliter punctulato, medio transversim profunde sulcato, oculis valde convexis, parum distantibus, antennis medium corporis haud attingentibus, parum gracilibus, articulis parum serratis, 3° quarto paulo longiore; prothorace brevi, antice valde angustato, lateribus vix arcuatis, dorso densissime subtiliter punctulato, margine postici utrinque late sinuato, angulis posticis acutissimis; scutello triangulari, punctulato; elytris oblongo-ovatis, post medium vix sensim ampliatis, subtiliter punctato-striatulis, striis apice et ad suturam profundioribus, intervallis planis, subtiliter densissime punctatis; subtus nitidior, densissime subtiliter asperulo-punctata, processu intercoxali acuto.* — Smyrne.

Ressemble assez à l'*E. lugens*, mais plus allongé, avec les stries des élytres plus distinctes, les intervalles plus plans, les yeux plus rapprochés et les antennes un peu en scie.

Cteniopus impressicollis. — Long. 7 mill. — *Oblongo-elongatus, sulphureus, fere opacus, antennis, tarsis et palporum articulo ultimo fuscis antennarum articulo 1^o dilutiore; capite ovato, subtiliter densissime punctulato, antice transverium profunde sulcato, antennis gracilibus medium elytrorum superantibus, articulo 3^o sequentibus haud longiore; prothorace transverso elytris paulo angustiore antice angustato, lateribus rotundatis, dorso subtilissime densissime punctulato, disco elevato, paulo rufescente, postice angustato et utrinque fortiter impresso; scutello acute triangulari; elytris elongatis, ad humeros angulatim rotundatis, apice rotundatim subtruncatis, dorso subtilissime striatulis, intervallis planis, subtilissime strigosulo-aluvaceis, subtilissime pubescentibus; subtus similiter pubescens, tarsis gracilibus, haud lamellatis, articulo ultimo sulphureo.*

Ressemble au *C. sulphureus*, mais plus court, avec les antennes moins longues d'un brun noirâtre ainsi que les tarses et le dernier article des palpes; le corselet est remarquable par son disque formant un espace plus convexe, n'atteignant pas le bord antérieur, rétréci à la base avec une forte impression de chaque côté.

Cteniopus? crassus. — Long. 10 mill. — *Ovato-oblongus, sat convexus, flavo-rufescens, sat nitidus, subtiliter sat dense pubescens, elytris pallidioribus, capite sat lato, dense subtiliter punctulato, mandibulis et palpis maxillaribus apice infuscatis, antennis crassiusculis, sat brevibus, basin prothoracis paulo superantibus, articulo ultimo graciliter appendiculato; prothorace transverso, elytris haud angustiore, lateribus leviter, antice cum angulis rotundato, margine postico fere recto, angulis valde obtusis, dorso densissime subtilissime punctulato; scutello obtuse ogivali, similiter punctulato; elytris oblongo-ovatis, postice leviter ampliatis, subtilissime dense reticulato-punctulatis, subtiliter striolatis, striis primis magis evidentibus, externis obsoletis; pectore subtiliter, abdomine subtilius punctulatis, hoc lateribus impressiusculo, prosterno et mesosterno inter coxas angustissimis, pedibus parum gracilibus, tibiis asperulis et breviter setulosis, tarsis subtus hispidulis, posterioribus articulo 1^o ceteris conjunctis fere æquali.*

Le faciès de cet insecte est plutôt celui des *Hymenalia*, mais les antennes ne sont pas grêles, le 3^e article est égal au 4^e, le dernier article des palpes maxillaires est seulement un peu élargi à l'extrémité, et obliquement tronqué, le bord postérieur du corselet n'est pas bisinué, les hanches postérieurs sont presque contiguës

et les tarses ne sont pas lamellés. Mais d'un autre côté l'abdomen n'est composé que de 5 segments tandis que les mandibules me paraissent entières à l'extrémité; la saillie intercoxale est courte, assez pointue. Ce sera sans doute le type d'un nouveau genre avec des caractères plutôt négatifs que bien positifs.

Omophlus densepunctatus. — Long. $8\frac{1}{2}$ mill. — *O. syriaco sat similis, niger, nitidus, breviter, lateribus longe fusco-villosus; capite sat brevi, punctato, medio multo minus et inter oculos leviter biimpresso, antice transversim impresso, antennis modice gracilibus, medium corporis superantibus, articulo 3° sequenti fere dimidio longiore; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine fere duplo latiore, lateribus anguste marginatis, antice rotundatis, dorso sat subtiliter sat dense punctato, utrinque medio transversim obsolete impresso, linea media interrupta vix impressa; scutello punctulato, apice fere truncato; elytris ad humeros rotundatim angulatis, postice leviter ampliatis, apice obtusis, parum rotundatis, dorso dense punctulatis et sat subtiliter transversim rugosulis, linea juxta-suturali vix impressiuscula; metasterno vix punctulato, abdomine sat dense punctato.*

Ressemble au *syriacus* pour la coloration, mais plus petit, plus convexe, à villosité hérissée noire, plus longue sur les côtés du corselet avec la tête bien moins ponctuée, le corselet moins arrondi sur les côtés, les angles postérieurs marqués, les élytres moins amples, densément ponctuées, sans lignes enfoncées ni saillantes.

Omophlus cribricollis. — Long. $9\frac{1}{2}$ mill. — *O. orientali valde affinis, similiter coloratus, niger, sat nitidus, elytris rufis, nigro-hirtulus; capite sat brevi, convexiusculo, sat subtiliter densissime punctato, inter oculos biimpresso, antice transversim sat fortiter impresso; antennis medium corporis vix attingentibus, articulo 3° elongato; prothorace transverso, elytris sat angustiore, antice paulo attenuato, lateribus vix arcuatis, anguste marginatis, dorso subtiliter dense punctulato, undique paulo inæquali, basi subtiliter marginata, angulis obtuse rotundatis; scutello sat lato, apice rotundato, subtiliter punctulato; elytris sat brevibus, postice ampliatis, apice obtusis, dense subtiliter rugosulo-punctatis, subtiliter striatulis, striolis suturam et apicem versus paulo evidentioribus; subtus cum pedibus subtiliter coriaceus, tarsis piceis.*

Ressemble assez à l'*orientalis*, mais plus court avec le corselet plus large, densément ponctué, bien moins arrondi aux angles antérieurs, le bord antérieur presque droit, et les élytres plus finement et plus densément rugueuses.

Omophlus foveicollis. — Long. 9 mill. — *Oblongus, postice*

paulo ampliatus, convexus, supra glaber, niger, nitidus, elytris rubro-rufis, basi late, sutura usque ad medium anguste et margine externo tenuissime fuscis; capite sat dense punctato, antice transversim fortiter impresso, inter oculos utrinque foveolato; prothorace longitudine duplo latiore, elytris angustiore, lateribus rotundatis, margine antico cum angulis rotundato, basi recta, sat fortiter marginata angulis obtusissimis, dorso subtiliter punctulato, utrinque impressionibus 2 latis, profundis, extus confusis; scutello punctulato, apice truncato-rotundato; elytris ad humeros angulatim rotundatis postice paulo ampliatis, apice separatim obtuse rotundatis, sat subtiliter dense ruguloso-punctatis, basi et suturam versus lineato-punctatis; subtus cum pedibus albido-villosus, segmento ventrali ultimo medio carinato, ultimo apice sat fortiter sulcato.

Ressemble un peu au *terminatus*, mais avec la coloration des élytres renversée, le noir étant à la base et non à l'extrémité; les profondes impressions du corselet rendent cette espèce facile à distinguer.

Mylabris tenuepicta. — Long. 15 mill. — *Convexa, cærulescenti-nigra, parum nitida, elytris rufis utrinque punctis 2 minutissimis ante medium transversim positis, macula discoidali paulo post medium majore et margine apicali brevi nigris; capite prothorace haud latiore, convexo, dense sat fortiter punctato, inter oculos costula vix elevata lævi signato, sutura clypeali sat profunde arcuata, labro basi breviter sulcatulo; antennis articulis 5 primis sat gracilibus, ultimis 6 crassioribus, 8-10 transversis, ultimo paulo angustiore acuminato; prothorace parum transverso, a medio antice sat fortiter angustato, dorso haud inæquali, dense sat fortiter punctato, medio brevissime sulcatulo, basi transversim impressiusculo et utrinque plagulis 3 nitidis, minutis, lateribus utrinque medio plagula transversa, interdum interrupta signato; scutello dense punctato, apice rotundato et breviter sulcatulo; elytris breviter nigro-pilosulis, dense punctato-rugosis, sutura anguste elevata, utrinque nervulis 3 vix distinguendis; subtus cum pedibus sat subtiliter dense punctato-rugosula, pedibus validis, sat brevibus, tibiis anticis intus cinereo-pubescentibus.*

Voisin de *calida* Pall., mais bien distinct par le dessin des élytres qui rappelle celui de *M. niligena* Reiche, par la sculpture du front et par les antennes qui ne sont nullement dentées.

Mylabris posticata. — Long. 10 mill. — *Sat elongata, valde convexa, nigra, nigro- et griseo-villosa, parum nitida, elytris testaceis, basi et apice angustissime nigris, puncto aut vitta brevi humerali, puncto discoidali ante medium, macula aut puncto sub-*

marginali post medium et macula ante apicem transversa, interdum per suturam cum margine apicali coeunte nigris; capite convexo, sat subtiliter sat dense punctato, fronte medio interdum anguste elevata et nitidula; antennis brevibus, basin prothoracis haud attingentibus, clavatis, articulo 3° paulo longiore, ultimo pyriformi; prothorace transverso, subquadrato, margine postico cum angulis sat rotundato, dorso sat subtiliter sat dense ruguloso-punctato, basi interdum medio vage impresso; scutello punctato, apice rotundato; elytris postice vix ampliatis, dense punctato-rugosulis, haud nervosis, subtus nigro-villosa, cum pedibus subtiliter punctato-rugosula, pedibus sat brevibus, sat gracilibus.

Voisin de *M. Silbermanni*, en diffère par le corselet plus court, moins rétréci en avant et les taches des élytres réduites, en avant, à de petits points parfois peu distincts, la tache antéapicale restant assez développée et formant parfois une bande transversale rejoignant par la suture l'étroit liseré apical.

Lydus pilicollis. — Long. 12 mill. — *L. algerico valde affinis sed minor, elytris dilutioribus, corpore griseo-villosulo, prothorace angustiore, basi utrinque tantum marginato, scutello magis triangulari, medio impresso, elytris pubescentibus, subtilius rugulosis, abdomine fere glabro, lateribus transversim sat fortiter impresso, pedibus brevioribus distinctus.*

Lydus vulneratus. — Long. 13 mill. — *Sat elongatus, niger, nitidus, elytris rufis, paulo minus nitidis, glaber; capite prothorace medio haud latiore, vertice convexo, parce punctulato, fronte inter oculos late impressa, medio levissime elevata et signatura rufa nitida ornato, inter antennis punctata; antennis crassis, prothoracis basin paulo superantibus, apicem versus haud incrassatis, articulo 2° brevissimo, 3° sequenti paulo longiore, ultimo præcedenti vix longiore, paulo acuminato; prothorace transverso, longitudine dimidio latiore, antice vix angustiore, lateribus paulo rotundatis, dorso subtiliter punctulato, postice medio impressione breviter ovata, fundo sulcatula, lateribus convexis signato, antice transversim fortiter impresso, margine antico paulo incrassato; scutello vix punctulato, apice rotundato; elytris a medio postice leviter ampliatis, apice rotundatis, dorso dense punctato-rugosulis, sutura paulo elevata et utrinque lineis 3 tenuiter elevatis, externa submarginali; subtus fere lævis, abdomine medio sat acute carinato, segmento penultimo haud carinato, apice late obtuse sinuato.*

La forme et la sculpture de la tête, du corselet et de l'abdomen rendent cette espèce facile à reconnaître. Les antennes sont un peu plus courtes et plus épaisses à la base que chez ses congénères, le corselet est surtout bien plus court et fortement impressionné

ainsi que le front qui présente en outre un petit relief rougeâtre.

Cette particularité se retrouve chez le *L. stigmatifrons* Mars., mais ce dernier est deux fois aussi grand avec le corselet oblong, sans impressions, et les élytres marquées d'une bande suturale et d'une tache apicale.

Lydus impressicollis — Long. 12 1/2 mill. — *Elongatus, sat convexus, niger, nitidus, elytris testaceis, paulo minus nitidis, griseo-villosulus et subtus griseo-sericans; capite convexiusculo, dense punctato, fronte inter oculos longitudinaliter carinulata, antennis crassis, brevibus, prothoracis basin vix superantibus, articulo 3° sat tenui, sequenti fere dimidio longiore, ultimo pyri-formi, paulo acuminato; prothorace latitudine paulo longiore, antice paulo angustiore, cum capite villosa, sat fortiter sat dense punctato, ante medium transversim impresso et fere bifoveolato, antice transversim impresso; scutello dense punctato, apice rotundato; elytris sat elongatis, medio ampliatis, apice sat rotundatis, sat subtiliter dense punctato-rugosulis, sutura leviter elevata, basi paulo depressa, utrinque lineolis 3 tenuiter elevatis, 2 primis apice coeuntibus, externa submarginali; pedibus mediocribus, tibiis intermediis paulo arcuatis.*

Ressemble au *vulneratus*, mais les élytres sont testacées, le front n'a pas une large dépression lisse avec un petit relief rougeâtre, le corselet est bien plus long, avec des dépressions transversales mais sans sillon médian, et le corps, sauf les élytres, est revêtu d'une villosité blanchâtre assez longue, qui se change en pubescence soyeuse sur les pattes.

Zonitis gracilentia. — Long. 9 1/2 mill. — *Elongata, convexa, nigra, elytris flavo-fulvis immaculatis, Z. fulvipenni sat similis sed angustior, elytris magis elongatis, antennis gracilioribus et longioribus medium corporis superantibus, prothorace angustiore, parce punctato, medio haud sulcato, utrinque fere medio transversim fortiter impresso, scutello magis triangulari, obtuse acuminato, ruguloso, marginibus paulo elevatis, elytris longioribus valde distinguenda.*

Zonitis anatolica Friv. — Long. 9 mill. — *Præcedenti affinis, sed major, longior et magis convexa, capite, scutello et corpore subtus cæruleo-fuscis, prothorace rufo, pedibus antennisque fuscis, elytris aureo-cupreolis; capite magis cæruleo, sat fortiter punctato, medio parcius, inter oculos impressiusculo, antennis gracilibus, medium corporis fere attingentibus, articulo 2° tertio fere dimidio brevior; prothorace sicut in præcedente, sed tantum a medio angustato, dorso basi sat fortiter arcuatim sulcato, lateribus utrinque foveolis 2 minutis et disco foveola media signato; elytris*

elongatis, apice abrupte rotundatis, subtilissime coriaceis; subtus cum pedibus griseo-pubescentis, abdomine apice piceo.

Se rapporte bien à la description de l'*anatolica*, n'en diffère que par les impressions du corselet qui présente à la base un fort sillon arqué et 5 petites fossettes sur le disque et par la coloration des élytres qui sont d'un bronzé un peu doré.

Zonitis coeruleiceps. — Long. 7 mill. — *Sat gracilis, nitida, glabra, capite cæruleo, prothorace rufo, elytris æneo-viridibus, subtus cærulescens, fulvo pubescens, abdomine pedibusque rufis tarsis antennisque infuscatis, his articulis 2 primis dilute fulvis; capite convexiusculo, sat fortiter parum dense punctato, clypeo labroque piceis; antennis filiformibus medium corporis superantibus, articulo 2° tertio parum brevior, 3° 4°que æqualibus; prothorace elytris angustiore, a basi antice fortiter attenuato, dorso subtilissime punctato, basi marginato, ante basin arcuatim impresso, medio et lateribus antice leviter, impresso; scutello brevi, truncato; elytris ad humeros plicatis et rotundatim angulatis, postice levissime ampliatis, apice rotundatis, dorso subtiliter coriaceis; subtus dense coriaceo-punctata.*

Voisin de *Z. anatolica* Friv., mais d'une coloration un peu différente; cette dernière espèce a les pattes noires ainsi que les antennes, la tête violette, rudement ponctuée, le corselet peu convexe, ayant en avant une impression transversale, et les élytres d'un vert métallique, à reflets cuivreux; en outre l'abdomen n'est rouge qu'à l'extrémité. Dans notre espèce la couleur des élytres est bien d'un vert métallique, mais adouci par une teinte de laiton.

Xanthochroa foveata. — Long. 13 mill. — *X. carniolicæ simillima, sed prothorace ante basin abrupte constricto, dorso utrinque fortiter foveato, basi medio quadratim impresso, lateribus haud infuscatis, scutello medio impresso, elytris utrinque vitta submarginali fusca medio evanescente, ♀.*

Edemera apicipennis. — Long. 10 mill. — *Rufa, parum nitida, rufo-sericans, capite fusco-virescenti, nitidior, pectore, antennis (articulo 1° rufescente excepto), genibus tibiisque 4 posticis infuscatis, palpis piceis, abdomine ♂ fusco-virescenti segmentis apice fusco anguste marginatis, elytris apice anguste ac breviter fusco-virescentibus; capite sat lævi, antice leviter transversim impresso; antennis gracilibus, valde elongatis, articulo 3° sequenti paulo longiore; prothorace ante basin paulo constricto, basi medio transversim, post medium utrinque foveato, antice leviter impresso, disco paulo elevato; elytris dehiscentibus, a basi angustatis, apice obtuse subacuminatis, dorso subtiliter rugosulis, utrinque subtiliter*

sat acute bicostulatis, costula interna abbreviata, sutura anguste elevata; pedibus sat gracilibus, ♂ femoribus posticis valde incrassatis, tibiis arcuatis.

Ressemble beaucoup à l'*Æ. similis* qui se trouve en Italie et en Turquie, en diffère par la coloration des pattes et de l'abdomen; quelquefois la couleur sombre des genoux est presque effacée.

Stenaxis parallela. — Long. 6 $\frac{1}{2}$ mill. — *Minus elongata, minus convexa, fere parallela, fusca, nitida, fere glabra, elytris minus nitidis, paulo metallescentibus; capite subtiliter punctato, inter antennas late parum profunde impresso, vertice interdum obsolete sulcatulo, antennis sat validis, medium elytrorum superantibus, articulo 3° quarto æquali; prothorace brevi, subcordato, elytris valde angustiore, lateribus antice paulo rotundato-ampliat, basi vix sinuatis, basi ipsa elevata, angulis paulo exsertis, dorso subtiliter punctulato, medio transversim elevato, basi medio sat late impressiusculo et medio breviter subcarinato; scutello minutissimo; elytris fere parallelis, ad humeros sat rotundatis, apice obtusis, densissime subtiliter rugulosis, sutura et utrinque lineolis 3 tenuiter elevatis, 1^a mox abbreviata, externe longiore; subtus albido-pubescent, abdomine basi rufo.*

Bien plus petite et plus courte que *S. annulata*, avec les antennes et les pattes moins longues, les élytres moins longues et non acuminées, ayant chacune 3 lignes un peu saillantes, le corps est bien moins convexe, la coloration du dessous et des pattes est très différente.

Asclera partitipennis. — Long. 5 mill. — *Sat elongata, parum convexa, virescens, subtilissime pubescens, elytris paulo cærulescentibus minus nitidis, parte apicali fere a medio aurantiaca, antice lunata, capite densissime subtiliter punctulato, inter oculos leviter biimpresso; antennis parum gracilibus, articulo 2° primo paulo brevior, 3° quarto æquali; prothorace subcordato, transverso, lateribus antice ampliato-rotundatis, postice sinuatis, dorso densissime subtiliter punctulato, angulis posticis rectis; scutello obtuso, nitidulo; elytris paulo elongatis, postice leviter ampliat, subtiliter dense asperulis, sutura et utrinque lineis 3 subtiliter elevatis, parte aurantiaca opaca, basali subopaca; subtus cum pedibus fusco-cærulescens, subtiliter griseo-pubescent.*

Cet insecte a plutôt le faciès d'un Malachien que d'un Cédéméride, à raison de sa coloration qui rappelle assez celle des *Malachius ruficollis* et *lateplagiatus*, et qui est assez anormale parmi les vrais Cédémérides.

Chrysanthia oralis. — Long. 8 mill. — *Elongata, late metallico-viridis, pedibus brunneis, femoribus rufis, anterioribus*

supra fusco lineatis, ceteris apice longe fuscatis, tibiis anterioribus rufis, fusco lineatis aut-obscure rufis, palpis fuscis; capite dense rugosulo-punctato, inter oculos leviter biimpresso, sutura clypeali valde impressa, antennis gracilibus, fuscis, articulis primis subtus rufis, articulo 3° quarto æquali; prothorace convexo, ovato, postice angustato, lateribus vix sinuatis, antice rotundato-dilatato, angulis cum margine antice rotundatis, dorso dense rugosulo-punctato, basi transversim obsolete depresso et medio leviter impresso, linea dorsali media vix distinguenda; scutello dense punctato; elytris subtiliter dense punctato-granulatis, subtiliter fulvo pubescentibus, sutura et utrinque lineis 3 tenuiter elevatis et costula submarginali sat acute elevata; subtus densius pubescens.

Ressemble extrêmement à *C. viridis* pour la forme, la taille et la coloration, mais la tête est plus ponctuée, la bouche est concolore, les palpes sont bruns ainsi que les antennes, le corselet est plus ovalaire, les côtés moins sinués vers la base, plus rugueux ainsi que la tête, les élytres sont plus parallèles, à nervure moins saillantes, et les 4 pattes postérieures sont brunes sauf la base des fémurs.

Chrysanthia chalcocroa. — Long. 8 à 9 mill. — *Elongata, viridi-ænescens, modice nitida, elytris interdum levissime cærulescentibus, subtiliter fulvo-pubescens, palpis, antennis pedibusque fuscis, his griseo-pubescentibus; capite postice attenuato, subtiliter punctato, supra antennarum basin plicato-elevata; antennarum articulo 2° sat elongato, primo parum brevior; prothorace ovato, postice angustato, lateribus basi sinuatis, antice paulo angulatim rotundato-dilatatis, basi marginata, angulis extus prominulis, dorso subtiliter punctato-rugosulo, sat inæquali, basi medio sat fortiter impresso, linea dorsali medio dilatata et utrinque disco plus minusve elevato, lateribus medio impressis; scutello obscuro, punctulato; elytris elongatis, ad humeros sat rotundatis, postice leviter attenuatis, apice obtusis, dorso dense ruguloso-punctulatis, sutura et utrinque lineis 3 tenuiter elevatis, externa plus minusve obsoleta.*

Ressemble, pour la coloration et le faciès, à *C. varipes* Ksw., la tête est de même atténuée vers la base, mais le corselet n'est pas profondément sillonné au milieu, les pattes sont bien moins robustes, entièrement d'un brun foncé, et la bouche est concolore.

Je dois la communication de ces insectes à M. Delagrange qui les a recueillis à Akbès et à Smyrne.



Fairmaire, Léon. 1892. "Descriptions de Col." *Annales de la Société entomologique de Belgique* 36, 144–159.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/46152>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/20810>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.