

EERSTE LIJST van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna, sedert de uitgave der «Coleoptera Neer- landica» bekend geworden.

Cicindela trisignata Latr. ¹⁾. Deze, langs de kusten der Middel-landsche- en Atlantische ²⁾ zeeën voorkomende, soort werd door den heer *D. van der Hoop*, in gezelschap van *C. maritima* Latr. vliegende aangetroffen bij Oostvoorne, 13 en 30 Augustus. Een 5tal typische exemplaren werd gevangen.

1) Op blz. 27 der „Coleoptera Neerlandica“, 1ste deel, zou de tabel achter **3** aldus gewijzigd moeten worden:

3 Kaaktasters geheel metaalkleurig. Kop weinig breeder dan het halsschild 4 (3)
Kaak- en liptasters, behalve het eindlid, witgeel. Kop, met de zeer sterk uitpuilende oogen, veel breeder dan het halsschild. De zijden van het halsschild en de borst vrij lang, de coxae en de dijen dicht wit behaard. Dekschilden met gewone, niet korrelige bestippeling. Bovenzijde in kleur met *C. maritima* overeenkomende en even veranderlijk in tint, de stippels der dekschilden op den bodem blauwachtig. Dekschilden met geheel witte epipleuren en 3 smalle, witachtige banden of vlekken, nl. eene halvemaaanvormige schouderplek, welke zich met haar achtersten tak tot iets over het midden der dekschilden naar binnen buigt, aan het uiteinde iets verbreed en slechts weinig haakvormig gekromd is, een naar buiten sterk gebogen middenband, welke naar binnen tot aan het midden der dekschilden reikt en dan plotseling ver naar achteren haakvormig uitgezakt is, terwijl het uiteinde nabij den naad zich meer of minder verbreed, en eindelijk eene bandvormige topvlek, welke eene, naar voren gerichte haakvormige, voortzetting uitzendt, die nagenoeg in hetzelfde niveau gelegen is als het uiteinde van den middenband; de middenband verbindt zich met een witachtigen randzoom, die meer of minder volkomen tot aan de schouder- en de topvlek doorloopt. Bij eene bij ons niet waargenomen ab. c. * *subsuturalis* Souverb. verbreedt zich de witachtige bandteekening zoo sterk dat in het uiterste geval de grondkleur alleen om het schildje overblijft. Lengte 9—11 mm. . . 3bis. *trisignata* Latr.

4 (3) Liptasters geheel metaalkleurig enz. . . . 1. *campestris* L.
Voorlaatste lid der liptasters in den regel niet metaalkleurig enz. . 5(4)

5 (4) Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 2. *hybrida* L.
Het afhellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 3. *maritima* Latr.

(2) Volgens A. Fauvel: Manche, Carteret!, baie d'Avranches! Cancale! Quiberon! Ile d'Oléron! Gironde, Landes, Biarritz.

Abax ovalis Dfts., Gronsveld, Juni.

Ophonus signaticornis Dfts., Bunde, Juni.

Stenolophus teutonus Schrk., ab. c. *abdominalis* Gén , Arnhem en den Haag; ab. c. **hirticornis** Kryn, Arnhem.

Haliplus lineatocollis Mrsh., ab. c. **nitidicollis** Jos. M ll., Arnhem.

Coelambus impressopunctatus Schall., glanzige wijfjes algemeen, doffe wijfjes zeer zeldzaam.

Hydroporus neglectus Schaum, Maarsbergen, Mei.

Aleochara erythroptera Grav., een onuitgekleurd exemplaar bij Meerssen, April.

Atheta currax Kr., Tiel, Januari.

Bryocharis analis F., ab. c. **merdarius** Gylh., Hilversum, Juli.

Mycetoporus nanus Er., ab. c. **piceolus** Rey., den Haag, Maart.

Lathrobium elongatum L., ab. c. **fraudulentum** Ganglb., Loosduinen, Mei en bij Breda, Dec. en Januari, in aanspoelsel van de Mark.

Astenus filiformis Latr., ab. c. **humeralis** Gredl., Arnhem en Warnsveld.

Stenus incanus Er., Bunde, Juni.

» **palposus** Zett., Ommen, Augustus.

Bledius femoralis Gylh., Velp, Mei.

Oxytelus fulvipes Er., Nykerk, Mei.

Anthophagus praeustus M ll., Vlodrop, Juni.

Lesteva longelytrata Goeze, var. **maura** Er., Bunde en Roermond, Juni.

Coccinella oblitterata L., ab. c. **fenestrata** Weise, Plasmolen, April.

Cerophytum elateroides Latr., een   bij Meerssen, Juni.

Helodes marginata F., Bunde, Juni.

Ptinus coarcticollis St., Amsterdam, Mei.

Hydrothassa aucta F., ab. c. **glabra** Herbst, den Haag.

Phyllobius pyri L., var. **artemisiae** Desbr., een aantal exemplaren bij Meerssen, Juli.

(deze melanistische vorm is nagenoeg geheel zwart, ook de pooten).

Cleonus trisulcatus Herbst., Valkenberg (Limburg), Juni.



Everts, Edouard Jacques Guillaume. 1904. "Eerste lijst van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna, sedert de uitgave der "Coleoptera Neerlandica" bekend geworden." *Tijdschrift voor entomologie* 46, 135–136.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41022>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/21345>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.