

DESCRIPTION DE CLYTIDES AMÉRICAINS,

Par M. AUG. CHEVROLAT.

(Séance du 23 Octobre 1861.)

Après avoir traité des Clytides propres au Mexique (1860, p. 451 et pl. ix), à l'ancienne Colombie (1861, p. 377), et au Brésil (1862, p. 49), j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à la Société ceux qui sont originaires : 1° des Guyanes, 2° du Chili, de la Bolivie et du Pérou, 3° de la République argentine, 4° enfin des *Clytides* qui se rencontrent aux Antilles.

Dans la révision de ces Insectes, dont une grande partie rentrent dans de nouveaux genres, j'ai eu soin de consulter les divers ouvrages spéciaux; j'ai signalé quelques négligences de description et rétabli la synonymie.

Sur les 38 espèces citées, y compris le Supplément, 13 étaient inédites.

Dans le prochain mémoire, je m'occuperai des *Mallosoma* et *Eriphus*, genres américains que M. J. Thomson a placés dans cette famille, et je suivrai la même marche.

§ I. Clytides propres aux Guyanes.

1. CYLLENE CAYENNENSIS. — *Nigra, in capite fasciis tribus, in prothorace fasciis quinque (1^a et 4^a abbreviata, cinereis); in elytris lineis transversis quatuor (1^a arcuata, 2^a et 3^a antice angulatis) et macula longitudinali posticâ ad suturam; luteis, fascia 2^a et punctis duobus suturalibus ad quartam fasciam junctis et lineola apicali niveis seu luteo mixtis; lateribus corporis maculis sex vel septem: quatuor flavis et duabus sive tribus niveis.* — Long. 14 1/2 à 15 mill.; lat. 4 à 4 1/2 mill.

Clytus Cayennensis Lap. et Gory, Hist. nat. et Icon., Mon., 1841, p. 10, pl. 3, fig. 9. — Dej., Cat., 3^e éd., p. 356. — White, Cat. Br. Mus., p. 251, n^o 11.

MM. Laporte et Gory ont négligé d'indiquer les trois bandes jaunes de la tête, et ne mentionnent que *trois* lignes transverses sur le prothorax. Il en existe réellement *cinq* : la première très faible, sur le bord antérieur, et la quatrième raccourcie et oblique, située sur la tranche inférieure de l'angle postérieur, sont grises et les trois autres jaunes. Les côtés du *corps*, offrent six et quelquefois sept taches, dont quatre sont jaunes (première, deuxième, quatrième et cinquième), deux ou trois d'un blanc de lait (troisième, sixième et septième), savoir : une sur le bord inférieur du prothorax, trois sur la poitrine et deux ou trois sur l'abdomen. *Antennes* noires. *Pattes* revêtues d'une poussière grise. La tache ordinaire qui est en regard de la hanche postérieure fait ici défaut. *Pygidium* marqué d'un petit trait longitudinal.

Genre MECOMETOPUS J. Thomson. (Essai d'une classification des Cérambycides, 1860, p. 216 et 222.)

Le créateur du genre a établi deux divisions (1^a *Caput* magis elongatum; *oculi* sub integri. 2^a *Caput* minus elongatum; *oculi* paulum lunulati). La première est formée d'espèces américaines, et la seconde d'une espèce africaine.

En étudiant les espèces qui nous occupent aujourd'hui, je vois qu'il sera nécessaire de formuler les caractères d'une nouvelle division basée sur la forme de l'antenne et du prothorax, qui deviendra la deuxième, et sera probablement la plus nombreuse en espèces; alors le *M. Gabonensis* Th., type de la deuxième de M. Thomson, formera la troisième.

1^{re} DIVISION.

— ANTENNES apparaissant comme *n'offrant que dix articles*, dépassant à peine la base du prothorax, à massue renflée, presque aussi longue que les quatre premiers articles réunis, les sept suivants qui la composent, peu distincts, surtout le onzième qui est comme soudé avec le pénultième et terminé en pointe mousse; les cinq premiers de cette massue émettant chacun un bouquet de poils qui se termine en pointe. — PROTHORAX aussi haut que large, globuleux.

Types : *M. polygenus*, *globulicollis*, *curtus*, *trogloodytes*, *crassicornis*, *Wallacei*, etc.

2^e DIVISION.

ANTENNES de onze articles très distincts, un peu plus longues, à massue relativement peu épaisse, et dont les sept articles sont faciles à énumérer. PROTHORAX allongé, subcylindrique.

Types : *M. rhinotragoides*, *festivus*, *lætus*, *amabilis*, *maronensis*, etc.

Nota : Le *M. Leprieuri*, dont la massue de l'antenne est un peu plus épaisse, devra néanmoins rentrer dans ma première division, son prothorax étant allongé.

2. MECOMETOPUS TRIANGULARIS. — *Niger* ; *clytrorum lineâ baseos obliquâ*, *maculâ triangulari ad suturam et fasciâ posticâ cinereis*. — Long. 6 mill. ; lat. 3 mill. — Patrie : La Guyane française.

Clytus triangularis Lap. et Gory (*loc. cit.*), p. 31, pl. VII, fig. 38.

3. MECOMETOPUS CRASSICORNIS. — *Coriaceus*, *niger* ; *capite rufulo*, *obsulcato* ; *palpis luteis* ; *antennis brevibus, clavatis, nigris* ; *prothorace globoso*, *pube brevissima grisea tecto*, *lineis duabus asperato* ; *scutello*, *in elytris striga obliqua antice conica*, *macula communi triangulari*, *punctulo ad medium marginis*, *fascia ultra medium extus angustata* ; *in pectore notula arcuata laterali*, *fascia lata in medio : læte flavis* ; *abdomine*. . . . — Long. 8 mill. ; lat. 3 3/4 mill.

Clytus crassicornis Dej. Cat., 3^e éd., p. 356.

Cette espèce est voisine du *C. triangularis* Lap. et Gory ; elle s'en distingue par la couleur des antennes et du prothorax et le manque de tache sur cette partie du corps.

Court, épais, coriacé, noir. Tête d'un noir rougeâtre, faiblement sillonnée sur la longueur. Palpes d'un roux pâle. Mandibules noirâtres à l'extrémité. Yeux bruns. Antennes d'un brun luisant, dépassant à peine la base du prothorax, minces, avec les cinq derniers articles renflés ; les trois premiers de la massue émettant chacun un pinceau de poil aigu. Prothorax globuleux, recouvert d'une courte pubescence cendrée, deux séries longitudinales et contiguës d'aspérités transverses. Écusson semi-arrondi, d'un jaune soufre. Élytres de la largeur du prothorax, une fois et demie aussi longues, tronquées obliquement sur la suture, avec une petite épine externe ; au dessous de la base se remarque un trait oblique en forme de

cône et dont la base est en avant, une tache triangulaire commune qu'avoisine un petit point marginal, et une bande brusquement arquée, n'offrant qu'un mince filet oblique. Tous ces signes sont d'un beau jaune soufre. *Poitrine* traversée par une large bande et un petit trait oblique sur le côté, jaunes. L'abdomen manque.

Unique, de la collection de feu Dejean, rapporté de la Guyane française par M. Th. Lacordaire.

4. MECOMETOPUS GLOBULICOLLIS. — *Thorace globulari, niger; elytrorum lineâ baseos obliquâ, maculâ triangulari ad suturam et alterâ posticâ transversâ albis.* — Long. 11 mill.; lat. 3 mill. — Patrie : La Guyane française.

Clytus globulicollis Lap. et Gory, *loc. cit.*, p. 32, pl. 7, fig. 39. — White, *Cat. B., Mus.*, p. 258, n° 44.

5. MECOMETOPUS TROGLODYTES. — *Niger; thorace ovato; elytrorum lineâ baseos obliquâ; maculâ suturali triangulari et lineolâ posticâ transversâ albis.* — Long. 8 1/2 mill.; lat. 5 mill. — Patrie : La Guyane française.

Clytus troglodytes Lap. et Gory, *loc. cit.*, p. 33, pl. 7, fig. 41. — White, *Cat. B., Mus.*, p. 258, n° 45.

6. MECOMETOPUS CURTUS. — *Thorace elevato, niger; elytrorum maculâ baseos obliquâ; altera triangulari ad suturam et tertia in medio luteis.* — Long. 8 mill.; lat. 3 3/4 mill. — Patrie : La Guyane française.

Clytus curtus Lap. et Gory, *loc. cit.*, p. 34, pl. 8, fig. 42. = *Clytus festivus* var.; White, *Cat. B., Mus.*

7. MECOMETOPUS FESTIVUS. — *Thorace rotundato, niger, elytris maculis tribus flavis.* Long. 10 1/2 mill.; lat. 3 mill. — Patrie : La Guyane française. Le Brésil ?

Clytus festivus Fab. *Sys. El. II*, p. 348, n° 11. — Lap. et Gory, *loc. cit.*, p. 85, pl. 16, fig. 98. — Sch., *Syn. Hist.* 1-3, p. 465, n° 17. — White, *Cat. B., Mus.*, p. 259-49.

8. MECOMETOPUS LÆTUS. — *Thorace rufo, elytris truncatis atris; maculis tribus flavis, antennis pedibusque ferrugineis.* — Long. 11 mill.; lat. 3 mill. — Patrie : Le Brésil, Para, la Guyane, Demerari.

Clytus lætus Fab. *Sys. II*, p. 348, n° 12. — White, *Cat. Br., Mus.*, p. 259, n° 47.

9. MECOMETOPUS AMABILIS. — *Brunneo-opacus*; capite, prothoraceque (longitudine asperato) rufis; antennis medio brunneis, 1° art. rufo, quinque ultimis luteis; elytris fascia basali, striga obliqua infra, macula magna communi trigona et fasciola recta ad tertiam partem longitudinis; luteis; tertia parte apicali cinereo-fusca; in pectore lineolis tribus et in abdomine fasciis duabus albidis; pedibus brunneo-ferrugineis. — Long, 10 mill.; lat. 3 mill.

Clytus amabilis Dej. Cat., 3^e éd., p. 356.

D'un brun opaque. Tête rousse, tronquée en devant, allongée en avant, ruguleuse, faiblement sillonnée entre les antennes. Mandibules noires à l'extrémité. Yeux d'un roux clair. Antennes minces, un peu renflées au sommet; le premier article est d'un roux clair, les quatre suivants bruns et luisants (le troisième est excessivement long), avec les cinq derniers d'un jaune phosphore. Prothorax allongé, ovalaire, roux, offrant un peu avant le milieu une sorte de bande rougeâtre, deux séries longitudinales d'aspérités transverses. Écusson court, large, déclive, roux. Élytres un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande étendue, une fois et demie aussi longues, subparallèles, tronquées carrément au sommet avec l'angle marginal à peine aigu. Elles sont d'un brun noirâtre terne, ornées des signes suivants du plus beau jaune soufre, savoir: bande basale étroite, trait oblique au-dessous, ayant l'extrémité supérieure rapprochée de l'écusson et l'inférieure sur le bord de la marge, et, un peu avant le milieu, une grande tache triangulaire commune, à base rectiligne, avoisine la marge vers le milieu de la longueur, de plus se voit une légère frange sur la limite du brun; tiers apical brun cendré. Poitrine ayant trois traits blancs. Abdomen sur les deux premiers segments présentant chacun une bande blanche. Pattes ferrugineuses; cuisses postérieures rembrunies.

De la Guyane française. Unique.

Cette espèce ressemble un peu au *M. rhinotragoïdes*.

10. MECOMETOPUS RHINOTRAGOIDES. — *Brunneo-rufescens*, velutinus; antennæ art. 5-11 flavi; clytra basi flavescencia; deinde nigra, a tertia parte posteriore, usque ad apicem flavescencia vel grisescencia, antice maculis 2-flavis obliquis, et macula communi, suturali, trapezoidali, ornata; mesosternum late oblique flavo-fasciatum; metasternum macula, arcuata, magna transversa antice ornata; epipleura metathoracica singula longitudinaliter maculata; abdominis segmenta 1 et 2-flava; corpus minute granulosum, vix elongatum, parallelum. — Long. 10 mill.; lat. 3 mill. — De la Guyane française, des bords du Maroni.

Mecometopus rhinotragoïdes, Thoms. Essai, 1860, p. 224, 135.

11. MECOMETOPUS LEPRIEURI. — *Castaneo-fuscus, scutello albo; elytrorum maculâ ad marginem externam erecta, altera triangulari ad suturam et lineâ transversali posticâ albis.* — Long. 13 1/2 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Patrie : La Guyane française.

Clytus Leprieuri (Buq.) Lap. et Gory. *loc. cit.*, p. 29, pl. 6, fig. 34. — White, *Cat. B., Mus.*, p. 260, n° 50.

12. MECOMETOPUS MARONENSIS. — *Niger velutinus; prothorace cinereo fascia antice nigra dimidiam partem superficiei occupantem, lineâ dorsali aspera; elytris fasciola intra basali, striga obliqua, magna macula communi trigona, alteraque fascia ante apicem cœrulescentibus; 2^a atque 3^a ad apicem flavo tinctis; lateribus pectoris maculis duabus et abdomine fasciis duabus niveis; antennarum articulis sex ultimis luteis, clava tenui elongata.* — Long. 9 mill.; lat. 2 mill. — Patrie : Guyane française, bord du Maroni.

D'un beau noir velouté. *Tête* en museau, d'un noir opaque, finement coriacée et pointillée, offrant une ligne ou faible côte longitudinale luisante; le bord du chaperon et les mandibules sont également luisants. *Yeux* d'un brun pâle doré. *Antennes* dépassant d'un cinquième la base des étuis, d'un brun noirâtre, troisième article fort long, les six derniers d'un jaune terreux; massue modérément renflée et allongée. *Prothorax* arrondi, coupé droit aux extrémités, d'un bleu lavande en dessus, d'un peu moins de la moitié postérieure; l'autre moitié est noire, et la ligne dorsale élevée couverte de fines aspérités transverses. *Écusson* noir. *Élytres* d'un beau noir velouté, offrant une étroite bande qui est placée sur la base elle-même; un trait oblique qui part du milieu de la marge est dirigé vers l'écusson; une grande tache triangulaire, médiane, et une large bande en arrière, d'un bleu pâle avec mélange de jaune au sommet du trait et de la tache centrale; extrémité oblique et bidentée sur chaque étui. *Poitrine* ayant un trait latéral arqué en regard de l'angle huméral, et une tache postérieure triangulaire d'un beau blanc. Le premier et le deuxième segment de l'abdomen marqués chacun d'une bande blanche. *Pattes* ainsi que le reste du corps noirs; tous les genoux sont bi-épineux.

Ce *Mecometopus* est excessivement voisin des *M. Wallacei* White (les dessins des étuis de ce dernier sont jaunes) et *polygenus* Thoms. Mais ce qui le constitue comme espèce, c'est qu'il rentre dans la deuxième division établie dans ce genre, dont l'antenne est allongée avec massue relativement longue et mince, à articles faciles à voir. De plus, la bande postérieure de l'élytre est située plus en arrière.

13. MECOMETOPUS CONSANGUINEUS. — *Niger*; *prothorace elongato cinereo-virenti*; *scutello, in elytris fasciis tribus (1^a ex humero, infra arcuata, subito recurva et ponè scutellum ampliata, 2^a media, longè triangula, 3^a paululum curvata in medio nec marginem nec suturam attingente) in pectore maculis duabus lateralibus et in abdomine fasciis tribus: læte flavis.* — Long. 10 1/2 mill.; larg. 3 mill. — Guyane française.

D'un noir velouté. *Tête* en museau, d'un noir mat, finement pointillée, granuleuse. *Palpes, lèvres et chaperon* testacés. *Antennes* à massue allongée, renflée, composée de sept articles. *Prothorax* allongé, cylindrique, d'un gris obscur mélangé de verdâtre, offrant quelques petits tubercules peu nombreux sur le disque; la base est étroitement bordée de jaune. *Écusson* semi-arrondi, d'un beau jaune. *Élytres* très obliquement tronquées, épineuses sur chaque angle, ornées chacune de trois bandes d'un jaune vif: première, partant de l'épaule, dirigée en dessous, subitement relevée et oblique, elle s'élargit près de l'écusson et se termine à la hauteur de la branche parallèle; deuxième commune, médiane, étroitement et longuement triangulaire et presque liée à un petit trait en marge; troisième entre la précédente et le sommet, arquée en dessus, disjointe de la marge et de la suture. *Corps* en dessous avec un petit trait jaune sur le métasternum; une bande de même couleur, élargie coniquement en dehors sur la poitrine. *Abdomen* offrant sur les premier et deuxième segments une bande large et jaune; le troisième en présente une étroite qui est obsolète et grise. *Pattes* assez longues, couvertes d'un pointillé scabreux; cuisses régulièrement renflées, postérieures plus longues que les étuis; genoux postérieurs bi-épineux.

J'ai adopté, pour cette espèce et la suivante, le nom que leur avait donné M. Henry Dupont lorsqu'elles faisaient partie de sa collection.

14. MECOMETOPUS FUNEREUS. — *Validus, niger, crebre punctatus et granulatus*; *prothorace in dimidia parte postica, scutello ad apicem, in singulo elytro striga obliqua infra basin, macula media communi magna et triangulata, fasciæque ultra medium: cinereo-cæruleis; fascia meta-thoracis, macula trigona et linea laterali in pectore, fasciis duabus in abdomine atque sex ultimis articulis antennarum: albis.* — Long. 12 mill.; lat. 3 mill. — Guyane française.

♀. Epais, cylindrique, noir. *Tête* allongée en museau, finement et densément chagrinée, offrant un léger sillon en avant des antennes. *Palpes, lèvres et chaperon* testacés ou couleur de poix. *Yeux* d'un brun pâle. *Antennes* très modérément renflées, dépassant la base des pattes médianes, noires,

avec les six derniers articles d'un testacé blanchâtre. *Prothorax* arrondi, un peu plus long que large, ayant un peu moins de la moitié antérieure noire et l'autre moitié d'un cendré bleuâtre. *Écusson* semi-arrondi, noir, à bordure postérieure cendrée. *Élytres* carrément tronquées à l'extrémité, à angle externe à peine senti; noires, ornées chacune d'un trait oblique avoisinant d'une part la marge et de l'autre l'écusson, d'une grande tache triangulaire, ayant sa base droite entière, située au milieu de la longueur et sa pointe sur la suture et une large bande avant le sommet, tous trois d'un gris bleuâtre. *Corps* en dessous d'un noir cendré, une bandelette transverse sur le métasternum, une bande élargie de chaque côté, avec une ligne latérale sur la poitrine et une large bande sur les premier et deuxième segments de l'abdomen, toutes d'un beau blanc. *Pattes* noires recouvertes de cendre, finement granuleuses; cuisses épaisses, postérieures d'un tiers au moins plus longues que le corps; genoux intermédiaire uni et postérieurs bi-épineux.

Cette espèce et la précédente font partie de la collection de M. le comte de Mnjszech.

§ II. Clytides propres au Chili, à la Bolivie et au Pérou.

1. *CYLLENE CHILIENSIS*. — *Nigra*; *capitis lineâ postica, thoracis lineis transversis* quinque, *elytrorum fasciis quatuor arcuatis et lineâ suturali postica, corporis subtus maculis septem (ultima albidula)*: *flavis*; *pedibus nigris vel rubicantibus*. — Long. 41 mill.; lat. 4 mill. — Du Chili et du Pérou.

Clytus Chiliensis (Chevr.) Lap. et Gory, *loc. cit.*, p. 44, pl. 3, fig. 12. — White, *Cat. B., Mus.*, p. 252, n° 16. — Blanch. in Gay, *Hist. física*, V, p. 486, 3. — Fairm., *An.*, 1859, p. 504, 3.

Le type provenant de ma collection était un insecte à moitié usé. La description donnée par les auteurs de la monographie se trouvant tout à fait défectueuse, j'ai dû donner une diagnose nouvelle d'après un deuxième exemplaire parfait.

Le prothorax n'offre pas, comme il est dit, une seule bande, mais bien cinq; la base des élytres indiquée comme rouge est due à l'enlèvement

de la pubescence noire et jaune ; quant aux antennes, elles ne sont pas jaunes, mais bien noires. L'exemplaire du Chili a les pattes noires, et celui du Pérou les a ferrugineuses.

2. CYLLENE BORYI. — *Fusca, fere nigra; thoracis lineis 4-transversis, elytrorum lineis 5-transversis luteis.* — Patrie : Chili.

Clytus Boryi Lap. et Gory., *loc. cit.*, Mon., p. 12, pl. 3, fig. 13. — White, Cat. Br., Mus., p. 253, n° 17. — Blanch. in Gay, Hist., fis. V, p. 486, 3. — Fairm., An. 1859, p. 504, 2. — Long. 10 mill.; lat. 5 mill.

3. CYLLENE BOLIVIANA. — *Affinis C. Cayennensi* Lap. Gory, *nigra, velutina; in capite fasciola postica extus oculos protensa et macula intra oculari; in thorace fasciis quinque (1^a et 4^a abbreviata, cinereis); scutello, in elytris lineis quinque transversis (1^a late arcuata, 2^a et 3^a flexuosis at suturam antice angulatis, 4^a obliqua, punctis duobus suturalibus albis, 5^a etiam oblique subito flexa longe suturam ducta); lateribus corporis utrinque maculis septem : flavis; ore pedibusque rufis.*

Cette espèce est intermédiaire entre les *C. Cayennensis* et *C. falsa*; elle se distingue de l'un et de l'autre par les taches du dessous du corps qui sont totalement jaunes, et par ses pattes ferrugineuses.

D'un noir velouté. *Tête* avec une bande postérieure mince et une tache entre les yeux, de couleur jaune ; parties de la *bouche* testacées. *Antennes* luisantes, d'un noir faiblement brunâtre. *Prothorax* orné de cinq bandes : première étroite et quatrième raccourcie, cendrées ; les trois autres sont jaunes. *Écusson* jaune, frangé de noir sur la base. *Élytres* offrant cinq bandes jaunes : première presque entière, largement arquée et appuyée au centre sur l'écusson ; deuxième anguleuse sur la suture, n'offrant de blanc qu'à son sommet ; troisième un peu plus transverse, liée à la précédente par la suture ; quatrième oblique, séparée d'un gros point sutural blanc ; cinquième oblique, anguleuse, se fléchissant subitement sur la suture et atteignant son sommet ; carène très saillante sur le tiers postérieur, très aiguë au sommet. *Corps* en dessous marqué sur chaque côté de sept taches transverses jaunes ; la dernière qui se trouve sur le troisième segment est seulement plus pâle, et celle ordinaire qui est en regard de la hanche antérieure fait ici défaut. *Pygidium* signalé par un trait un peu plus long que large. *Pattes* ferrugineuses, légèrement cendrées et pubescentes.

Un seul exemplaire ♀ ; fait partie de ma collection.

Cet insecte, originaire de Bolivie, a été rapporté par M. Al. d'Orbigny, qui l'a trouvé à Mojos.

4. NEOCLYTUS JEKELII. — *Fuscus; elytris cinereis, suturâ ♂ et lineolâ arcuatâ ♀ albis.* — Patrie : Le Chili.

Clytus Jekelii White, Cat. Brit. Mus., p. 254-25, F. An., 1859, p. 504-4. = *Clytus longipes* Lap. et Gory, Mon., p. 46, pl. 4, fig. 17. — Bld. in Gay, Hist. fis., V, p. 485-4. — Long. 41 mill.; lat. 3 1/2 mill.

5. NEOCLYTUS UNICOLOR. — *Obscure griseo-cinereus, elytris subfuscis, thorace carinulis tribus longitudinalibus obscuris.* — Patrie : Le Pérou.

Clytus unicolor Lap. et Gory, Mon., p. 34, pl. 8, fig. 43. — White, Cat. Br. Mus., p. 259, 46. — Long. 10 mill.; lat. 2 1/2 mill.

6. TILLOMORPHA LINEOLIGERA. — *Nigra; capite convexo, ruguloso; antennis parce pilosis, testaceis, basi nigris; prothorace convexo, sat elongato, elytris basi nigro-velutinis, apice nigro nitidis, lituris transversalibus duabus pallide flavis, prima basali recta, secunda obliqua media; pedibus nigris.* — Long. 6 mill.; lat. 1 1/2 mill. — Patrie : Le Chili.

Tillomorpha lineoligera Bl. in Gay, Hist. fisica, V, 483, 1, tab. 29, fig. 4. = *Clytus exilis* Dejean in Mus.

7. TILLOMORPHA MYRMICARIA. — *Testaceo-rufa, nitida, prothorace medio elytrisque basi obscuribus, his dimidia parte postica nigro-fusca, vitta media transversa, angusta albida, suturam versus elevata; elytris basi fortiter punctatis.* — Long. 4 à 5 mill. — Patrie : Le Chili.

Tillomorpha Myrmicaria Fairm., An., 1859, p. 503, n° 2.

8. TILLOMORPHA (BATYLE Ths., Mss.) TESTACEICORNIS. — *Nigra, crebre et fortiter punctata pilis longis vel brevibus cinereis parce vestita; antennis (tribus primis articulis nigris) testaceis; oculis globosis, antice intus valde emarginatis; prothorace globoso, modice convexo, antice posticeque recto atque marginato, opaco; elytris subnitidis, planiusculis, in humero et ad apicem rotundatis, in suturâ anguste cinereis; femoribus paululum elevatis inermibus.* — Long. 4 mill.; lat. 1 mill. — Patrie : Le Chili.

Callideriphus testaceicornis Fairm., An. 1859, p. 505, n° 3. = *Clytus tantillus* Dej.

Noire, couverte de points serrés assez profond et d'une villosité grise,

longue sur le prothorax, courte sous le dessous du corps. Tête un peu plus longue que large, granuleuse. Palpes et mandibules d'un ferrugineux obscur. Yeux saillants, arrondis, profondément échancrés en dessus au côté interne. Antennes testacées, avec les trois premiers articles noirs. Prothorax arrondi, coupé droit et rebordé en avant et en arrière, d'un noir terne, couvert d'une ponctuation serrée, profonde, rugueuse sur les bords latéraux, une ligne longitudinale lisse depuis la base jusqu'aux deux tiers. Écusson punctiforme. Élytres lisses, aplaties, arrondies sur l'épaule et sur chaque extrémité; suture étroitement grisâtre; ponctuation arrondie, serrée, profonde. Pattes moyennes et dessous du corps d'un noir brunâtre, pubescent; cuisses modérément et graduellement renflées; genoux inermes.

♂, ♀, de la collection du comte Dejean.

§ III. Clytides propres à la République Argentine.

1. CYLLENE SPINIFERA. — *Fusca, obscura, lanuginosa*; prothorax maculis duabus glabris ornatus; antennarum articuli basi cinerea; elytra fusca, maculis fasciisve lanuginosis cinereis ornata. — Long. 13 mill.; lat. 8 mill. — Patrie : Buenos-Ayres, Chili.

Cyllene spinifera New the Entomologist's, p. 7. 1840. = *Clytus nebulosus* Lap. et Gory, Mon., p. 11, pl. 3, fig. 11, 1841. — Bl. in Gay, Hist. fis. V, p. 486, 5. — Fairmaire, An. 1859, p. 504, 3.

2. CYLLENE EXSANGUIS. — *Simillima C. Acuto* Germ. sed minor, brevis et signaturis pallidioribus luteo-albidis. Nigra; in capite lineola postica oculos cingente, in prothorace lineis transversis; scutello ad apicem; in elytris fasciis quinque, lineola infra humerum punctisque duobus suturalibus albidis; corpore infra luteo; abdomine nigro, fasciis quatuor luteis medio interruptis; macula prope coxam posticam transversa fere albida. — Long. 10 à 13 mill.; Lat. 4 à 4 1/2 mill.

Clytus pallidezonus Chev., Cat. B., Mus., p. 251, n° 10. — *Brasiliensis* Dej. in Mus. var.

Cette espèce est très semblable au *C. acutus* Germ.; elle est plus petite,

plus ramassée, et les dessins, bien que disposés de même, sont plus nettement indiqués et d'un blanc jaunâtre pâle; cette couleur envahit le dessous du corps; seulement quelques lignes brunâtres transverses apparaissent vers les côtés; l'abdomen paraît noirâtre avec quatre larges bandes blanches interrompues au milieu. La tache qui est en dehors de la hanche postérieure est transverse et presque blanche par rapport au reste.

Noir velouté. *Tête* offrant en arrière une bande étroite qui entoure chaque œil, s'étend le long de la carène longitudinale et du bord antérieur. Parties de la *bouche* ferrugineuses; sommet des mandibules obscur. *Yeux* bruns. *Antennes* d'un noir tant soit peu brunâtre, de la longueur des deux tiers du corps chez le ♂ et de la moitié chez la ♀. *Prothorax* traversé par cinq lignes, quatrième courte, grise. *Écusson* à demi-noir et blanchâtre. *Élytres* ornées de cinq bandes: première oblique, presque entière, appuyée sur l'écusson; deuxième anguleuse en dessous, au milieu, et en avant sur la suture; troisième recourbée subanguleusement en dessous vers le milieu, épâtée sur la suture; quatrième courte, oblique, séparée d'une tache suturale ronde; cinquième oblique, terminée à l'intérieur par un petit crochet recourbé en arrière. *Épipleures* à la base et un petit trait allongé marginal, au-dessous de l'épaule, blanchâtres. Carène occupant près des deux tiers postérieurs, terminée en pointe aiguë. *Pygidium* marqué d'un petit trait allongé. *Pattes* d'un brun noirâtre, recouvertes d'une pubescence grise et d'un duvet assez long. *Cuisses* postérieures mouchetées de brun; genoux postérieurs brièvement biépineux.

Cette espèce paraît être commune sur les bords de la Plata. On la retrouve encore en Patagonie.

§ IV. Clytides propres aux Antilles.

1. CYLLENE DIFFICILIS. — *Subopaca, nigricans; in capite fasciola postica extus oculos protensa et limbo antico; in prothorace lineis 5-transversis, scutello in dimidia parte; in elytris fasciis tribus (2^a infra basin ultima versus apicem) et singulatim maculis sex (quarum duabus suturalibus, tribus propè marginem et sexta in medio longitudinis); corpore infra in utroque latere, maculis octo: albidis; ore pedibusque ferrugineis.* — Long. 14 à 14 1/2 mill.; lat. 5 mill.

D'un noir terne, quelque peu soyeux, avec dessins, bandes et taches d'un blanc jaunâtre pâle. *Tête* ayant en arrière une bande étroite légèrement cintrée en avant dans son milieu, entourant les yeux jusqu'à la base des antennes où elle présente un amas de poils abaissés, avec le bord antérieur d'un blanc jaunâtre; carène longitudinale sillonnée au centre. *Palpes*, *lèvre* et *chaperon* pâles. *Mandibules* d'un ferrugineux plus obscur à leur sommet. *Yeux* bruns. *Antennes* noirâtres. *Prothorax* marqué de cinq bandes, deuxième et troisième arquées en arrière; quatrième latérale, courte. *Écusson* partagé de noir en avant, de blanchâtre en arrière. *Élytres* ornées de trois bandes et chacune de six taches: première bande bi-arquée, réunie à l'écusson; deuxième anguleuse sur la suture; troisième située avant le sommet, oblique, flexueuse au centre. La première tache latérale est en forme de point et se trouve au milieu des deux premières bandes et est assez rapprochée de la marge; les deuxième et troisième sont transverses et presque en regard des deux points qui longent la suture. Enfin la sixième est au centre de ces quatre taches sur le milieu de l'étui; carène très saillante terminée en pointe aiguë. *Corselet* en dessous et *poitrine* cendrés; côté du corps offrant sur chaque bord huit taches transverses. Celle en regard de la hanche postérieure est plus nettement blanche. *Pygidium* marqué d'une tache ronde. *Pieds* ferrugineux, recouverts d'une courte pubescence grise et d'un duvet assez long. *Cuisses* renflées, coriaccées, postérieures avec deux séries de gros points; genoux brièvement épineux en dehors.

Trois exemplaires de l'île de Cuba et des environs de la Havane m'ont été envoyés par mon ami M. Poëy.

Je possède depuis longtemps dans ma collection un quatrième individu qui m'a été donné, sans désignation de patrie, par M. Gustave Silberman. Cet insecte a les plus grands rapports avec cette espèce, et voici en quoi il en diffère: taille plus forte, 16 mill. de longueur sur 5 de largeur; antennes entièrement ferrugineuses; une grande tache en plus, en forme de bande, sur le quatrième segment abdominal.

2. EURYSCELIS SUTURALIS. — *Fuscus, thorace cylindrico, elytrorum vitta suturali cinerea, pedibus obscuris.* — Long. 15 mill.; lat. 4 mill. — Patrie: Saint-Domingue.

Callidium suturale Ol. Ent., t. IV, g. 70, p. 62, n° 86, pl. 7, fig. 91, ♂. = *Clytus suturalis* Sch., Syn. Ins. I, 3, p. 473. — Lap. et Gory, Mon., p. 15, pl. 4, fig. 16 ♂. — White, Cat. Br. Mus., p. 254, 23. = *Euryscelis suturalis* Dej., Cat., 3^e éd., p. 357, ♂.

Ce genre, établi par Dejean, a pour caractère principal d'avoir *douze articles* aux antennes, la plupart des autres Clytides n'en ayant que onze. Les pattes sont excessivement longues, grêles à leur naissance; les cuisses sont en massue allongée, avec les jambes postérieures aplaties, élargies au sommet et arquées.

3. EURYSCELIS DEJEANII. — *Rubidus; thorace cylindrico, lineis tribus scabris; elytris fuscis, vitta communi grisea, antice recta, lateribus intus recurva, dein angustata, usque ad medium protensa ibique versus marginem extensa, macula subquadrata pone singulum apicem, in capite lineis duabus, vitta post oculos et lateribus corporis fasciis quinque albidis; femoribus posticis subito incrassatis, asperatis, tibiis posticis planis intus nigropilosis.* — Long. 16 mill.; lat., 4 mill. — Patrie. Saint-Domingue.

Euryscelis Dejeanii, Manh., Cat. Dej., 3^e éd., p. 357.

Rougeâtre. Tête étroitement sillonnée en avant et marquée de deux lignes antérieures et d'un bandeau blanchâtre; celui-ci est appuyé au bord postérieur des yeux et s'élargit sur le front. Yeux d'un brun noirâtre. Antennes ne dépassant pas le milieu du corps, brillantes sur les quatre premiers articles et ternes sur les suivants. Prothorax cylindrique, coupé droit et relevé aux extrémités, offrant trois séries d'aspérités qui, sur la médiane, sont largement transverses; les latérales sont arquées, base étroitement blanchâtre. Écusson semi-arrondi. Élytres planes, étroites, fauves, offrant une ligne suturale grise, tronquée en devant, coupant l'écusson par la moitié, recourbée en dessous vers les côtés, rétrécie et continuée jusqu'au milieu où elle s'étend directement vers chaque marge. Une tache de même couleur, de forme carrée, avoisine le sommet; celui-ci est échancré, biépineux, avec l'angle marginal plus aigu. Le corps, en dessous, présente de chaque côté deux bandelettes blanchâtres sur la poitrine et trois sur les premiers segments de l'abdomen. Pattes fort longues, grêles à leur naissance. Cuisses postérieures dépassant d'un tiers les étuis, subitement renflées, parsemées d'aspérités en forme de râpe. Jambes postérieures planes, bordées de poils noirs à l'intérieur.

4. NEOCLYTUS PODAGRIGUS. — *Ferrugineus, pilis brevibus flavo griseis, elytris singulis maculâ lævi ferrugineâ triangulari postice acutâ ad suturam sed non ad latus; femoribus incrassatis, tibiis posticis incrassatis fusiformibus.* — Long. 11 mill. 1/2. — Patrie : Saint-Domingue.

Clytus padagricus White, Cat. Br. Mus., p. 254-24.

5. NEOCLYTUS ARANEIFORMIS. — *Niger; thorace inæquali; elytris basi rubidis, fasciis duabus 2^a biangula, albis, sutura postice albâ; pedibus antennisque rubris, femorum apice nigro.* — Long. 6 à 15 mill.; lat. 4 1/3 à 4 1/2 mill. — Patrie : Saint-Domingue, Guadeloupe (Pointe-à-Pitre).

Callidium araneiforme Ol., Ent., t. IV, g. 70, p. 61, n° 85, t. VII, fig. 90. = *Clytus araneiformis* Sch., Syn., Ins., 1, 3, p. 468. — Lap. et Gory, Mon., p. 28, pl. 6, fig. 33. — White, Cat. B., Mus., p. 257, 33.

6. NEOCLYTUS DEVASTATOR. — *Rubro-fuscus; thorace transversim rugoso, elytrorum lineola alba cordis figuram in sutura fingente, corpore subtus albo.* — Long. 11 1/2 mill.; lat. 3 1/2 à 4 mill. — Patrie : La Guadeloupe, île de Cuba, environs de la Havane.

Clytus devastator Lap. et Gory, Mon., p. 17, pl. 4, fig. 18 bis, ♂. — White, Cat. Br., Mus., p. 255, n° 26. = *Clytus rufescens* Lap. et Gory, Mon., p. 16, pl. 4, fig. 18, ♂, var. = *Clytus cordifer* Dej., Cat., 3^e édit., p.

Les auteurs de la monographie ne parlent pas d'un petit point blanc en marge qui est situé un peu avant le milieu des élytres. La ♀ est à peine atténuée en arrière et présente un second petit point qui se réunit quelquefois au premier dessin anguleux de la suture.

Je possède deux exemplaires qui ont à peine la moitié de grandeur des grands individus, et pareil exemple se retrouve chez l'*araneiformis*.

7. NEOCLYTUS CHEVROLATII. — *Castaneus, thorace subquadrato et elytris postice luteis; his maculâ ante apicem fuscâ.* — Long. 12 mill.; lat. 4 mill. — Patrie : Ile de Cuba, les environs de la Havane.

Clytus Chevrolatii Lap. et Gory, Mon., p. 26, pl. VI, fig. 30. — White, Cat. Br. Mus., p. 256, n° 35.

8. NEOCLYTUS ANGULATUS. — *Rubro-fuscus; thorace inæquali lateribus subspinoso, elytrorum maculis 4-transversis et puncto utrinque luteis.* — Patrie : La Jamaïque; la Géorgie, suivant Olivier.

Clytus angulatus Fab., Ent. Sys. t. 1, pars 2, p. 335, 70, 1794. — White, Cat. Brit., Mus., p. 255, n° 27. — *Callidium rhombifer* Ol., Ent., t. IV, g. 70, p. 46, 63, pl. 4, fig. 51, a, b, 1795. = *Clytus rhombifer* Lap. et Gory, Mon., p. 17, pl. 4, fig. 19.

9. ANTHOBOSCUS INSULARIS. — *Obscure fuscus; scutello, elytrorum puncto baseos, altero suturali, fasciis duabus, apiceque luteis; antennis pedibusque fuscis, femoribus nigris.* — Long. 16 mill.; lat. 4 mill. — Patrie : Saint-Domingue.

Clytus insularis Lap. et Gory, Mon., p. 74, pl. 14. fig. 86. — White, Cat., Br. Mus., p. 275-107.

10. CYRTOPHORUS NIVICINCTUS. — *Rufus, longe fulvo-pilosus; elytris nigris, basi rufis, fascia recte alba ante medium in limbo anteriore anguste nigro; pedibus quatuor posticis obscuris; prothorace modice convexo, oblongo, basi constricto.* — Long. 4 mill.; lat. 1 1/2 mill. — Patrie : l'île de Cuba.

Tillomorpha? nivicineta Nob., Ann., 1862, p. 264.

Roux, couvert de longs poils blonds. *Tête* arrondie, plane, oblique. *Palpes* longs, à dernier article en cône renversé. *Yeux* latéraux, petits, entiers, non échancrés, noirs. *Antennes* de grosseur moyenne et égale, dépassant les trois quarts des étuis, un peu renflées au sommet, de dix articles, premier et troisième grands, suivants un peu plus courts, égaux. *Prothorax* allongé, oblong, très comprimé sur la base, droit aux extrémités. *Élytres* du double plus larges que le prothorax à la base, coupées droit sur le devant de l'épaule, un peu élargies au sommet qui est arrondi, mais rectiligne sur l'angle sutural; d'un noir mat, renflées à la base, avec une bande blanche étroite, directe, un peu avant le milieu; sa bordure est étroitement noire, et elle s'élargit obliquement en dessus vers la marge. *Antennes* et *pattes* antérieures ferrugineuses; les quatre postérieures sont obscures.

Cette jolie petite espèce m'a été donnée par M. Riehl. Elle ressemble un peu au *Clytus pinadeus* F. (*pini* Ol.), mais elle n'a pas d'élévation au dessous de la base des élytres, et est de moitié plus petite.

§ V. Supplément aux espèces de Clytides décrites dans les mémoires précédents.

Genre ÆTHECERUS (1).

Nouveau genre, voisin de celui de *Clytus* F. Nob. (*Plagionotus* Muls.), remarquable par les antennes du ♂ qui ont près du double de la longueur du corps; celles de la ♀ sont anguleuses au sommet des articles et ne dépassent pas les élytres.

(1) Ἀθηνας, inusité; κερας, antenne.

Caractères généraux :

Corps ailé, robuste. Tête large, tronquée, carrée en devant, élevée et évasée entre les antennes, sillonnée longitudinalement. Palpes moyens, à dernier article cylindrique, tronqué. Yeux presque anguleux en dessous, profondément échancrés en lunule en dessus. Antennes de onze articles, deuxième petit, noduleux; troisième et dixième grands, presque égaux; le onzième est le plus long, aminci sur le sommet; de la ♀ à articles anguleux à partir du troisième au dixième (le troisième est le plus allongé), et à compter du septième ils diminuent de grandeur et ont une forme conique; le onzième est de moitié moins long que le dixième. Prothorax transversalement convexe, arrondi sur le milieu latéral, droit, étroitement sillonné et rebordé aux extrémités. Écusson conique, aigu, sillonné et poilu. Élytres convexes, à troncature obtuse, arrondies sur la suture, faiblement anguleuses en marge. Abdomen de cinq segments, le dernier un peu plus grand que le premier, intermédiaires égaux. Sternum allongé, assez large, cambré, à troncature subanguleuse sur le dedans en arrière. Pattes assez fortes; cuisses épaisses, planes; postérieures, dans les deux sexes, dépassant du tiers environ de leur longueur les élytres; genoux postérieurs échancrés et brièvement bidentés. Hanches antérieures globuleuses, arrondies, peu déprimées en dessus. Cavités cotyloïdes circulaires, légèrement angulées sur le côté.

56. *ÆTHECERUS WILSONI*. — Rufus; antennis ♂ corporis duplo longioribus, ♀ tantum longitudinis ad apicem angulatis; in prothorace (punctis duobus nigris) limbo antico et postico, in elytris fasciis duabus ad marginem fere junctis: luteis (1^a basali, 2^a media obliqua antice posticeque nigro limbata ♂). Elytris ♀ nigris in basi oblique rufis usque antè secundum fasciam. — Long. 12 à 16 mill.; lat. 4 mill. — Patrie: Mexique, Texas.

Arhopalus Wilsoni J. Le Conte, *Proced of the Ac of N. sc. of Phil.*, 1860, p. 570. = *Clytus cinctus* (Chevr. Olim.).

Roux. Prothorax offrant en dessus, avant le milieu, deux petits points noirs; étroitement frangé de jaune et de noir sur les bords antérieur et postérieur. Écusson conique, aigu, sillonné au milieu, couvert de poils jaunes. Élytres du ♂ rousses, ornées de deux bandes jaunes, avec le rebord marginal de même couleur, presque réuni à la deuxième bande; de la ♀ noires, avec les mêmes bandes, mais le rebord marginal est beaucoup plus court en arrière et la deuxième bande est raccourcie et offre un petit

point jaune sur le côté; la base seule est rousse et s'étend obliquement et parallèlement au-dessus de la deuxième bande; leur sommet est étroitement roussâtre.

Cette espèce se rencontre à la fois au Texas et au Mexique. Je possède un ♂ et une ♀ de ce dernier pays, qui ont été trouvés par M. Auguste Sallé, sur la route qui conduit de la Vera-Cruz à Mexico.

57. *TILLOMORPHA HÆMATOCEPHALA*. — *Caput, primus articulus antenarum, femora antica et mediana usque ultrà medium sed postici tantum ad basin, coxæ, pectusque, rufa; antennis tenuiter pilosis, fuscis; prothorace globoso, nigricante, notulis duabus dorsalibus plagâque magnâ posticâ cinereis; elytris singulatim rotundatis basi fuscis, ad apicem latè cinereis, fasciis duabus nigricantibus: 1^a tenui obliqua, 2^a ampla, conum rufum suturalem includente, in intervallo fasciarum una fascia fusca; abdomine atque pedibus nigris cinereo-indutis.* — Long. 9 mill.; lat. 3 mill. — Patrie: Orizaba.

Cet insecte ressemble un peu à notre *Apilocera Waltli*. — *Tête, palpes* et premier article des antennes rouges. *Mandibules* noires à l'extrémité. *Yeux* entiers, noirs, bordés de roux. *Antennes* un peu plus courtes que le corps, de onze articles, la plupart allongés; le troisième est le plus grand. *Prothorax* globuleux, aminci sur la base, droit aux extrémités, noirâtre, offrant en dessus, avant le milieu, deux points et une grande tache cendrée qui s'élargit en avant et s'étend depuis la base jusqu'au delà du milieu; une bande noire, transverse, les sépare; le dessous est d'un blanc cendré, mais le bord antérieur offre une tache noire de forme carrée. *Écusson* triangulaire, cendré, roux sur les côtés. *Élytres* coupées droit sur la base, à épaules obtusément rectangulaires, un peu élargies passé le milieu, arrondies chacune au sommet, convexes; leur base est d'un roux clair, et le tiers apical est cendré et nuancé de blanchâtre sur le bord antérieur et de fauve sur la moitié postérieure; elles sont ornées de deux bandes centrales d'un brun noirâtre et présentant dans l'intervalle une autre bande grise; la première bande noire est étroite, oblique, et la deuxième, qui occupe le milieu, est large, s'avance anguleusement en dessus sur la suture et renferme une tache rousse triangulaire commune. *Poitrine* rousse, avec trait blanc en arrière et un autre sur le métasternum. *Abdomen* noir, offrant sur chaque segment une bandelette d'un blanc cendré. *Pattes* noirâtres; cuisses renflées, antérieures et médianes rouges jusqu'au delà du milieu; base des postérieures de même couleur.

Cette espèce est unique et fait partie de la très riche collection de Coléoptères du Mexique que possède M. Auguste Sallé.

16. APILOCERA GUERINII. — *Angusta, punctata nigra; capite, tertia parte antica prothoracis, elytrisque ad apicem late cinereis, fasciâ tenui mediâ eburneâ; in metathorace et ad basin pectoris linea laterali transversâ albis; tertio articulo antennarum longè spinoso.* — Long. 7 mill.; lat. 1 1/2 mill. — Patrie : Nouvelle-Grenade.

Ailée, étroite allongée, ponctuée, noire, revêtue de longs poils blonds. Tête cendrée, obliquement tronquée, à ponctuation rugueuse, sillon longitudinal peu marqué. Palpes, lèvres et chaperon testacés. Mandibules petites, noires. Yeux arrondis, roux, entourés de noir. Antennes noires, à premier article légèrement ferrugineux; troisième fort long, terminé par une longue épine. Prothorax allongé, globuleux, cendré sur le tiers antérieur, noir au delà. Écusson punctiforme, noir. Élytres aplanies sur la base, rectangulaires sur les épaules, parallèles jusqu'à la moitié, élargies au delà, arrondies au sommet de la marge, brièvement échancrées près de la suture, mais rectangulaires sur cette dernière, ornées d'une bande médiane étroite, élevée, d'un jaune d'ivoire; au dessus, sur chaque étui d'un fond grisâtre, se détache une élévation noire, étroite, longuement voûtée; le quart postérieur est cendré, mélangé de roux vers l'extrémité. Corps en dessous noir, offrant deux traits transverses blancs, l'un sur le métasternum, l'autre au bord postérieur de la poitrine. Pattes noires; cuisses renflées; jambes postérieurs arquées. Tarses roux.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec notre *spinicornis*, mais elle est différemment colorée.

Unique. Collection de M. Guérin Menneville.

17. APILOCERA BOUCARDI. — *Alata, elongata, nigra; antennis cinereis; tertio articulo longissimo, ad apicem acutè spinoso; prothorace elongato, longitudine strigoso, fasciis duabus griseis; elytris truncatis ad basin atque antè apicem cinereis, fasciola elevata et angustè eburnea antè medium sita; pedibus subpilosis, femoribus subito clavatis brunneo rufis ab ortu pallidioribus.* — Long. 7 1/2 mill.; lat. 2 mill. — Patrie : Coban, Vera-Paz.

Ailée, étroite allongée, noire. Tête à pointillé rugueux, sillonnée au milieu. Palpes noirs. Yeux arrondis en dessous, coupés obliquement en dessus. Antennes dépassant les deux tiers des étuis, de onze articles, les trois premiers d'un brun rougeâtre, suivants cendrés; le troisième est très grand et armé, à son sommet, d'une longue épine. Prothorax trois fois aussi long que large, étroit, peu convexe, faiblement atténué sur la base, droit aux extrémités, couvert de rides longitudinales, avec bord antérieur

lisse, deux bandes cendrées : l'une un peu au-dessus du milieu, et l'autre sur la base ; le dessous est à demi-noir en avant et d'un blanc soyeux en arrière. *Écusson* semi-arrondi. *Élytres* noires, deux fois aussi longues que le prothorax, droites sur la base, obtusément rectangulaires sur l'épaule, un peu plus élargies et légèrement convexes sur le tiers postérieur, tronquées sur chaque extrémité, ayant le quart basal et le tiers apical cendrés, avec moitié du dernier rembruni en arrière ; une bande droite, étroite, élevée, est d'un jaune d'ivoire ; la partie centrale noire est terne au milieu et luisante sur le bord antérieur et postérieur. *Poitrine* cendrée. *Abdomen* noir, marqué d'un trait blanc transverse qui est situé près du bord postérieur du premier segment. *Pattes* poilues, d'un brun rougeâtre ; cuisses subitement renflées ; tarses cendrés.

Je dédie cette espèce à M. Ad. Boucard, jeune compagnon de chasse et de voyage au Mexique de M. A. Sallé, à qui l'histoire naturelle devra la découverte d'un grand nombre d'espèces nouvelles de ce pays dans la plupart des règnes et des ordres.



Chevrolat, Auguste. 1862. "Description de Clytides américains." *Annales de la Société entomologique de France* 2, 517–536.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34140>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/22381>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.