

OVER DE INLANDSCHE SOORTEN VAN HET GESLACHT DELPHAX FABR.

DOOR

S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN.

In de tweede naamlijst van *Inlandsche Hemiptera*, door de Heeren Mr. H. W. de Graaf en G. A. Six met mij bijeengebragt, en uitgegeven in de beide voorgaande jaargangen van dit tijdschrift, worden (Deel V, bl. 77) slechts 6 soorten van het geslacht *Delphax* opgeteld; in eene daarbij gevoegde noot leest men overigens, dat wij behalve deze zes nog een zevental andere soorten als inlandsch kenden en ons onthielden van naamgeving en beschrijving, aangezien het mogelijk was dat zij reeds door Boheman beschreven waren.

Het ontvangen en naslaan van het *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar*, Elfte årgången 1854 (Stockholm), waarin een opstel van Dr. Carl Stål over *Delphax* aangetroffen wordt, heeft dit vermoeden grootendeels bevestigd. Van de zeven nog niet gedetermineerde soorten vond ik dat er 4 door Boheman beschreven waren, terwijl een door Stål beschreven was; de exemplaren der beide overigen hadden door beschimmelings te veel geleden, dan dat zij duidelijk herkenbaar en voor beschrijving geschikt konden geacht worden; daarentegen gelukte het mij op de excursie naar Staalduin, den 6^{den} Julij 1862, nog eene voor onze Fauna nieuwe soort in drie exemplaren te bemagtigen.

Als aanvulling der genoemde naamlijst laat ik hiernevens de opgave der zes soorten met korte beschrijving ook van de anderen volgen.

1. *D. limbata* F. Voorhoofd met één kiel in het midden, gelijk al de volgende soorten, behalven N^o. 12. Zeer licht bruinachtig geel met lichtbruine bovenlip; de lange voorvleugels wit met eenige zwarte stipjes op de aderen, zwarte randader en gebogen zwarte lijn over de vleugelhelpt; het achterlijf zwartachtig ♂ of bruin ♀; de pooten roestkleurig. — Bij Utrecht, Six.

2. *D. pellucida* F. Zwartachtig met vuilgele voorhoofdskielen, pooten en achterrand van het borststuk; de lange voorvleugels rookkleurig doorschijnend, met donkerder, gekorrelde aderen. — Bij Utrecht, Six. Bij Bennebroek, v. V.

3. *D. dispar* Zett. (moet zijn Fall.). Vuilzwart met den achterrand van het borststuk vuilwit en de lange voorvleugels doorschijnend — of wel vuilgeel; steeds met den voorrand der voorvleugels tot over de helft helder wit. — Bij Voorschoten, Leyden en Brummen, v. V. Bij den Haag, v. d. W. Bij Utr., Six.

4. *D. guttata* Germ. Geelachtig wit, met eene vlek op de wangen, de zijden van den thorax en eene onder den voorrand loopende streep der voorvleugels donkerder bruin. — Bij Driebergen, Six.

5. *D. striatella* Fall. Lichtbruin; de kielen van het voorhoofd wit met zwarte zoomen; de of zeer lange, of bijzonder korte voorvleugels doorschijnend wit met eene zwarte streep over den naad; het achterlijf zwartgevekt. — Op Staalduin drie ex., v. V.

6. *D. hemiptera* Germ. Zwartachtig ♂ of geelachtig wit ♀, met het voorhoofd en de bovenlip zwart, het borststuk aan de basis overdwers wit gestreept; de voorvleugels (meest korter dan het achterlijf) rookkleurig met gekorrelde aderen; de pooten lichtgeel, bij het ♂ iets donkerder, met zwarte uiteinden der tarsen. — Op de Gliphoeve, v. V.

7. *D. pallens* Stål. Geelachtig lichtbruin met witte kielen op voorhoofd en bovenlip, alsmede drie witte kielen overlans op het borststuk; de lange voorvleugels wit, doorschijnend; de pooten lichtgeel of wit, met zwarte klauwtjes. — Te Wassenaar en bij Staalduin in Julij, v. V.

8. *D. elegantula* Boh. Zwartachtig ♂, vuil roodachtig geel ♀, met witte, zwart omzoomde voorhoofdskielen; het voor-borststuk bij den man wit; de korte vleugels wit, doorschijnend; het achterlijf zwart met eene streep op den rug en vlekken aan den anus rood of roodbruin; de pooten roodachtig geel met zwarte uiteinden der tarsen. — In Julij bij Scheveningen vrij gemeen.

9. *D. obscurella* Boh. Donker- of lichtbruin; het voorhoofd zwart, met roodachtig gele kielen; de voorvleugels zoo lang als het achterlijf ♂ of veel korter ♀ met zeer dikke en gekorrelde aderen; de pooten lichtbruin. — Utrecht, Six.

10. *D. discolor* Boh. Zwartachtig bruin, met vuilwitte voorhoofdskielen; de achterranden van het voor- en middenborststuk vuilwit; de zeer korte voorvleugels bruin met witte randen; de pooten lichtbruin. — Bij den Haag, v. V.

11. *D. notula* Germ. Voorhoofd en bovenlip zwartachtig met witte kielen, schedel roodachtig geel; borststuk bruin met drie geelachtige langskielen; de zeer lange voorvleugels doorschijnend wit, met uiterst fijne zwarte stipjes op de aderen en een bruin streepje langs den naad; het achterlijf bruin, de pooten geelachtig wit, met zwarte uiteinden der tarsen. — Bij Utrecht, Six.

12. *D. moesta* Boh. Het voorhoofd met twee langskielen over het midden, dus 4 in het geheel; donkerbruin ♂ of lichtbruin ♀; voor- en middenborststuk lichtbruin met witten zoom; de voorvleugels of veel langer dan het achterlijf en dan vuil wit, of wel zeer kort en dan bruin met witten achterrand; de pooten lichtbruin. — Bij Utrecht, Six; in Junij op de Gliphoeve, v. V.



Snellen van Vollenhoven, S. C. 1863. "Over de inlandsche soorten van het geslacht *Delphax* Fabr." *Tijdschrift voor entomologie* 6, 10–12.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/40936>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/22785>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.