

Das Vorkommen eines Zopheriden im palaearctischen Gebiet ist von hohem Interesse. Die nächst verwandten *Nosoderma*-Arten kommen an der Westküste Amerikas, in Mexico und Californien vor, und nur eine Art *obcordatum* Kirby findet sich auf der Ostküste im Norden, in Neu-Schottland, eine weitere *echinatum* Guérin in Cuba und *N. furcatum* Kirsch in Bogota. Die californische *N. diabolicum* Lec. hat in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit der Amurensen Art.

Verzeichniss der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen.

- Falagria sulcata* Pk. — Bl. ¹⁾.
 - *fovea* Sharp. — Ch.
Silusa minor Epp. n. sp. — Ch.
Aleochara sanguinea L. — Bl.
 - *curta* Sahlb. — Ch.
 - *nitida* Grv. — Bl.
Homalota approximans Epp. n. sp. ²⁾ — Ch.
 - *rudiventris* Fauv. i. l. — Ch.
 - *analisis* Grv. — Ch.
 - *cavifrons* Sharp. — Ch.
 - *melanaria* Mannh. — Ch.
 - *pygmaea* Grv. — Ch.
 - *fungi* Grv. — Bl.
 - *orphana* Er. — Bl.
Dasyglossa prospera Er. — Ch., Bl.
Oxyptoda ferruginea Er. — Bl.
Tachyporus ruficeps Kr. — Ch., Bl.
 - *macropterus* Steph. — Ch., Bl.
 - - var. Abner Sauley — Bl.
Conurus pedicularius Grv. — Ch.
 - *humeralis* Epp. n. sp. — Ch.
Mycetoporus additus Epp. n. sp. — Bl.

¹⁾ Bl. = Blagowestschensk. — Ch. = Chabarofka. — Nic. = Nicolajefsk. — PM. = Permskoi-Muleki. — Pr. = Pochrofka. — W. = Wladiwostok.

²⁾ Die Beschreibungen der neuen Arten folgen im nächsten Hefte.

- Heterothops nitens* Nordm. — Bl.
 - *binotata* Grv. — Ch.
Quedius fasciculatus Epp. n. sp. — Nic., Ch.
Creophilus var. *ciliaris* Steph. (*fulvago* Motsch.) — Nic.
Lëistotrophus var. *inauratus* Mannh. — Nic.
Ocypus fuscatus Grv. — Nic.
Philonthus aeneus Rossi — Nic., Ch.
 - *proximus* Kr. — Ch.
 - *cephalotes* Grv. — Ch., Nic., P.M.
 - *sordidus* Grv. — Ch.
 - *rotundicollis* Mén. — Pr.
 - *varians* Pk. — Nic.
 - *albipes* Grv. — Bl.
 - *micans* Grv. — P.M.
 - var. *gilvipes* Er. — Bl.
 - *vernalis* Grv. — Ch.
Xantholinus ochraceus Gyll. — Ch.
Leptacinus batychrus Gyll. — Bl.
Cryptobium fracticorne Pk. — Ch.
 - *Koltzei* Epp. n. sp. — Ch.
Lathrobium var. *volgense* Hochh. — Ch.
 - var. *luteipes* Fauv. — P.M.
Domene procera Epp. n. sp. — W.
Sunius melanopygus Epp. n. sp. — Ch.
Paederus littoralis Grv. — P.M., Ch.
Stenus humilis Er. — Bl.
 - *rugosulus* Fauv. — Ch.
 - *clavicornis* Scop. — Ch.
 - *amurensis* Epp. n. sp. — Bl.
 - *morio* Grv. — Bl.
 - *crassus* Steph. — Bl.
 - *tarsalis* Ljungh. — P.M.
 - *conformis* Epp. n. sp. — Ch.
Oxytelus nitidus Grv. — Bl.
 - *rugosus* F. — Bl.
Oxyporus var. *angularis* Gebl. — Pr.
Pycnoglypta Heydeni Epp. n. sp. — Ch.

Dr. L. v. Heyden.



Heyden, Lucas von. 1885. "Verzeichniss der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1885(2), 307–308. <https://doi.org/10.1002/mmnd.48018850218>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103411>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48018850218>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/235348>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.