

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. **F. Karsch** in Berlin.


X. Jahrg.

October 1884.

Nr. 19.

Charaxes Hamatus n. sp.

Von Dr. H. Dewitz.



Länge des Vorderflügels 0,04 m. Im Flügelschnitt gleicht das Thier Nesiopie Hew., der Färbung nach reiht es sich den oberseits braun und schwarz gefärbten Thieren, wie Lucretius Cram., an. Das eine Stück ist dunkler als das andere.

Die Oberseite ist gelbbraun. Beide Flügelpaare werden von breiter, schwarzer, unregelmässig begrenzter Binde durchzogen. Der Vorderflügel trägt zwischen der Binde und der Wurzel einige schwarze Flecken. Während der Saum des Vorderflügels von dunklen Flecken begleitet ist, welche beim dunkleren Stück deutlicher hervortreten, verläuft neben dem Saume des Hinterflügels eine Reihe dunkler



Dewitz, Hermann. 1884. "Charaxes Hamatus n. sp." *Entomologische Nachrichten* 10, 285–286.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/39845>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/239121>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.