Eine neue Gattung der Cupesiden.

Von H. J. Kolbe.

Bis jetzt sind von dieser kleinen, aber weit verbreiteten Familie nur drei Genera bekannt, und zwar

Cupes F. in Nord-Amerika (3 Spezies), Ost-Asien (2 Sp.), Philippinen (1 Sp.), Süd- und Ost-Afrika (2 Sp.), Madagaskar (1 Sp.), Chile (1 Sp.),

Priacma Lec. in Californien (1 Sp.),

Omma Newm. in Neu-Holland (1 Sp.).

Die Sammlung des Berliner Museums enthält nun ein Exemplar einer ziemlich abweichenden Form aus Brasilien, welche augenscheinlich eine neue Gattung darstellt. Aus Amerika sind demnach jetzt drei Gattungen bekannt, aus den übrigen in Betracht kommenden Erdgebieten nur je eine Gattung. Die meisten der isolirt vorkommenden Arten gehören zu *Cupes*, welche Gattung über fünf zoogeographische Regionen verbreitet ist.

Die Gattung *Omma*, deren systematische Stellung früher noch zweifelhaft war, hat erst Leconte als zu den Cupesiden gehörig erkannt (Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1873, p. 334).

Hier folgt die Beschreibung der neuen neotropischen Gattung.

Paracupes n. g.

Dieses Genus ist von *Cupes* verschieden durch die Bildung der Antennen, des Prothorax, des Kopfes und der Elytren. Die Antennen sind dünner und zarter, nur das 1. Glied viel grösser. Der Kopf ist nur mit 2 Höckern versehen (bei *Cupes* 4). Der Prothorax ist unterseits neben den Seitenrändern nicht ausgehöhlt. Die Elytren sind convex, nicht flach, wie bei *Cupes*.

Bei *Priacma* Leconte (Trans. Amer. Ent. Soc. V. 1874, p. 87) stehen die Antennen an der Basis weiter auseinander, sind kürzer und dicker als bei *Cupes*, die Glieder dreieckig und an der Basis schmäler; das 1. Glied ist so lang, aber dicker als das 3. Glied.

Charakteristik des neuen Genus: *Corpus elongatum, elytris subparallelis convexis. Caput supra bituberculatum, tuberculis anterioribus solis praestantibus (posterioribus nullis). Occiput pone oculos utrinque protractum. Antennae setaceae haud incrassatae, dimidio corpore sat breviores; scapus claviformis, elongatus, duplo longior quam crassior. Palpi breves ut in genere familiae typico. Mandibulae porrectae majores. Infra caput postice sinuatum. Prothorax lateraliter*

Kolbe, H. J. 1898. "Eine neue Gattung der Cupesiden." *Entomologische Nachrichten* 24, 179–180.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/42365
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/240225

Holding Institution
Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by
Smithsonian

Copyright & Reuse
Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 22 September 2023 at 22:45 UTC