574.0643
S937

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde
aus dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

Stuttgart 15. September 1961 Nr. 56

Eine neue Podagrion-Art aus Afrika
(Hym., Chalcidoidea)

Von Max Fischer, Wien

(Ergebnisse der Entomologischen Reise Willi Richter, Stuttgart, in Äthiopien 1959/1960 — Nr. 2)

Podagrion galeatae **n. sp.**

Die Bestimmungstabelle von Risbec für die afrikanischen Arten der Gattung *Podagrion* Spin. (Mém. Inst. Franc. Afr. noire 13, 1951, p. 303) führt das ♀ der neuen Art zu *P. tarachodesi* Risb., das ♂ zu *P. diospiri* Risb. Eventuell kommt als Vergleichsart wegen der undeutlich ausgebildeten Parapsidenfurchen noch *P. blepharodesi* Risb. in Frage.

Das ♀ ist von *P. tarachodesi* Risb. u. a. aus folgenden Gründen zu trennen: Hinterschenkel schlanker, zweieinhalbmal (statt zweimal) so lang wie breit und der Bohrer ist zweieinhalbmal so lang wie der Körper (anstatt ein wenig länger als der Körper). Auch die Färbung ist abweichend (z. B. ist die Oberseite des Abdomens nicht ganz grün und die Fühler sind dunkler). Von *P. diospiri* Risb. ist die Länge des Bohrers abweichend (bei der genannten Art nur fast so lang wie der Körper) und die Färbung des Abdomens. *P. blepharodesi* Risb. hat vor allem die Fühler anders gestaltet. Die Keulenglieder sind bei dieser Art nicht breiter als die Fadenglieder.

♀. — Färbung: Kopf, Thorax, Hinterhüften und ein Fleck in der Nähe der Basis des Abdomens metallisch grün; apikale Hälfte des Abdomens schwärzlichgrün. Scapus, Tegulae, alle Beine (mit Ausnahme der angegebenen grünen Zeichnung) gelb. Fühlergeißeln dunkelbraun, Keulen fast schwarz. Bohrerklappen dunkelbraun. Flügel hyalin, mit schwachem, weißem Schimmer, Nervatur gelblich.

Kopf: Etwas breiter als der Thorax vor den Tegulae; 0,59 mm. Doppelt so breit wie lang; Länge 0,3 mm. Etwas weniger hoch als breit; Höhe 0,46 mm. Augen kahl, mit parallelen Rändern. Der größere Durchmesser 0,36 mm, der kleinere 0,26 mm. Wangen lang; 0,14 mm. Scheitel 0,3 mm. Ocellen klein, oval, in einem gleichschenkeligen Dreieck stehend, dessen Basis bedeutend länger ist als eine Seite, der Abstand des äußeren Ocellus vom inneren Augenrand um zwei Drittel kürzer als die Breite des Ocellarfeldes. Hinterhaupt gebuchtet, Schläfen viel kürzer als die Länge der Augen. Die Fühlerschäfte liegen in einer Grube mit parallelen Rändern, die den vorderen Ocellus nicht erreicht. Kopf fein und ziemlich gleichmäßig runzelig; diese Runzelung besteht aus einem äußerst feinen Netz, dessen Lücken glänzend sind (bei sehr starker Vergrößerung zu sehen). Gesicht gleichmäßig, schwach gewölbt, Clypeus sehr klein. Fühler 0,9 mm. Schaft fast gerade; 0,23 mm. Pedicellus tütenförmig, nach außen erweitert, kaum länger als an der Spitze breit. Ringglied recht klein. Die folgenden 7 Fadenglieder gegen die Spitze zu nur wenig breiter werdend, auch ihre Länge nur schwach verschieden. Keule besteht aus zwei Gliedern; Länge 0,3 mm, Breite 0,1 mm. Fadenglieder und Keule kurz, unauffällig behaart.

SMITHSONIAN NOV 9 1962 LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION NOV 5 1962

Fischer, Max. 1961. "Eine neue Podagrion-Art aus Afrika (Hym., Chalcidoidea)." *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* 56, 1–2.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/106177
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/241935

Holding Institution
Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by
Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse
Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Rights: https://biodiversitylibrary.org/permissions

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 22 September 2023 at 22:28 UTC