

DESCRIPTION
DE
CLYTIDES DE L'ANCIENNE COLOMBIE

Par M. AUG. CHEVROLAT.

—————
(Séance du 24 Juillet 1861.)
—————

En 1860, j'ai donné, dans nos Annales, pages 451 à 504, les descriptions et une révision des Clytides propres au Mexique, et j'ai proposé en même temps quelques coupes génériques qui me semblaient nécessaires.

Je continue ce travail, ne m'occupant pour l'instant que de ceux qui proviennent de l'ancienne Colombie, formant aujourd'hui, comme l'on sait, trois états distincts : la *Nouvelle-Grenade*, le *Venezuela* et l'*Équateur*.

Jusqu'à ce jour, aucune espèce de la dernière de ces républiques n'est connue en Europe, à ce que je crois. Dans les ouvrages qui traitent de ces insectes, je ne vois que quatre espèces publiées : 1° le *Callidium rufum* Oliv., *Clytus* (1) *rufus* Lap. et Gory, Monographie; 2° le *Neoclytus Moritzi* (Mann.) Thoms.; 3° le *Cyllene crinicornis* Chevrolat, qui est peut-être une espèce nouvelle ou une variété locale de l'espèce du Mexique, et 4° le *Tillomorpha cleroides* White.

Le mémoire que j'ai l'honneur de présenter à la Société comprend quinze espèces qui toutes, à l'exception de la dernière, font partie de ma collection. J'ai trouvé dans celle de Dejean, qui depuis longtemps est ma propriété, un *Clytus* (*Neoclytus*) *scenicus*, ainsi nommé par lui, et figurant à son Catalogue comme de Colombie. Cet insecte unique, qui lui a été envoyé par M. Leconte père, des États-Unis, n'appartient probablement pas aux pays dont je m'occupe, mais bien à l'Amérique septentrionale, et je n'ai pas cru devoir le comprendre.

En décrivant les *Cyllene erythropus*, *guttatus* et *crinicornis*, pages 458 à 460, j'ai négligé de désigner particulièrement la tache latérale qui est en regard de la hanche postérieure, mais je m'aperçois qu'elle a une assez grande importance, puisque, suivant chaque espèce, elle a une couleur et une forme particulière. Dans l'*erythropus*, cette tache est du même jaune que celles qui existent au-dessous du corps, chez le *guttatus* elle est la

(1) *Neoclytus* Thoms. = *Rhopalomerus* nobis, p. 457, loc. cit., Syn. Nom à supprimer comme ayant déjà été employé.

seule qui soit blanche, enfin elle est également blanche dans le *crinicornis*, dont le prothorax est traversé par quatre bandes jaunes, les deux précédentes espèces n'en offrant que trois.

M. J. Thomson, dans un récent ouvrage : *Essai d'une classification de la famille des Cérambycides*, Paris, 1860, a adopté les genres que j'ai créés. Seulement il a eu la malheureuse pensée d'établir le genre *Clytus* (1) sur un type américain, le *Clytus robinix* Forster (*Cl. flexuosus* Fab.), parce qu'il était le premier en tête et d'y comprendre les nombreuses espèces de l'Amérique équinoxiale que je rattache au genre *Cyllene*. Fabricius, créateur du genre *Clytus*, a levé la difficulté sur ce point, en donnant les caractères anatomiques du *Clytus arcuatus* (*Systema Eleutheratorum*, t. II, p. 347). Dès lors le genre *Plagionotus* Mulsant disparaît et vient en synonymie, le *Clytus robinix* ne rentre pas, comme on l'avait pensé, dans le genre *Arhopalus* Serville et Leconte, mais formera, probablement, une division parmi les *Cyllene*.

1. CYLLENE MENALASPIS Dejean. — *Elongata, nigro-velutina; ore, antennis pedibusque sanguineis; in capite fascia occipitali circa oculorum ambiente, in thorace fasciis tribus, 3^a extus bifida, in elytris fascia infra basin singulisque maculis novem (quatuor suturalibus) : late flavis. Corpore infra nigro, thorace flavo, pectore fasciis tribus (ultima medio interrupta) et lateribus abdominis fasciis quatuor flavis. Notula coxæ posticæ alba.* — Long. 17 à 21 mill.; lat. 6 à 7 mill.

Allongé, élargi sur les épaules et allant en se rétrécissant graduellement jusqu'au sommet. Noir velouté, bandes et taches du jaune le plus vif. Tête noire marquée en arrière d'une bande jaune qui se recourbe sur le côté et entoure chaque œil, carène antérieure arquée, élargie par le haut, sillonnée au milieu. Palpes, chaperon, levre et mandibules de couleur ferrugineuse, extrémité des dernières noirâtre. Antennes rouges, de la longueur du corps chez le ♂ et des 2/3 chez la ♀, ciliées de poils noirs, ayant le sommet des 2-7 articles muni d'un poil aigu. Prothorax orné de trois bandes également distantes, celle du milieu se recourbe en arrière. Élytres offrant au-dessous de la base une bande droite interrompue avant l'épaule, et sur chaque étui se remarquent neuf taches ainsi réparties : trois le long de la suture et à distance égale, quatrième en marge en regard de la première suturale, cinquième, sixième et septième sur une même ligne longi-

(1) M. Thomson a agi de même pour les genres *Lamia* et *Saperda* que Mulsant avait établis avec raison (*Histoire natur. des Coléopt. de France, Longicornes*, 1839, pages 135 et 185) sur de grandes espèces d'Europe, le premier avec les *Lamia textor* F. et le deuxième avec les *Saperda tremulæ*, *punctata* et *scalaris* F., et qui doivent être maintenus comme ayant l'antériorité.

nale, un peu plus en dedans que la précédente, huitième transverse sur le milieu de l'étui et entre les quatre premières, neuvième très petite au milieu, et au-dessous de la deuxième suturale, côte longitudinale très saillante terminée par une épine aiguë. Le dessous du corselet est jaune et n'offre sur chaque côté qu'un trait noirâtre. *Poitrine* avec trois bandes jaunes, dernière formant deux taches. *Abdomen* noir, présentant de chaque côté quatre taches transverses, jaunes, en regard de la hanche postérieure, existe un petit trait blanc en forme de virgule. *Pygidium* signalé en dessus par une tache jaune qui est arrondie en arrière et anguleuse en avant.

Cette espèce a été envoyée par M. Paul Lebas. Elle provient de la Nouvelle-Grenade et se classera près de notre *C. erythropus*.

2. CYLLENE ELONGATA. — *Angusta, nigro-velutina; ore, antennis pedibusque rubris; in capite fascia occipitali circa oculorum protensa et limbo antico, in thorace fasciis tribus, basali extus duplicata; in elytris fascia biarcuata infra basin, singulisque decem maculis (quatuor suturalibus), late flavis, in lateribus pectoris tribus maculis rotundatis et in lateribus abdominis quatuor fasciis: flavis; macula coxæ posticæ, flava extus nigra.* — Long. ♀ 15 mill.; ♂ 19 mill.; lat. 4 à 5 mill.

♂ étroit, allongé, d'un noir velouté à taches et bandes du plus beau jaune; ♀ un peu élargi aux épaules et un peu plus courte. *Tête* ponctuée, offrant une bande occipitale jaune qui suit le bord et contourne chaque œil, le bord antérieur est aussi jaune; carène conique sillonnée au milieu. *Palpes, lèvres, chaperon, mandibules, antennes et pattes* d'un rouge pâle. *Prothorax* marqué de trois bandes jaunes, celle basale présente au côté, au-dessus de l'angle postérieur, un trait oblique. *Écusson* jaune, avec sa base noire. *Élytres* étroites, ayant au-dessous de la base une bande jaune bi-arquée en dessous, dirigée sur l'écusson qu'elle avoisine et se limite de l'autre côté près de l'épaule; sur chacun des étuis dix taches ainsi réparties: quatre sur la suture, cinquième marginale, sixième, septième et huitième un peu plus en dedans, sur une même ligne, neuvième transverse, au milieu des quatre antérieures, dixième petite, presque réunie à la seconde en marge, le dessous de l'épaule est aussi jaune; carène saillante terminée en une pointe aiguë. *Prothorax* jaune en dessous, n'ayant de noir qu'un dessin formé par la réunion des trois traits noirs du dessus qui forment alors un angle prolongé obliquement en avant. *Poitrine* avec trois taches latérales arrondies et jaunes, tache transverse jaune lavée de blanc en dehors en regard de la hanche postérieure. *Abdomen* noir, avec quatre taches latérales transverses, jaunes, qui diminuent de largeur et de grandeur vers l'extrémité; genoux intermédiaires cintrés, vus de face, postérieurs biépineux. *Pygidium* du ♂ terminé en dessus par une tache

apicale, transverse, arrondie en arrière et échancrée en cintre en dessus, mais celle-ci s'avance anguleusement de ce côté chez la ♀.

Cette espèce, originaire de Venezuela, a été trouvée aux environs de Caracas par M. Auguste Sallé, de qui je l'ai reçue. Bien que de forme différente, elle paraît se rapprocher du *Clytus proximus* Lap. et Gory.

3. CYLLENE CRINICORNIS Chev., Ann. 1860, p. 460, n° 3. — *Thorax fasciis quatuor flavis; basale extus duplicata.*

Un seul ♂ des environs de Caracas, reçu de M. le docteur Rojas, ne m'a présenté que les différences suivantes avec les types mexicains :

La tache qui se trouve en arrière de la hanche postérieure, au lieu d'être blanche, est d'un beau jaune comme celles du dessous du corps. La tache du pygidium est étendue en ligne longitudinale. Ces différences ne constituent peut-être qu'une variété locale?

Dans le cas où d'autres exemplaires confirmeraient la constance de ces deux caractères, je nommerai provisoirement cet insecte *C. similiguttatus*.

4. CYLLENE CARACASENSIS. — *Nigra; ore, antennis pedibusque obscure ferrugineis; in capite fascia occipitali tenui flexuosa oculos cingente, in thorace fasciis quinque, et quinque in elytris (2^a et 3^a, antice angulatis, 4^a punctis duobus albis in medio, 5^a rectangule ad imum suturæ prolongata); pallide luteis; lateribus corporis septies luteo signatis, macula coaræ posticæ ulla.* — Long. 14 à 15 mill.; lat. 4 à 4 1/4 mill.

Noir, régulièrement atténué en arrière depuis l'épaule jusqu'au sommet. Tête à peine ponctuée, si ce n'est sur l'occiput, ornée en arrière des yeux d'une bande jaunâtre étroite et flexueuse qui contourne ces derniers; carène médiane entière, sillonnée au centre. *Palpes* pâles. *Chaperon*, *lèvre* et *mandibules* d'un roux ferrugineux, extrémité des dernières brunâtre. *Antennes* atteignant aux 2/3 du corps, ferrugineuses. *Prothorax* marqué de cinq bandes dont trois d'un jaune pâle, médiane cintrée en arrière, troisième droite avec la première et la bordure de l'angle postérieur blanches. *Écusson* noir, terminé en jaune. *Élytres* présentant cinq bandes d'un jaune pâle : première largement cintrée sur le devant et reposant dans son centre sur l'écusson, deuxième anguleuse sur le haut de la suture, en partie blanche, troisième de même forme, jaune, mais plus étroitement anguleuse, quatrième oblique, présentant sur chaque côté de la suture une grosse tache blanche arrondie, cinquième oblique, subitement fléchi sur la suture qu'elle longe jusqu'à l'extrémité; elle occupe tout l'espace interne de la carène qui se termine en pointe aiguë. *Corps* noir en dessous, avec sept taches latérales jaunes : une sur la base du prothorax,

trois sur la poitrine et trois sur l'abdomen, pas de tache vis-à-vis de la dernière hanche postérieure. *Pygidium* avec un petit point jaune. *Pattes* d'un rouge obscur, couvertes d'une poussière cendrée.

Cette espèce avoisine les *Clytus acutus* Germ. et *Cayennensis* Lap. et Gory et se placera près d'elles. Elle a été trouvée aux environs de Caracas par M. A. Sallé, de qui je l'ai reçue.

Je possède une variété de cette espèce que j'ai acquise chez M. Parzudaky, provenant probablement d'une autre localité. Elle ne présente que six taches jaunes en dessous et le dessus du *pygidium* est entièrement jaune.

5. NEOCLYTUS RUFUS Oliv., Ent., t. IV, G^{re} 70, p. 28, pl. 7, fig. 81 (*Callidium*). = *Clytus rufus* Schr., Syn. Ins., 1, 3, p. 467. — Lap. et Gory, Mon. p. 19., pl. 5, fig. 21. — *Rubro-fuscus; elytrorum maculis minutis quinque, 2^a suturali elongata, albis.* — Long. 9 mill.; lat. 3 mill. — Venezuela, Nova-Grenata.

6. NEOCLYTUS LEBASII. — *Fuscus; in capite lineis duabus anticis, fascia postica extus oculos protensa; in thorace margine antico, postico, maculisque quatuor basalibus; scutello; in elytris lineolis duabus in utroque latere calli humerali, fasciis tribus ad suturam valde angulatis: albidis; corpore infra albido virescente, fasciis abdominalibus fuscis et angustis; femoribus fortiter clavatis, posticis longissimis, genibus posticis bispinosis.* — Long. 11 à 14 mill.; lat. 3 à 4 1/2 mill.

Clytus Lebasii Dej., Cat., 3^e éd., p. 356.

Brun; lignes, taches et bandes d'un blanc jaunâtre; dessous du corps d'un blanc verdâtre à bandes étroites, brunes, une cintrée sur la poitrine et quatre sur l'abdomen. *Tête* tronquée, un peu avancée par le bas, marquée en avant de deux lignes séparées par une carène glabre, peu élevée, qui est sillonnée au milieu. Une bande directe, en arrière des yeux, s'étend jusqu'en dessous. *Palpes*, *lèvre* et *chaperon* testacés. *Yeux* d'un brun pâle. *Antennes* n'atteignant que le tiers antérieur des étuis, ferrugineuses sur leur moitié basale, ternes et plus obscures au delà, renflées au sommet. *Prothorax* oblong, offrant trois carènes dorsales couvertes d'aspérités transverses, latérales arquées, médiane élevée, avec l'intervalle déprimé; bords antérieur et postérieur, ainsi que quatre taches basales oblongues, d'un blanc pâle. *Écusson* semi-arrondi, jaunâtre. *Élytres* à peine plus larges que le prothorax vers le milieu, deux fois un tiers aussi longues, un peu atténuées vers l'extrémité, à troncature oblique, bidentée sur chaque côté, deux petites lignes le long du calus huméral et dont l'interne est sillonnée, trois bandes très anguleuses en avant sur la suture, première

et deuxième rapprochées et liées entre elles sur ladite suture, base et sommet grisâtres. La bande qui se voit sur la poitrine s'appuie sur l'épaule, suit obliquement le côté au dessous et la traverse directement en arrière. Les bandes de l'abdomen sont glabres et reposent sur la bordure postérieure des segments. *Pattes* longues, brunes, revêtues d'une villosité grise, cuisses très épaisses, antérieures denticulées en dessous sur l'arête interne médiane, postérieures fort longues, genoux intermédiaires uniépineux en dedans, postérieurs bidentés, tarsi allongés, d'un brun pâle.

Cette espèce devra avoisiner le *N. araneiformis* Oliv. Il a été rapporté pour la première fois de Carthagène (Nouvelle-Grenade), par M. P. Lebas. Depuis, M. A. Sallé l'a retrouvé dans le Venezuela.

Les deux exemplaires de cette dernière provenance présentent les différences ci-après : côtés de la carène dorsale du prothorax profondément sillonnés, élytres offrant au-dessous de la base une bande blanche qui se lie au trait interne avoisinant le calus huméral, l'extrémité de la suture est étroitement blanchâtre, ainsi que le sommet, et la première se réunit à la dernière bande.

7. NEOCLYTUS JUSTINI.—*Affinis Cl. olivaceo* Lap. et Gory, *sed minor. Fusco luridus, capite obscuro; antennis nigro-cinereis; prothorace globoso, sericeo, linea dorsali elevata transverse scabrosa, fascia media lutea postice bifida; scutello nigro et albo-marginato; elytris usque ultra medium umbrinis, tergo nigricantibus cum litura obliqua, macula media communi trigona, valde triacuta, punctulo-marginali; ochraceis, fascia recta cretacea, dein flavo-griseo terminatis et truncatis; in pectore maculis tribus: 1^a transversa albida, 2^a laterali flavo niveoque mixta, 3^a intus, trigona flava; abdomine virescente, albido fasciato; pedibus crebre et ruge punctatis, pilosis, nigris.* — Long. 8 mill.; lat. 3 mill.

D'un fauve clair, mélangé d'obscur et de tons verdâtres ou ochracés. *Tête* carrée, coupée obliquement, d'un noir verdâtre, ruguleuse et couverte d'un poil fin et court. *Palpes* roux. *Lèvre* et *chaperon* testacés sur leur bord antérieur. *Mandibules* noires, aiguës, chargées sur le côté d'une forte ponctuation. *Yeux* bruns. *Antennes* noirâtres, revêtues d'une poussière cendrée et soyeuse; massue renflée, à articles annelés de blanc. *Prothorax* globuleux, coupé droit aux extrémités, offrant, sur le milieu longitudinal, une série d'aspérités transverses, d'un fauve cendré soyeux, une bande ochracée traverse le milieu et sur chaque côté s'en détache un trait direct qui s'appuie à la base. *Écusson* semi-arrondi, noir, bordé de jaune. *Élytres* jusqu'au deux tiers environ d'un fauve verdâtre, avec le tiers dorsal antérieur noir; trois dessins crétacés s'en détachent par étuis : le premier, en ligne oblique, commence avant le milieu, au-dessus de la marge, et se

termine au-dessous de l'écusson; le deuxième commun, situé vers le centre, forme avec sa répétition une tache triangulaire rectiligne en dessous, avec chacun des trois angles aigus; le troisième est punctiforme, transverse, et avoisine la marge vers le milieu; le calus huméral est noir, sur son bord existe une tache oblique cendrée qui occupe toute la base, se dirige sur le côté et s'étend vers la marge; aux trois quarts est une bande droite d'un jaune chamois, le quart apical est mélangé de fauve jaunâtre et de verdâtre, le sommet est coupé droit et l'angle marginal est seul aigu. *Poitrine* avec trois taches de chaque côté: première transverse, blanche en avant; deuxième linéaire en dessous, jaunâtre, teintée de blanc vers l'extrémité; troisième triangulaire, jaune. *Abdomen* verdâtre, bord inférieur des segments jaunâtre. *Pattes* noires, couvertes d'une punctuation serrée, coriacée et poilue; cuisses assez fortes, postérieures plus longues que le corps. Genoux des deux dernières paires biépineux.

Je dédie cette insecte à feu J. Goudot, qui a rapporté de la Nouvelle-Grenade une suite de très belles espèces de ce pays. Celle dont il s'agit provient de son dernier envoi et a été découverte par lui à Honda.

M. Sallé possède un exemplaire de cette espèce provenant de ses chasses dans le Venezuela. Sa taille est bien plus forte: 15 mill. de longueur sur $4 \frac{3}{4}$ de largeur. Ses élytres sont noires depuis la base jusqu'aux deux tiers. Le trait verdâtre oblique qui s'appuie depuis la base sur le calus huméral ressort naturellement davantage. La ligne oblique et la tache triangulaire dorsale sont plus largement accusées.

Il viendra se placer après le *N. olivaceus* (Dej.) Lap. et Gory (*Clytus*).

8. NEOCLYTUS MORITZII Th., Essai, 1860, p. 225. = *Clytus Moritzii* (Manh.), Cat. British Mus., 1855, p. 257, n° 37. — ♂. *Cinereus, in capite lineis duabus anticis; prothorace villosa (supra planiusculo, linea dorsali elevata scabrosa, lateribus valde angulato) antice posticeque; scutello; in elytris fasciis tribus angustis ad suturam antice angulatis; in pectore fasciola antica et postica atque in abdomine fasciis quatuor: albis.*

Var. ♂. *Elytris in dimidio longitudinis, nigris, intus cinereis. Ex mus. Dom A. Deyrollei.*

♀. *Minor. Niger. Elytris tantum basi cinereo mixtis, præterea ut in ♂. N. Rojasii Chevr., Olim.*

M. Sallé m'a communiqué la seule ♀ qu'il ait prise, je la possédais également comme trouvée à Caracas et je l'aurais, sans lui, décrite comme étant distincte.

♀. Ce sexe est d'une taille moins élevée, ressemble entièrement au ♂,

si ce n'est qu'il est presque entièrement noir; la base des élytres est nuancée de cendrée.

Cette espèce est remarquable par son prothorax à villosité longue et pâle, et dont le milieu latéral est fortement anguleux.

9. NEOCLYTUS CRISTATUS. — *Nigro-fuscus; ore pedibusque rufis, femoribus obscuris posticis longe clavatis; capite lineis duabus anticis fasciaque post oculos recta: flavis; prothorace globoso, parvo, crista longitudinali integra, fasciis tribus flavis, media arcuata; scutello flavo; elytris fasciis quatuor flavis: 1^a humerum includente, 2^a et 3^a antice angulatis, ad apicem flavidis et truncatis; corpore infra flavido, abdomine fusco fasciato.* — Long. 10 1/2 mill.; larg. 4 mill.

D'un noir de suie. *Tête* tronquée, carrée, étroitement sillonnée et offrant en avant deux lignes, et sur le bord postérieur des yeux une bande étroite, qui toutes trois sont jaunes. *Palpes, mandibules*, moins l'extrémité, *levre* et *chaperon* ferrugineux. *Antennes* courtes, épaisses, brunes, premier et troisième articles assez longs, les cinq à six derniers sont roux. *Yeux* d'un brun roux. *Prothorax* petit, arrondi, offrant sur sa région dorsale une carène très élevée et entière, il est déprimé de chaque côté de celle-ci, orné de trois bandes jaunes, médiane un peu cintrée en arrière, basale présentant près de l'angle postérieur une tache arrondie de même couleur. *Écusson* triangulaire, jaune. *Élytres* plus larges que le prothorax, deux fois et demi aussi longues, parallèles, tronquées obliquement de la marge sur la suture, avec l'angle externe aigu, ornées de quatre bandes jaunes: première entourant complètement le calus huméral, deuxième avant et troisième après le milieu, toutes deux anguleuses vers le haut de la suture, quatrième transverse, le sommet offre une sorte de bande d'un cendré jaunâtre. *Poitrine* noirâtre pour le fond, recouverte d'une pubescence verdâtre, traversée par une bande jaune cintrée en avant. *Abdomen* verdâtre, présentant quatre petites bandes brunes et glabres. *Pattes* ferrugineuses, ruguleuses et poilues, cuisses intermédiaires et postérieures brunes, dernières fort longues, genoux intermédiaires uni- et postérieurs bi-épineux.

Cette espèce, originaire de la Nouvelle-Grenade, m'a été offerte par M. E. Mocquerys fils. Elle a la physionomie ainsi que la couleur sombre d'un *Xylotrechus* qui serait allongé.

10. NEOCLYTUS BASALIS. — *Nigro-brunneus; palpis, antennis (clavatis) basi pedibusque rufis; limbo antico et postico prothoracis flavis; elytris basi rufis cum fasciis quatuor anguste flavis, ultima aliquoties obsoleta;*

pectore flavo, fasciam arcuatam rufam signato, abdomine nigro, fasciis quatuor flavis. — Long. 9 à 12 1/2 mill. ; lat. 2 à 3 1/2 mill.

Très variable de grandeur. D'un brun noirâtre. *Tête* tronquée, carrée, marquée de deux lignes et d'une bande jaune; carène sillonnée, limitée au front. *Palpes*, *mandibules* à la base, *lèvre* et *chaperon* ferrugineux. *Antennes* courtes, épaisses à l'extrémité, poilues, ferrugineuses, mais rembrunies sur leur moitié postérieure. *Prothorax* arrondi, bordé de jaune en avant et en arrière jusqu'en dessous, élevé longitudinalement sur la région dorsale, déprimé près de là et portant trois séries d'aspérités latérales arquées. *Écusson* large, semi-arrondi, jaune. *Élytres* un peu plus larges que le prothorax, allant en s'atténuant jusqu'au sommet de la marge, tronquées à l'extrémité, avec les angles faiblement avancés, base entièrement rousse, quatre bandes étroites, jaunes, première et deuxième anguleuses en avant, troisième droite, quatrième apicale, quelquefois peu visible. *Poitrine* jaune, marquée d'une bande rousse, cintrée en arrière. *Abdomen* noir présentant quatre bandes jaunes, les deux premières larges, les deux autres étroites. *Pattes* ferrugineuses, à villosité blonde; cuisses, particulièrement les postérieures qui sont longues, épaisses et brunâtres, dépassant de beaucoup les étuis; les quatre genoux postérieurs bi-épineux.

Cette espèce a été trouvée aux environs de Caracas par M. A. Sallé, de qui je l'ai reçue.

Espèces 11 à 13 à cuisses postérieures plus courtes, dépassant à peine les étuis, à livrée noire et à bandes jaunes et semblables aux Clytus arietis, gazella et autres espèces Européennes.

11. NEOCLYTUS REGULARIS. — *Niger velutinus; capite flavo, carina media nigra; prothorace fasciis tribus flavis, intermedia medio obsoleta, linea dorsali rugata; scutello flavo; elytris fasciis quatuor flavis, 1^a basi obsolete sericea, 2^a antice angulata, 3^a, 4^a-que rectis; in pectore fascia quatuorque fasciis latis et flavis in abdomine.* — Long. 13 à 15 mill. ; 4 à 4 1/2 mill.

D'un noir velouté. *Tête* large, tronquée, jaune. Côte longitudinale noire et glabre sillonnée sur le front. *Bouche* noirâtre. *Mandibules* rousses, avec le sommet noir. *Antennes* courtes, épaisses, noirâtres, d'un brun terne sur l'extrémité, premier et surtout le troisième articles grands. *Prothorax* court, globuleux, bordé de jaune en avant et en arrière, une bande obsolette, jaunâtre, est située un peu au delà du milieu et disparaît sur le disque, le milieu longitudinal est élevé et chargé d'aspérités transverses.

Écusson semi-rond, jaune, à base noire. *Élytres* ornées de quatre bandes étroites, jaunes : première basale soyeuse, obsolète, d'un jaune verdâtre, deuxième oblique arquée, anguleuse au-dessous de l'écusson, troisième et quatrième droites, un peu élargies sur la suture, troncature apicale droite. *Poitrine* offrant en avant, sur le côté, un trait blanc et sur le milieu une bande jaune anguleuse, appuyée sur la naissance des pattes médianes et étendue jusque sur le côté où elle remonte directement. *Abdomen* avec quatre larges bandes jaunes. *Pattes* de moyenne longueur, cuisses épaisses, un peu aplaties, genoux intermédiaires et postérieurs bi-épineux, plante des tarsi de couleur de terre.

Deux exemplaires, originaires des environs de Caracas, m'ont été donnés par M. A Sallé.

12. NEOCLYTUS QUADRIFASCIATUS. — *Niger* *antennis pedibusque rufis, in capite, lineis duabus anticis, lineaque post oculos, flavis; prothorace globoso, margine antico et postico anguste flavis; scutello semi-flavo; elytris fasciis quatuor anguste flavis, duabus intermediis antice angulatis; in pectore macula et fascia et in abdomine fasciis quatuor flavis.* — Long. 10 mill.; lat. 3 mill.

Clytus 4-fasciatus Chevr., Cat. British Museum, p. 264, n° 64.

Noir, antennes et pattes ferrugineuses, avec les cuisses quelquefois rembrunies. *Tête* tronquée, carrée, noire, finement chagrinée, sillonnée au milieu, offrant sur le devant deux lignes et une en arrière des yeux, qui toutes trois sont jaunes. *Mandibules* rousses sur l'un des deux exemplaires que je possède. *Antennes* courtes, très renflées au sommet. *Prothorax* arrondi, le milieu longitudinal est légèrement élevé et offre quelques petits tubercules peu distincts, sa surface est densément ponctuée, granuleuse et un poil fin, mou, jaunâtre et abaissé, s'aperçoit surtout vers les côtés, les bords antérieur et postérieur sont étroitement marginés de jaune, mais en dessus seulement. *Écusson* jaune sur l'extrémité. *Élytres* ornées de quatre bandes jaunes, étroites, première basale limitée avant l'épaule, deuxième et troisième anguleuses vers le haut de la suture, quatrième droite, sommet roux, tronqué obliquement sur le dedans, avec l'angle marginal aigu. *Poitrine* marquée en avant, sur le côté, d'un trait transverse, et en arrière d'une bande jaune. *Abdomen* avec quatre bandes de même couleur. *Pattes* moyennes, cuisses postérieures égales, subitement renflées sur leur moitié.

Cette espèce, que j'ai acquise de M. Hoffmann, est propre à la Nouvelle-Grenade (♂ et ♀).

13. NEOCLYTUS CLAVATUS. — *Niger, opacus; palpis, antennis clavatis*

pedibusque rufis; capite coriaceo, truncato, vix sulcato, lineis duabus anticis flavis; prothorace rotundato, coriaceo, pruinoso, linea longitudine fuliginosa et scabra, margine antico et postico anguste flavis, scutello nigro; elytris fasciis tribus flavis: 1^a et 3^a rectis, 2^a in sutura antice angulata usque ad basin et secundum scutellum ducta, ad apicem anguste fuscis; in pectore fasciis tribus et in abdomine quatuor flavis, duabus ultimis tenuibus et rufescentibus. — Long. 7 mill.; lat. 2 1/2 mill.

D'un noir terne de suie, coriacé, recouvert sur la tête et sur le prothorax d'un poil court, cendré et prumineux. Tête tronquée, carrée en avant, marquée de deux lignes sur le côté interne des yeux et d'une troisième en arrière de ces derniers, qui tous sont jaunes; sillon étroit non entier. *Palpes, lèvres, chaperon, antennes et pattes* ferrugineux. *Prothorax* régulièrement arrondi, offrant sur le milieu longitudinal une carène entière, assez large, d'un brun roussâtre, qui est couverte d'aspérités, les bords antérieur et postérieur sont jaunes jusqu'en dessous sur la hanche antérieure. *Écusson* large, arrondi, brunâtre. *Élytres* offrant trois bandes jaunes placées à distance égale : première et troisième droites, deuxième anguleuse sur le haut de la suture et prolongée le long de l'écusson jusqu'à la base, le dessous de l'épaule et le sommet qui est obliquement tronqué et épineux en marge sont d'un roux clair. *Poitrine* avec trois taches transverses et *abdomen* orné de quatre bandes jaunes, les deux dernières faiblement indiquées. *Pattes* moyennes, cuisses assez fortement renflées, genoux intermédiaires et postérieurs bidentés.

Reçue de M. A. Sallé et comme ayant été découverte par lui aux environs de Caracas.

Cette espèce ressemble beaucoup aux *N. 4-fasciatus* et au *basalis*, mais elle se distingue des deux par l'entourage jaunâtre de l'écusson, sans avoir la base des élytres jaune du premier et rousse du deuxième, de plus la deuxième bande des élytres est seule anguleuse.

14. MECOMETOPUS (1) AMARYLLIS. — *Caput, prothorax atque pedes antici rufi; scutello corporeque infra sulphureis; elytris (maculis quatuor læte flavis) pedibusque quatuor posticis nigris.* — Long. 11 1/2 mill.; lat. 4 mill.

Tête rouge, ponctuée, un peu en museau, avancé par le bas, côte longitudinale peu saillante, lisse. *Palpes* et *chaperon* testacés. *Mandibules* noires seulement sur l'extrémité. *Antennes* courtes, ferrugineuses, grêles,

(1) Thomson, Essai, 1860, p. 216.


avec la massue peu épaisse. *Prothorax* globuleux, tronqué aux extrémités, rouge, revêtu d'une courte pubescence grise, chargé d'une ponctuation serrée et coriacée. *Écusson* large, semi-arrondi, d'un jaune soufre. *Élytres* un peu plus larges que le corselet, deux fois et demie aussi longues, parallèles, tronquées au sommet avec l'angle marginal aigu, d'un noir velouté, marquées chacune de quatre taches du plus beau jaune : première basale grande, oblongue et oblique ; deuxième punctiforme sur le bord de la marge, un peu en avant du milieu ; troisième triangulaire sur la suture, et formant avec sa semblable une sorte de cœur renversé ; quatrième large, transverse, située au delà du milieu. *Poitrine* jaune, portant sur le milieu de la base une large tache triangulaire noirâtre. *Abdomen* jaune, bord des segments étroitement noirâtres. *Pattes* avec la première paire rouge, les quatre suivantes sont noires. Cuisses intermédiaires et postérieures assez longues, modérément et régulièrement renflées, genoux intermédiaires uni- et postérieurs bi-épineux.

Je possède une variété dont l'abdomen, noir, n'a que deux bandes jaunes.

Cette très jolie espèce, qui devra se placer près du *Clytus lætus* Fab., se trouve aussi à Honda (Nouvelle-Grenade). C'est par M. J. Goudot qu'elle nous est venue.

15. *TILLOMORPHA CLEROIDES.* — *Nigra, pilis cinereis vagis; elytris antice pilis cinereis tectis, fasciâ nigerrimâ obliquâ, elytris apice nigerimis lucidis; metathoracis lateribus argenteo-maculatis.* — Long. 8 mill. — Venezuela.

Tillomorpha cleroides White, Cat. Br. Mus., p. 290, n° 4.





Chevrolat, Auguste. 1861. "Description de clytides de l'ancienne Colombie."
Annales de la Société entomologique de France 1, 377–388.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34164>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/26873>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.