

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES EXOTIQUES,

PAR M. M. PIC.

Les espèces ci-dessous décrites appartiennent aux collections du Muséum national de Paris et, à l'exception de *Callirhipis Raui*, ont été recueillies au Mozambique par mon ami J. Surcouf.

**Callirhipis Raui** nov. sp.

*Elongatus, rufo-testaceus, griseo sat sparse pubescens* ♂, aut fere glaber et nitidus ♀.

Allongé, brillant, roux testacé, presque glabre chez ♀, ou revêtu chez ♂ d'une pubescence grise courte, assez régulière, sans mouchetures distinctes, peu brillant en dessus chez ♂, très brillant chez ♀. Tête rugueuse, front relevé entre les antennes qui sont très longuement flabellées ♂, ou longuement pectinées ♀; prothorax court et large, un peu rétréci en avant avec les angles antérieurs saillants, impressionné de chaque côté de la base et marqué de fossettes, obliques 2 à 2, devant l'écusson, à ponctuation dense chez ♂, plus ou moins fine et espacée chez ♀; écusson grand, densément ♂, ou peu ♀, ponctué; élytres longs, à peine plus larges que le prothorax, atténués postérieurement, à rebord marqué, à ponctuation plus forte et plus rapprochée chez ♂, à côtes discales à peine indiquées; pattes moyennes, cuisses peu épaisses.

Longueur : 14-18 millimètres. — Haut-Tonkin (C. Rau, in coll. Ph. François = coll. Bedel).

Espèce distincte, à première vue, par sa coloration générale d'un roux clair. Voisin de *C. Salvazai* Pic avec, chez ♀, la ponctuation bien plus écartée sur le prothorax et celui-ci différemment impressionné.

**Attagenus basalis** nov. sp.

*Oblongus, parum nitidus, niger, membris abdomineque apice rufis, capite, thorace elytrisque ad basim dense aurato pubescentibus.*

Oblong, peu brillant, noir, avec le prothorax ayant une transparence brunâtre, les membres et l'abdomen en partie roux, avant-corps et base des élytres revêtus d'une pubescence dense à reflets dorés. Prothorax court et large, rétréci en avant, sinué postérieurement, à lobe médian assez saillant et subarrondi, à ponctuation fine et dense; élytres de la largeur du

prothorax, peu longs, atténués postérieurement, plus densément ponctués à la base, densément pubescents sur le tiers basal, éparsément et peu distinctement sur le reste.

Longueur : 3,5 millimètres. — Caia, 20, XII, 1925. Un seul exemplaire.

Peut se placer près de *A. rufiventris* Pic, dont il se distingue, à première vue, par la pubescence régulière et dense de l'avant-corps et de la base des élytres.

**Mesocœlopus Surcoufi** nov. sp.

*Oblongus, convexus, nitidus, rufus, sat regulariter et parum dense griseo-pubescentis, membris testaceis.*

Oblong, convexe, brillant, roux, orné d'une pubescence grise assez régulière et peu dense. Antennes testacées, longues, un peu dentées avec le dernier article très long; prothorax assez court et large, à ponctuation plus ou moins fine et rapprochée, régulièrement et peu densément pubescent; écusson grand, presque en demi-cercle; élytres assez courts, atténués postérieurement, bombés sur le milieu et comprimés sur les côtés, à ponctuation fine et peu dense; pattes testacées.

Longueur 2-2,5 millimètres. — Cauxix et Barue, nombreux exemplaires in M. Paris et coll. Pic.

Voisin de *M. rufescens* Pic, en diffère par l'écusson plus grand et la pubescence plus régulière du prothorax.

**Gonocnemis Surcoufi** nov. sp.

*Oblongus, fere opacus, griseo pubescens, rufus, antennis medio et apice piceis, articulo ultimo piriforme, apice pallidiore.*

Oblong, presque opaque, pubescent de gris, roux avec des antennes de poix, à base rousse et dernier article plus clair au sommet, yeux rapprochés; antennes assez longues, peu épaisses, à articles en partie obconiques, dernier pyriforme, acuminé et plus clair à l'apex; prothorax assez court et peu large, un peu rétréci en avant et en arrière, subangulé vers le milieu, ruguleusement ponctué, orné postérieurement de 3 carènes assez largement 4 impressionnées; élytres plus larges que le prothorax, un peu allongés, atténués à l'extrémité, largement sillonnés et marqués de points subcarrés médiocres, intervalles élevés en côtes peu saillantes, la présuturale surtout; pattes robustes.

Longueur : 8 millimètres. — Cauxix, un seul exemplaire.

Paraît voisin de *G. reflexicollis* Fairm., en diffère par le prothorax tricariné postérieurement, le dernier article des antennes non tronqué, ces organes en partie foncés, la coloration plus claire.



Pic, Maurice. 1928. "Nouveaux Coléoptères exotiques." *Bulletin du Musée*

*national d'histoire naturelle* 34(4), 257–258.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/213840>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/280079>

**Holding Institution**

Muséum national d'Histoire naturelle

**Sponsored by**

Muséum national d'Histoire naturelle

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.