

Een nieuwe *Attacus*-vorm van Bali

door

J. H. JURRIAANSE en J. LINDEMANS.

Rotterdam.

Toen wij in het „Tijdschrift voor Entomologie”, Deel LXIII, blz. 176, een nieuwen *Attacus*-vorm van Burma beschreven, hadden wij niet gedacht reeds zoo spoedig wederom een nieuwen vorm te kunnen publiceeren.

Het feit, dat de Balivorm afwijkt van die van Java en Flores, sterkt ons in de overtuiging, dat op de verschillende eilanden en eilandengroepen overal verschillende rassen voorkomen, die onderling zoodanig van elkander verschillen, dat men ze gerust in ondersoorten kan splitsen en als zoodanig beschrijven.

Volstrekt niet onmogelijk is het, dat het genus *Attacus* bezig is te veranderen, en zullen naar wij hopen de entomologen, die na ons komen, dank zij onze zwakke pogingen, misschien beter in staat zijn dan wij op dit oogenblik zich een oordeel te vormen omtrent de wijze, waarop deze veranderingen in den loop der tijden zijn voortgeschreden. Of deze veranderingen met sprongen gaan, of dat wij hier met langzaam varieeren te maken hebben, dit kunnen wij nog niet beoordeelen. Alles wat wij kunnen doen is het constateeren van nu bestaande vormen.

De *Attacus* van Bali, waarvan 6 ♂♂ en 7 ♀♀ in de collectie JURRIAANSE aanwezig zijn, vertoont bij vergelijking met voorwerpen van Java de volgende verschillen:

♂. De basale lijn in de voorvleugels is bijna geheel zonder wit, en wordt deze slechts aangeduid door een vrij flauwe zwartachtige teekening, die basaalwaarts minder sterk

gebogen is. Bij sommige aanwezige exemplaren is het wit geheel verdwenen.

Ook de discale witte lijn is zeer gereduceerd, doch vertoont bijna altijd aan de costa nog een witte vlek. Bij sommige stukken echter is ook elk spoor van wit verdwenen.

De zwarte gegolfde sub-marginale lijn is zeer scherp geteekend, en verloopt apicaalwaarts veel verder dan bij de Java-exemplaren. De basale gele bestuiving naast deze lijn is veel helderder.

De achtervleugels vertoonen dezelfde eigenschappen als de voorvleugels. Bij sommige exemplaren is de witte lijn, die rond het discale veld loopt, zoo goed als verdwenen en blijft alleen de zwarte omlijsting over.

De onderzijde vertoont geen constante verschillen met de Java-exemplaren.

♀. De vrouwelijke stukken vertoonen veel overeenkomst met de Java-vormen, de witte lijnen op voor- en achtervleugels zijn smaller en minder geprononceerd. Dit komt voornamelijk uit op het basale gedeelte, alwaar bij sommige stukken het wit dezer lijnen zoo goed als geheel verdwenen is.

Wij hebben dezen vorm genoemd:

„*Attacus atlas baliensis*”. Subsp. nov.

De kosten voor het maken van een plaat in het Tijdschrift zijn zóó hoog, dat wij besloten hebben, alleen op verzoek van hen die daarin belang stellen, een foto van *Attacus atlas baliensis* te verstrekken en kan men dan deze afbeelding in het exemplaar van het Tijdschrift bevestigen.



Jurriaanse, Jan Hendrik and Lindemans, J. 1921. "Een nieuwe Attacus-vorm van Bali." *Tijdschrift voor entomologie* 64, 12-13.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/40987>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/30228>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.