

# TROCHILUS COLUBRIS.

\*\*\*\*\*

## CHARACTER GENERICUS.

*Rostrum* subulato-filiforme, apice tubulato, capite longius : *Mandibula* superior vaginans inferiorem.

*Lingua* filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

*Pedes* ambulatorii.

*Lin. Syst. Nat.* p. 189.

## CHARACTER SPECIFICUS, &c.

TROCHILUS rectirostris viridi-aureus, rectricibus nigris, lateralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammea.

*Lin. Syst. Nat.* p. 191.

MELLIVORA gula rubra.

*Edw. Av. t. 36.*

MELLIVORA Avis Carolinenfis.

*Cateß. Carol. 1. p. 65.*

---

Coloribus nitidis adeo gemmeisque exornatur minutum Trochili genus, ut si cum his comparantur, non modo fordeant prorsus et obscurentur avium plurium regiones calidores incolentium venustissimi colores, sed et aurum ipsum pyropusque longe superentur. Nequeunt igitur ulla arte splendidissimi hi colores ad

G g

vivum

vivum exprimi, quæ tum sane magnum præsttit, si insigne harum avium decus imitando adumbraverit. Regulus cristatus Europæus avicula omnium minima diu habebatur, et stupebant prorsus nostrates physici, cum aves Americanas vel ipsis insectis Europeis minores conspicerent; inter quas est Trochilus vix scarabæo vulgari major. Cum tamen minuta hæc species cæteris cedat colorum splendoribus, satius duxi aliam eamque elegantiorem exprimere.

Formosissima hæc avicula plurimas Americæ partes, Carolinam præcipue tam Septentrionalem quam Australem inhabitat. Rostrum illi nigrum est. Corporis superiora splendent aureo-viridi, et mutabili colore. Gulam decorant plumæ coccineæ nitidissimæ, quæ pro lucis ratione in aureum fulgentissimum transeunt. Pectus et abdomen albicant. Alarum remigeo fusco-purpurei. Feminæ superficies inferior albicat, carens omnino rubore illo eximio quo mas insignitur. Miranda est huic aviculæ pennarum velocitas. Inter volandum cibum capit phalænæ more, linguam nempe tubulatam in fundum florum immersens et mel inde exugens. Pugnacissimo est ingenio, nec raro de eodem flore acerrime dimicatur. In domus frequenter involat Trochilus, cumque, more infectorum Europæorum, tres quatuorve gyros egerit, dicto citius e fenestrâ effugit. Ubi densissima est arborum coma nidificat, plerumque inter furcas ramulorum. Diametros interna nido est unciæ, profunditasque unciæ dimidiatae: tomento, seu lanugine plantarum intus struitur, extrinsecus musco et lichene stipatur. Ova tantum duo deponit hæc avis, alba, magnitudine piforum. Dum

incubat



Shaw, George. 1791. "Red-throated Hummingbird, *Trochilus colubris* [Pl. 66]." *The Naturalist's Miscellany* 2(XXII),

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/276232>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/310717>

**Holding Institution**

Museums Victoria

**Sponsored by**

Atlas of Living Australia

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.