

18. *P. LONGIFLORUM* Retz., *Obs.*, IV, p. 15.

Japon : plaine de Sambongi, n° 39; Niigata, n° 1756 [*Faurie*]. — Chine : prov. de Chan-toung, Tché-fou [*Fauvel*]; Pé-tchi-li [*Chanet*]. — Corée : n°s 880 et 1231; Séoul, n° 1290 [*Faurie*]. — Formose. — Hong-kong : n° 947 [*Bon*]; n° 1365 [*Bodinier*]. — Tonkin : Lang-bac, n° 5850; Dé-vong, n° 995; Ninh-thai, n° 4577; Cua-bang, n° 5586; Dao-cu, n° 3670 [*Bon*]; Bat-bac, n° 1664; Tankeuin près Quang-yen, n°s 461, 1659, 1663; Hanoi, n°s 1660, 1661, 1662; laisses du Fleuve Rouge, n°s 4974, 4976; baie d'Along, à l'entrée de la baie de Hongaï, n° 463; montagne des Pins Parasols, près Bac-ninh, n° 4798 [*Balansa*]; Nam-dinh, n°s 482, 483 [*Mouret*]; Quang-yen, n° 344 [*d'Alleizette*]; Lao-kay, Cha-pa, n° 594 [*Lecomte et Finet*]. — Annam : Lang-bian [*André*]. — Cochinchine : [*Pierre*], [*Thorel*]; Saïgon, n° 51 [*Germain*]. — Inde.

19. *P. PERROTTETII* Hook., *Fl. Brit. Ind.*, VII, p. 20.
Inde.

Nous avons trouvé dans l'Herbier du Muséum le *P. parviflorum* Rhode = *P. vestitum* Steud. avec l'indication « Calcutta » et provenant de Lenormand ex Herb. Wallich. Cette plante américaine croît-elle spontanément aux environs de Calcutta ou plutôt n'a-t-elle pas été recueillie dans le jardin botanique de cette ville? Il est à remarquer que la Flore de l'Inde de Hooker ne signale pas cette espèce.

49. E. G. CAMUS. — Sur la dispersion des espèces du genre *Eragrostis* dans l'Asie orientale.

1. *ERAGROSTIS PHLEOIDES* Stapf. — Tonkin : Tuyen-quan, Bac-ninh, n° 325 [*Brousmiche*]; Sept Pagodes, n° 559 [*Mouret*].

2. *E. GENICULATA* Nees. — Tonkin : Thanh-hoa, n°s 5384, 5557 [*Bon*]. — Formose : Tamsui, n° 741 [*Faurie*].

3. *E. TENELLA* R. et S. var. *PLUMOSA* Stapf. — Cochinchine :

[*Pierre*], n° 35 [*Germain*]; Poulo-condor [*de Lanessan*]; Bassac [*Thorel*]. — Indo-Chine : [*Talmy*], [*Thorel*]; Bac-ninh, n° 37 [*Jard. bot. Hanoï*]; n° 385 [*d'Alleizette*]. — Tonkin : Phu-nhac, n° 2237; Kien-khé, n° 2341 [*Bon*]; Tankeuin, n° 338; Ouonbi, n° 340; Hanoï, n°^{os} 1701, 1703; Pas-des-Corbeaux, n° 1704; Tu-phap, n° 1702 [*Balansa*]; Tuyen-quan [*Brous-miche*]. — Cambodge : Pnom-penh, n° 39 [*Harmand*]. — Célèbes : Minahassa, n° 118 [*de La Savinière*].

var. RIPARIA Stapf. — Cochinchine : [*Pierre*]; Nam-dinh [*Mouret*].

var. VISCOSA Stapf, var. CONTRACTA Stapf. — Cochinchine : [*Pierre*]. — Tonkin, n° 5707 [*Bon*]. — Annam : Nha-trang, n° 1116 [*Robinson*].

4. E. INTERRUPTA Pal. Beauv. var. KÆNIGII Stapf. — Cochinchine [*Pierre*]. — Tonkin : Hanoï, n°^{os} 1700, 4746 [*Balansa*]; Bat-ba, n° 136; Ouonbi, n° 339 [*Balansa*]; n°^{os} 136, 5779, Yen-moï [*Bon*]; Lang-son, n° 236 [*Lecomte et Finet*].

var. DIARRHENA Stapf. — Cochinchine [*Pierre*].

var. TENUISSIMA Stapf. — Cochinchine : [*Pierre*]. — Tonkin : Pho-cam, n° 340 bis [*Balansa*]. — Corée : Quelpaert, n° 1259. — Formose, Okasei, n° 739 [*Faurie*].

5. E. AMABILIS Wight et Arn. — Cochinchine : Saïgon [*Pierre*], [*Germain*], n° 42 [*Lefèvre*]. — Tonkin : Chua-hac, n° 3046; Yen-moï, n° 134 [*Bon*]; Hanoï [*Demange*], n° 1134 [*Godefroy*]; Ouonbi, n°^{os} 333, 334 [*Balansa*]; Phu-lo [*Lojardo*]; Thuong-phu, n° 5429 [*Bon*]; Yen-thé, n° 217 [*Bois*]; Sept-Pagodes, Nam-dinh [*Mouret*]; de Traï-hutt à Yen-Baï, n° 636 [*Lecomte et Finet*]; Quen-yen [*d'Alleizette*]. — Chine : Bas-Yunnan [*Delavay*]; Long-tchéou [*Simond*]. — Cambodge : Stung-treng [*Thorel*]. — Laos : [*Massie*]. — Siam : Koh-chang, Munsé [*Schmidt*]. — Inde : Mahé [*Deschamps*]. — Bornéo : [*Chaper*].

6. *E. ELEGANTULA* Steud. — Cochinchine : [Germain]. — Laos [Massie].

7. *E. ELONGATA* Jacquin. — Cochinchine : Saïgon, n° 22 [Germain], [Talmy]. — Annam : Lang-bian, n° 37 [André]. — Cambodge : île de Khôn [Thorel]; n° 19 [Collard]. — Laos : Oudon [Thorel]; Attapeu, n° 1272 [Harmand]. — Tonkin : Thu-phap, n°s 337 et 343 [Balansa]; Nam-dinh, n° 533 [Mouret], n° 5476 [Bon].

var. *PATULA* = *E. bahiensis* Hance : Ninh-binh, Kien-khé, n° 2296 [Bon].

8. *E. ZEYLANICA* Nees et Mey. — Cochinchine : [Germain]; Saïgon, n° 4853 [Balansa]; Ti-tinh [Talmy]. — Annam : Tourane [Pierre], [Thorel], n° 4844 [Balansa]; Nha-trang, n°s 1052, 1230 [Robinson]; Lang-bian, n° 40 [André]; — Laos : [Massie]; Bassac [Thorel]. — Tonkin : Phu-lo [Lojardo]; Cua-bang, n°s 951, 5661 et Khé-non, n°s 951, 2644, 3069 [Bon]; Sept Pagodes, n° 561 et Nam-dinh, n° 530 [Mouret]; Tuyen-quan [Brousmiche]; Haïphong, n° 342 et Hanoï, n° 4963 [Balansa].

9. *E. BARBATULA* Stapf. — Chine : Long-tchéou : [Simond]. — Tonkin : Ouonbi, n° 345, sub nom. *E. Brownei* [Balansa]; Tu-phap, n° 1705; Sontay, n° 1707 [Balansa].

10. *E. TREMULA* Hochst. — Cochinchine : [Pierre].

11. *E. PILOSA* Pal. Beauv. — Saïgon, n° 4853 [Balansa].

12. *E. VERTICILLATA* Cavan. — Cochinchine [Pierre]; Hanoï, n°s 1709 et 1710; Yen-moï, n° 133 [Balansa]. — Chine : Su-tchuen, n° 290 bis [Legendre]; Yun-nan-sen, n° 4187 [Duc-loux]. — Japon : plage d'Otaru, n° 2896; plaine de Numasaki, n° 1192; plaine de Sapporo, n° 1320; Niigata, n° 1750 [Faurie]. — Corée : Chinampo, n° 1261 [Faurie].

13. *E. MAJOR* Host. — Tonkin : Quang-yen, n° 73 [d'Alle-

zette]; Hong-yen, Bac-ninh [*Jard. Hanoï*]; Phu-to à Phu-doan, n° 694 [*Lecomte et Finet*]. — Corée : Chinampo, n° 1256. — Japon : Shinano, n° 1746 [*Faurie*].

14. E. CYNOSUROIDES R. et Sch. — Cochinchine : [*Pierre*]. — Laos : Attopeu, Kratié [*Harmand*]. — Cambodge : Pnom-penh [*Jullien*]; n° 96 [*Godefroy*].

15. E. TENELLA var. BREVICULMIS Stapf. — Chine : Kouy-tchéou : [*Cavalerie*]. Yun-nan, Yen-luong, [*Delavay*].

16. E. JAPONICA Trin. — Corée : île de Quelpaert, n° 1259; Formose, Okeseki, n° 739 [*Faurie*].

17. E. PARVIGLUMIS Hochst. — Kouy-tchéou : n° 444 [*Cavalerie*]. — Yun-nan : Yun-nan-sen, n° 4186 [*Cavalerie*]; Lang-kong, n° 1809; pied du Tsong-chan, au-dessus de Ta-li, n° 3515, Té-tzé-tyen n° 6674 [*Delavay*].

18. E. FERRUGINEA Pal. Beauv. — Corée : île Quelpaert, n° 1257; Chinampo, n° 1258 [*Faurie*]. — Japon : Aoma, n° 1017; Nambu, n° 6133; Mayasan, n° 4902; Sendaï, n° 1747 [*Faurie*].

50. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes (VIII).

37. Les espèces calédoniennes du genre MIMUSOPS.

Parlant des plantes à gutta-percha et à produits similaires, Pierre [*Bull. Soc. Linn. Paris*, I, p. 505 (1885)] a signalé un *Mimusops Viellardii* (il faut lire en réalité *Vieillardii*), mais sans indiquer l'auteur et sans donner aucune description, ni indication d'échantillon-type. Dans l'Herbier, la plante qui porte cette détermination écrite de la main de Pierre est un échantillon collecté par Pancher et numéroté 904 dans l'Herbier de Vieillard. Ce *nomen nudum* n'a pas été relevé dans l'*Index Kewensis* et Baillon a décrit la même espèce sous le nom de *M. Pancheri* [*Bull. Soc. Linn. Paris*, II, p. 907 (1891)] en indiquant comme échantillons-types les n°s 1821



Camus, E.-G. 1912. "Sur la dispersion des espèces du genre *Eragrostis* dans l'Asie orientale." *Notulae systematicae* 2(8), 226–229.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7369>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/324332>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.