

A. CAMUS

UN NOUVEL *APOCOPIS* DE L'ASIE MÉRIDIONALE

Apocopsis siamensis A. Camus, n. sp.

Planta annua, cæspitosa. Culmi erecti, graciles, plurinodes, superne leviter pubescentes. Lamina foliorum plana, lineari-lanceolata, acuminata, 3-4,5 cm. longa, 2 mm. lata, supra parce ciliata, marginibus pilis longis, rigidulis, basi tuberculatis ciliata; vagina costata, superne hirsuta; ligula brevis, membranacea, glabra. Racemi gemini, 2,5-3 cm. longi; articuli subgraciles, spicula subtriplo breviores, pilis rigidulis spadiceis vel rufescentibus ciliati. Spiculæ obovatæ, truncatæ, 5 mm. longæ. Gluma inferior chartacea, cuneata, apice late truncata, 5-7-dentata, 7-9-costata, costis in dentes excurrentibus, scabriuscula, parce pilosa, spicula brevior. Gluma superior chartaceo-membranacea, lineari-oblonga, truncata, subconvoluta, infra apicem rubella, spiculam æquans. Flos inferior : glumella inferior hyalina, ovato-oblonga, truncata, superne ciliata, spiculam subæquans; glumella superior hyalina, oblonga, glabra, spiculam subæquans. Flos superior : glumella inferior linearis, hyalina, superne chartaceo-membranacea, apice bidentata, minute ciliolata, longe aristata, spicula paullo brevior, in spiculis imis mutica; denticuli obtusiusculi; arista 2,5-3,2 cm. longa; columna irregulariter flexuosa, hirtula; glumella superior hyalina, late ovata, truncata, minute ciliolata, circa ovarium voluta, quam spicula brevior. Pedicellus sterilis 1-2 mm. longus, tenuis, ferrugineo-barbatus.

SIAM : [*Hosseus*].

La nervation et la dentelure de la glume inférieure rappellent un peu celles du *Lophopogon tridentatus*; mais la glume est bien plus dure, même au sommet, et les dents moins longues et moins aiguës. Dans l'*Apocopsis siamensis* il existe 5-7 dents alternativement développées ou réduites, et terminant les nervures, les nervures marginales ne se prolongent ordinairement pas sensiblement.

Cette espèce se rapproche de l'*A. Wightii* par la présence d'une arête très développée et d'un épillet pédicellé réduit seulement au pédicelle, mais elle s'en différencie nettement par :

1° Sa glume inférieure très brusquement et très largement tronquée, non membraneuse au sommet, à 7-9 nervures très marquées et ne s'atténuant pas au sommet.

2° Sa glume supérieure nettement plus longue que la glume inférieure et que la fleur supérieure.

3° La glumelle inférieure de l'épillet supérieur à dents plus profondes, à arête longue de 2,5-3,2 cm.

4° La pubescence soyeuse du sommet de la tige.



Camus, A. 1914. "Un nouvel Apocopis de l'Asie méridionale." *Notulae systematicae* 3(1), 83–83.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/26200>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/324382>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.