

POISSONS RECUEILLIS PAR M. CH. GRAVIER À DJIBOUTI ET À OBOCK,
PAR M. LE D^r JACQUES PELLEGRIN.

Les collections de Poissons rassemblées par M. Ch. Gravier lors de son voyage à Djibouti et à Obock méritent une étude particulière. Sans doute, la faune ichtyologique de ces localités, placées au fond du golfe d'Aden, dans la baie de Tadjourah, à l'entrée de la mer Rouge, commence à être bien connue, grâce aux importants travaux consacrés par Rüppel, Klunzinger, Day et plusieurs autres aux Poissons de ces régions; aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de l'absence de formes nouvelles parmi les nombreux échantillons récoltés par M. Gravier, mais les espèces rencontrées n'en sont pas moins, pour la plupart, des plus curieuses et des plus intéressantes.

M. Gravier, en effet, s'est tout spécialement attaché à recueillir des individus de taille souvent minime, composant cette faune si remarquable des Coraux et des Polypiers, ces petits Poissons de forme parfois bizarre et d'une coloration souvent éclatante, qui vivent au milieu des récifs madréporiques si abondants dans la baie de Tadjourah. Il a pu ainsi mettre la main sur quelques espèces excessivement rares et dont quelques-unes n'étaient pas encore représentées dans les collections du Muséum.

Voici la liste par familles de toutes les espèces rapportées, avec l'indication de la provenance.

- Syngnathidæ** SYNGNATHUS CONSPICILLATUS Jenyns. — Djibouti.
ACENTRONURA GRACILLIMA Schlegel. — Djibouti.
- Muraenidæ** OPHICHTHYS COLUBRINUS Boddaert var. FASCIATA Günther. — Obock.
MURÆNA UNDULATA Lacépède. — Djibouti.
— AFRA Bloch. — Djibouti.
- Cyprinodontidæ** CYPRINODON DISPAR Rüppel. — Djibouti.
- Ophidiidæ** ENCHELIOPHIS VERMICULARIS Müller. — Djibouti.
- Pleuronectidæ** RHOMBOIDICHTHYS PANTHERINUS Rüppel. — Djibouti.
ACHIRUS BARBATUS Lacépède. — Djibouti.
- Labridæ** DUYMERIA ENNEACANTHUS Bleeker. — Obock, Djibouti.
PLATYGLOSSUS SCAPULARIS Bennett, var. CÆRULEOVITATA Rüppel. — Djibouti.
- Blenniidæ** SALARIAS FUSCUS Rüppel. — Djibouti.
— LINEATUS Cuvier et Valenciennes. — Djibouti.
- Gobiidæ** GOBIUS SEMIDOLIATUS Cuvier et Valenciennes. — Djibouti.
— ECHINOCEPHALUS Rüppel. — Djibouti.
— ALBOMACULATUS Rüppel. — Djibouti.

Gobiidæ	GOBIODON CITRINUS Rüppel. — Djibouti. — RIVULATUS Rüppel. — Djibouti. ASTERROPTERYX SEMIPUNCTATUS Rüppel. — Djibouti.
Carangidæ	CARANX HIPPOS Linné. — Djibouti.
Scombridæ	ECHENEIS NAUCRATES Linné. — Obock.
Pseudochromidæ	PSEUDOCROMIS OLIVACEUS Rüppel. — Djibouti.
Scorpaenidæ	SCORPÆNA ERYTHRÆA Cuvier et Valenciennes. — Obock, Djibouti. — CHILIOPRISTA Rüppel. — Djibouti.
Pomacentridæ	DASYLLUS ARUANUS Bloch. — Djibouti. — MARGINATUS Rüppel. — Djibouti. POMACENTRUS TRILINEATUS Cuvier et Valenciennes. — Djibouti. HELIASTES LEPIDURUS Cuvier et Valenciennes. — Djibouti.
Apogonidæ	APOGON AURITUS Cuvier et Valenciennes. — Djibouti. — ENDEKATÆNIA Bleeker. — Djibouti.
Serranidæ	EPINEPHELUS STOLICZKÆ Day. — Obock.
Leptocardi	BRANCHIOSTOMA LANCEOLATUM Pallas. — Djibouti.

Tous ces Poissons sont marins, à l'exception des *Cyprinodon dispar* Rüppel, dont M. Gravier a recueilli de très nombreux spécimens, jeunes et adultes, dans les puits obscurs de la Doudah, à 6 kilomètres de Djibouti. Cette espèce est remarquable par son dimorphisme sexuel qui lui a valu son nom. La coloration, les dimensions des nageoires sont fort différentes chez le mâle et la femelle, si bien qu'au premier abord on serait tenté de les considérer comme des individus appartenant à deux espèces distinctes.

Il convient d'ajouter à la liste donnée ci-dessus deux utérus gravides pris sur deux Requins différents ⁽¹⁾. Dans l'un, provenant d'un spécimen capturé à Obock, se trouvaient trois fœtus qui semblent pouvoir être rapportés au *Carcharias melanopterus* Quoy et Gaimard. Dans l'autre, il n'y avait qu'un seul petit, à museau plus allongé et qui pourrait bien être le *Carcharias acutus* Rüppel. Ces pièces sont intéressantes; on sait, en effet, que, chez les *Carcharias*, il n'y a pas seulement ovoviviparité, mais qu'il existe chez les fœtus un cordon et un placenta qui rappellent assez ce qui se passe chez les formes les plus élevées de l'embranchement des Vertébrés.

(1) M. GRAVIER a rapporté également quelques exemplaires d'une curieuse petite espèce, provenant de Chine et remise par M. Bastianello, le *Betta pugnax* Cantor de la famille des Labyrinthicés. Ils appartiennent à la variété domestique, dont l'humeur agressive est exploitée, principalement au Siam, dans des joutes minuscules. Les Siamois, au dire de Cantor, sont aussi friands du spectacle de la lutte de ces petits Poissons que les Malais des combats de Coqs.

Parmi les espèces les plus remarquables, il y a lieu de citer en outre deux spécimens d'*Encheliophis vermicularis* Müller; ce sont de petits Poissons plus ou moins vermiformes, assez voisins des *Fierasfer*, qui furent recueillis au milieu des ramifications de Madrépores. Cette espèce, dont les types provenaient du Japon, ne doit pas être très rare à Djibouti, car M. Coutière, lors de son voyage, en avait rapporté aussi de cette localité un exemplaire, qu'il indiquait comme probablement parasite des Holothuries⁽¹⁾. D'après M. Gravier, la teinte générale de ces Poissons est claire, rosée à la partie antérieure, verte en arrière.

Comme Poissons de Polypiers, il y a lieu de citer plus particulièrement les *Salarias*, tous les Gobiidés, les *Pseudochromis*, les *Dascyllus* ou *Tetra-drachmum*, de jeunes *Héliastes* et de jeunes *Apogon*.

M. Gravier a capturé à Obock, sur le récif de la Clochetterie, un jeune spécimen d'*Epinephelus Stoliczkæ*, espèce décrite par Day, il y a relativement peu d'années.

Les *Branchiostoma* ou *Amphioxus* proviennent d'un dragage fait à Djibouti, à une profondeur de 6 mètres, dans les herbiers et dans le sable à l'embouchure de la rivière Ambouli⁽²⁾.

ENUMERATIO SCOLYTIDARUM E GUYANA, VENEZUELA ET COLUMBIA NATARUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS PARISIORUM, DESCRIPTIONIBUS SPECIERUM NOVARUM ADJECTIS,

AUCTORE D^r MAX HAGEDORN, HAMBURGENSE.

PARS PRIMA.

Scolytus productus nov. sp. 1 spécimen ♂. — Patria : San Esteban Venezuelæ (E. Simon).

CAMPTOCERUS AENEIPENNIS Fabricius, *Systema Eleutheratorum*, t. II, p. 392. Compluria specimina. — Patria : Guyane française, Camopi. « Dans le bois d'une Euphorbiacée (Mapa) » (F. Geay). Guyane française (D^r E. Rech).

(1) H. COUTIÈRE. Observations sur quelques animaux des récifs madréporiques de Djibouti, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, 1898, p. 240.

(2) Quelques Reptiles et Batraciens ont été aussi recueillis par M. Gravier; ce sont, d'après la détermination de M. Mocquard : *Pristurus rupestris*, Blanford; *Eremias mucronata* Blanford; *Bufo Blanfordii* Boulenger; *Bufo Dodsonii* Boulenger; en outre, une forme de Batracien associée du groupe des *Firmistornia*, qui paraît nouvelle et sera décrite ultérieurement.



Pellegrin, Jacques. 1904. "Poissons recueillis par M. Ch. Gravier à Djibouti et à Obock." *Bulletin du Muse
um d'histoire naturelle* 10(8), 543–545.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137056>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/327514>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.