

Europe, où, dans les conditions actuelles, ils arrivent généralement dans un état de débilité tel, qu'ils peuvent à peine se soutenir, et que la mort survient au bout de peu de temps.

DESCRIPTION DE DEUX FORMES NOUVELLES D'OISEAUX
RAPPORTÉS DE LA BOLIVIE PAR LA MISSION DE CRÉQUI-MONTFORT,
PAR M. A. MENEGAUX.

Agriornis andecola pazña, nov. subp.

AGRIORNIS ANDECOLA d'Orbigny, *voy. Oiseaux* (1844, p. 350).

Un spécimen. Chemin de Pazña à Urmiri (près du lac Poopo, 3,694 mètres d'altitude), 14 juin 1903.

Cette forme est caractérisée à première vue par la couleur du corps, en dessus et en dessous, et par celle des ailes et de la queue, beaucoup moins foncée que celle d'*A. andecola andecola* d'Orb., ainsi que par les parties blanches qui sont d'une couleur beaucoup plus pures.

La tête et la nuque sont uniformes, mais un peu plus foncées que le reste des parties supérieures qui sont d'un brun blanchâtre, plus pâle que chez l'espèce type. La gorge et le menton sont d'un blanc pur, limités par des bords plus foncés; cette région porte en son milieu 4 ou 5 plumes qui forment une sorte de strie noirâtre discontinue. Quelques stries noirâtres indécises s'irradient sur les joues et sur les côtés du cou. Le trait sourcilier part de la base du bec et dépasse l'œil; il est blanchâtre, comme le pourtour de l'œil. Les lores sont d'un noirâtre moins foncé que sur le type de l'espèce.

Le jugulum et la poitrine antérieure sont d'un gris fauve très clair, ainsi que les sous-alaires; le bas ventre et les sous-caudales sont isabelle clair, les flancs et les cuisses sont d'une couleur brunâtre très pâle. Chez le type de l'espèce, toutes ces parties sont plus foncées; le milieu de l'abdomen est plus jaunâtre.

Les rémiges et les rectrices sont aussi moins foncées. Les rémiges secondaires et tertiaires portent une large bordure blanche. Le bord alaire est blanc, comme sur le type de l'espèce. La queue est formée de douze rectrices de couleur uniforme et finement bordée de roussâtre. Seule, la rectrice la plus externe de chaque côté (la 6^e) possède des barbes externes d'un blanc pur de la base jusqu'à la pointe. L'extrême pointe des rectrices est plus pâle.

Comme on le voit, cette forme diffère donc de *A. montana* d'Orb. et Lafr. des Andes de Bolivie et de *A. maritima* d'Orb. et Lafr. qui ont la moitié apicale des rectrices extrêmes blanche; du groupe de *A. pollens* Scl., *A. soli-*

taria Scl. de l'Équateur et de *A. insolens* Scl. et Salv. de Bolivie, qui ont les rectrices externes tout entières blanches. Elle fait partie du groupe d'*A. livida* Kittl. du Chili, d'*A. striata* Gould de l'Argentine et de la Patagonie et d'*A. andecola* d'Orb. de Bolivie. Par sa couleur, ses divers caractères et son habitat, c'est d'*A. andecola* qu'elle se rapproche le plus.

***Brachyspiza capensis pulacayensis*, nov. subsp.**

FRINGILLA CAPENSIS P. L. S. Müller, *Natursyst. Supp.* (1776), p. 165 (ex Daubenton, pl. 386, fig. 2). Voir Hellmayr, *Revision des Spix'schen Typen*, in *Bayer. Ak. Wissensch.* (1906, Cayenne).

ZONOTRICHIA PILEATA auct.

a. Un spécimen de Pulacayo, 4,200 mètres d'altitude;

b. Un spécimen des Pampas de Pazña du 12 juin 1903.

Ces deux spécimens appartiennent à une forme des hautes montagnes qui se différencie de celles des pays voisins par sa taille plus grande, par un large demi-collier roux cannelle qui atteint 11 millimètres de largeur au milieu et sur les côtés. Les deux grandes taches latérales noires du jugulum sont assez nettement séparées. Les rémiges secondaires portent une large bordure externe roux cannelle de 3 à 4 millimètres; la bordure du côté interne est moins large et moins vive de couleur. Les grandes couvertures alaires sont aussi très largement bordées de roux; la pointe seule de cette bordure est d'un blanc plus ou moins pur. Les couvertures moyennes sont noirâtres et largement bordées de blanc pur, 3 à 4 millimètres, de même que les tectrices primaires. Les rectrices sont bordées d'un gris roussâtre assez net.

Le milieu de la tête est parcouru par une ligne cendré bleuâtre qui part du front où elle est étroite et va en s'élargissant jusqu'au collier roux cannelle. Le trait supra-sourcilier se prolonge en arrière de l'œil et devient cendré bleuâtre.

Deux spécimens rapportés de Bolivie par Castelnau et Deville en 1846 et étiquetés *Zonotrichia matutina* G.-R. Gray et *L. pileata* Bodd. se rapprochent de cette forme par la taille et les autres caractères, mais le demi-collier est moins large, pourtant plus large que sur les autres formes voisines.

Dimensions en millimètres des spécimens étudiés :

a. Longueur totale, 165; aile, 82; queue, 78; bec, 12,5; tarse, 22;

b. Longueur totale, 163; aile, 80; queue, 74; bec, 11; tarse, 21;

c. Longueur totale, 155; aile, 75; queue, 73; bec, 12; tarse, 12 (de Bolivie, par de Castelnau et Deville).

Les nombreux spécimens que j'ai examinés sont tous de taille plus petite, et ils ont des dimensions très voisines de celles indiquées au *Cat. Bird. Brit. Mus.*, soit : 152, 67, 62, 11, 20.

Cette forme des hautes montagnes est donc plus grande que toutes celles signalées dans les pays voisins, en sorte que l'énumération des diverses formes faites par Ridgway [in *Auk*, vol. XV, p. 321 (1898)] doit être complétée de la façon suivante :

1. *BRACHYSPIZA CAPENSIS* (Muller), du Vénézuéla au Paraguay et à l'Argentine;
2. *BRACHYSPIZA CAPENSIS INSULARIS* Ridgway, Curaçao;
3. *BRACHYSPIZA CAPENSIS PERUVIANA* (Lesson), du Sud du Mexique au Pérou;
4. *BRACHYSPIZA CAPENSIS CHILENSIS* (Meyen), Chili;
5. *BRACHYSPIZA CAPENSIS CANICAPILLA* (Gould), Sud de la Patagonie;
6. *BRACHYSPIZA CAPENSIS PULACAYENSIS* Menegx, Pulacayo, Bolivie.

La forme *Zonotrichia pileata* a déjà été signalée en Bolivie par d'Orbigny; à Sorata, Nairapi; dans la province des Yungas, par Sclater et Salvin.

CHARACINIDÉS AMÉRICAINS NOUVEAUX
DE LA COLLECTION DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,
PAR M. LE D^r JACQUES PELLEGRIN.

La famille des Characinidés très répandue dans toutes les eaux douces de l'Afrique et de l'Amérique centrale et méridionale est à l'heure actuelle une des plus riches de la classe des Poissons, puisqu'on en connaît environ 500 espèces.

J'ai déjà donné l'année dernière ⁽¹⁾ la description de deux formes américaines de cette famille : le *Tetragonopterus* (*Astyanax*) *Riveti* nov. sp. et le *Macrodon malabaricus* Bloch. var. *macrophthalma* var. nov. ⁽²⁾.

Dans cette note on trouvera la description de cinq formes nouvelles de Characinidés américains; elles appartiennent aux genres *Curimatus*, *Hemiodus*, *Characidium*, et la dernière est le type d'un genre nouveau voisin des *Anostomus*.

J'y ajouterai, en outre, une variété non encore signalée du *Tetragonopterus* (*Markiana*) *nigripinnis* Perugia.

(1) D^r Jacques PELLEGRIN. Characinidés américains nouveaux. (*Bull. Mus. Hist. nat.*, 1907, p. 25.)

(2) Un second exemplaire (N° 01-382, Coll. Mus.), mesurant $100 + 23 = 123$ millimètres provenant de la rivière Camopi (Guyane française) et dû à M. Geay, doit être rapporté à cette variété.



Menegaux, Auguste. 1908. "Description de deux formes nouvelles d'Oiseaux rapportés de la Bolivie par la Mission de Créqui-Monfort." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 14(7), 340–342.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27194>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/331751>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.