

UNE ESPÈCE INDO-CHINOISE DU GENRE *SARCOSPERMA*,  
DE LA FAMILLE DES *SAPOTACÉES*,

PAR M. HENRI LECOMTE.

Le genre *Sarcosperma* fut créé par Hooker f. pour une Sapotacée à feuilles stipulées et dont les fleurs sont disposées en grappes simples ou rameuses à l'aisselle des feuilles. Le limbe des feuilles est d'ailleurs bien caractérisé par sa nervation, car les nervures secondaires sont réunies par des nervures de troisième ordre à peu près parallèles entre elles, nombreuses et disposées de façon à être à peu près perpendiculaires à la côte. Ces trois caractères : stipules, mode de nervation des feuilles et forme de l'inflorescence, font de cette Sapotacée un genre bien distinct dans le groupe des Sidéroxylées. Réduit à quelques espèces, ce genre n'était jusqu'ici connu que dans l'Inde, dans la presqu'île de Malacca et en Chine. Il était donc tout naturel de le rencontrer dans l'Indo-Chine qui constitue un pays intermédiaire entre l'Inde et la Chine : en effet, dans les récoltes du Père Bon, nous avons eu la bonne fortune de rencontrer un spécimen, malheureusement réduit à un rameau feuillé portant un fruit non mûr, que nous avons dû rapporter au genre *Sarcosperma*.

Ce *Sarcosperma* ne présente pas de domaties sur ses feuilles et, par conséquent, par ce caractère négatif, il s'éloigne nettement des espèces *S. arborea* Hook f. et *S. paniculata* Stapf et King. D'autre part, sa nervation tertiaire très serrée la distingue complètement des espèces *S. Griffithii* Benth. et *S. pedunculata* Hemsl. qui ont, comme la plante d'Indo-Chine, des feuilles dépourvues de domaties.

***Sarcosperma tonkinensis* sp. nov.**

*Arbor* 8–10 m. alta. *Ramuli* graciles. *Folia* alterna; *stipulæ* caducæ; *petiolus* supra canaliculatus 1.5–2 centim. longus; *limbus* subcoriaceus ovato-oblongus, 8–11 centim. longus 3–4 centim. latus, basi leviter attenuatus, apice acutus vel breviter acuminatus; *nervi* utrinque 11, curvati, supra prominentes; *nervuli* numerosi, graciles, paralleli versus costam. *Spica* axillaris 5 centim. longa. *Flores* incogniti. *Fructus* baccatus pedicello 3 millim. longo instructus, 1–seminatus, oliviformis, 2.3 centim. longus. *Semen* immaturum.

Nom vernaculaire : *Cây bác*.

Tonkin, Ninh thai, forêt de Mûn lang. P. Bon N° 3.974.

Le nombre des espèces du genre *Sarcosperma* se trouve donc élevé actuellement à six appartenant exclusivement à la flore asiatique, et l'aire de dispersion s'étend sans interruption de l'Inde à la Chine.



Lecomte, Henri. 1918. "Une espèce Indo-Chinoise du genre *Sarcosperma* de la famille des Sapotacées." *Bulletin du Muse*

*um national d'histoire naturelle* 24(7), 534–535.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27205>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/332891>

**Holding Institution**

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

**Sponsored by**

MSN

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: NOT\_IN\_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.