

SUPPLEMENT

OP DE

LIJST DER IN NEDERLAND VOORKOMENDE

SCHILDVLEUGELIGE INSECTEN (Coleoptera),

DOOR

Jhr. Ed. EVERTS, *Phil. Dr.*

De behoefte aan een supplement op de voor twee jaar door mij uitgegeven Lijst der Nederlandsche Coleoptera heeft zich thans ruimschoots doen gevoelen.

Vele coleopterologen hebben zich wederom beijverd het materiaal te doen bijeenkomen; niet genoeg kan ik hun voor die medewerking erkentelijk zijn; moge deze hernieuwde poging bij de beoefenaars onzer wetenschap den gewenschten bijval vinden.

Tevens is het mij eene aangename taak mijn' medebewerker Mr. A. F. A. Leesberg dank te zeggen voor zijne zoo gewichtige ondersteuning.

Ook kan ik niet genoeg bij herhaling gedenken de bereidwillige hulp van de heeren A. Fauvel te Caen en J. Putzeys te Brussel, alsmede van de heeren Allard te Parijs (Halticiden), Desbrochers des Loges te Vitry-aux-Loges (Curculioniden), en Edmund Reitter te Paskau in Moravie (Nitidulariën, Cryptophagiden, Lathridiiden), die ons bij de bewerking der moeilijksste familiën zoo zeer de behulpzame hand boden.

Om niet al te uitvoerig te worden, heb ik het eerst door mij opgevatte plan, om te gelijk een overzicht van al de nieuwe vindplaatsen te geven, laten varen.

Ik veronderstel dat het aantal inlandsche Coleoptera het maximum begint te naderen, en wanneer nu ten gevolge van de behandeling van afzonderlijke groepen, de kennis der soorten zich aanzienlijk zal hebben uitgebreid, dan is het te verwachten, dat eene meer uitgebreide lijst, voorzien van citaten en met korte aanwijzing van levenswijze der soorten, eene eerste behoefte zal worden, en als zoodanig als eene vernieuwde uitgave niet onwenschelijk zal zijn.

Even als in mijne Lijst beteekenen de cijfers achter de vindplaats de maand der vangst; die achter de soortnaam verwijzen naar den Catalogus van de Marseul; het teeken * vóór eene soort duidt aan dat deze in de collectie der Nederlandsche Entomologische Vereeniging ontbreekt; het teeken † achter de soort beduidt hetzelfde voor mijne eigen collectie.

- * *Nebria livida* L. 2. — Nijmegen, Maitl.
- * *Dyschirius laeviusculus* Putz. † 24. — Selzaete, Putzeys.
- * » *remotepunctatus* Putz. †. — Moerdijk, Putzeys.
- * *Callistus lunatus* F. † 1. — St. Pieter 7, M.
- * *Badister unipustulatus* Bon. 1. — Middelburg, La F.; Wassenaar 4, Rits.; Haag 4, E.
- * *Diachromus germanus* L. 1. — Ede 6, Maitl.
- * *Dichirotrichus obsoletus* Dej. 1. — Walcheren, G. v. Wijk.
- * *Bradycellus similis* Dej. 10. — Rotterd. Sn.
- * *Harpalus rupicola* St. † 37. — St. Pieter, M.
- * » *ignavus* Dfts. † 91. — Tellin 5, M.; de zwarte var. bij Bergen op Zoom 6, E.
- * *Feronia aterrima* F. † 72. — Breda 8, L.
- * *Molops elata* F. 231. — Huissen, Agh.
- * *Amara famelica* Zimm. 31. — Rott. Veth.
- * » *tibialis* Payk 36. — Arnh. 5, d. R.
- * » *rufocincta* Sahl. 56. — Breda, H.; Leiden, Hait.

- * *Amara montana* Dej. 81. — Rott. Sn. (Wellicht is deze Zuid-Europeesche soort met hout of op andere wijze overgebracht).
- * *Anchomenus impressus* Pz. † 27. — Dieren 5, K.
- * » *scitulus* Dej. † 50. — Sluis-Kill (Zeeland) 7, Putz.
- * *Pogonus luridipennis* Germ. 3. — Bergen op Zoom langs de Schelde, 6, E.; Selzaete, Putzeys.
- * » *littoralis* Duft. 5. — Walcher. G. v. W. en La F.
- * *Trechus rubens* F. 11. — Rott. 5, Veth.
- * *Bembidium impressum* Pz. 3. — Ellecom 6, K.; Oosterbeek, Putzeys; Holland, Sn.
- * » *nigricorne* Gyll. † 26. — Eindhoven, door den heer Miedel.
- * » *pusillum* Gyll. var. *normannum* Dej. — Walch. G. v. W.
- * » *ephippium* Marsh. 129. — Arnemuiden 7 en fort de Nolle 7, G. v. W. en La F.; Bergen op Zoom 6, E.; Zierikzee 7, Fokk.
- * *Tachys scutellaris* Germ. 26. — Bergen op Zoom 6, langs de Schelde, E. en L.
- * *Colymbetes notaticollis* Aubé † 12. — Breda 4, H.
- * *Agabus guttatus* Payk. † 31. — Breda 4, H.
- * *Hydroporus oblongus* Steph. † 100. — Breda 6, L.
- * » *melanarius* St. † 107. — Breda 8, L.
- * » *obscurus* St. † 121. — Breda, H.
- * » *xanthopus* Steph. 95. — Rhoon, Schepman; Zuid-Holl., Per.
- * » *granularis* L. † 134. — Vorden 7, G.
- * *Haliplus obliquus* F. † 3. — Breda, H.; Rhoon 4, Schepman.
- * » *mucronatus* Steph. 10. — Koudekerke, G. v. W.; Zandvoort 7, G.
- * » *cinereus* Aubé 14. — Breda 8, L.; Huissen, Agh.
- * » *varius* Nicolai. — Amby 4, M.; Breda, H.; Vorden 8, G.; Middelb., G. v. W.
- Gyrinus bicolor* F. 4. — Middelburg 4, 6, G. v. W.; Zierikzee 3, Fokk.
- » *opacus* Sahl. 9. — Breda 6, in de Mark, L.

- * *Orectochilus villosus* Ill. 4. — Breda 8, in de Mark, L.
- * *Ochlthebius marinus* Payk 10. — Middelb. G. v. W. en La F.; Zierikzee, Fokk.; Rott. Veth.
- * *Cercyon aquaticum* Steph. 12. — Haag 3, E.; Utr. Six.
- * » *plagiatum* Er. 14. — Breda 8, L.; Haag 10, E.
- * *Crataeraea suturalis* Mann. (*praetexta* Er.) 6. — Haag 9, E.
- * *Lomechusa paradoxa* Steph. 4. — Haag 4, duinen, Hait.
- * *Myrmedonia collaris* Payk † 4. — Breda, H.
- * » *cognata* Märk. † 8. — Breda, H.
- * *Homalota terminalis* Gyll. 33. — Haag 4, E.
- * » *luridipennis* Manh. 40. — Haag 4, E.
- * » *cavifrons* Sharp. — Haag 3, E.
- * » *soror* Er. † 102. — In Holland volgens den heer Fauvel.
- * » *sordida* Kr. 118. — Haag 3, 4. L. en E.; Wolfheze 9, d. R.
- * » *hepatica* Er. 119. — Rott. Veth.
- * » *sodalis* Er. 138. — Haag 10, E.
- * » *villosula* Kr. 182. — Haag 9, 10, E.; Rott. Veth.
- * » *picipennis* Gyll. † 235. — In Holland volgens den heer Fauvel.
- Oligota atomaria* Kr. 6. — Haag 3, 4, 10, E. en L.
- * » *punctulata* Heer. — Haag 11, E.
- * *Myllaena minuta* Grav. † 5. — Lochem 7, K.
- * *Hypocyptus laeviusculus* Manh. 8. — Utr. Six.
- * *Mycetoporus ruficornis* Kr. † 14. — Breda, H.
- * *Acylophorus Wagenschieberi* Ksw. † 2. — Breda 8, onder mos, L.
- * *Heterothops praeivius* Er. 1. — Haag 3, E.
- * *Quedius praecox* Grav. 37. — Wolfh. 9, d. R.; Utr. Six.
- * *Staphylinus fulvipes* Scop. 13. — Baarn 7, Veth.
- * *Ocypus pedator* Grav. † 24. — Maastr. door den heer Ziegeler.
- * *Philonthus temporalis* Muls. † 14. — Breda, H.
- * » *scutatus* Er. 16. — Haag 4, E.
- * » *lepidus* Grav. † 33. — Bergen op Zoom 6, L.
- * » *immundus* Gyll. 63. — Breda, H.; Haag 3, 12 en Kuyk, E.; Middelb., G. v. W.

- * *Erichsonius elongatulus* Er. 113. — Haag 5, E.
- * *Xantholinus glaber* Er. † 13. — Oud-Vroenhoven 4, M.
- * *Achenium depressum* Gr. 1. — Middelb. 5, 7, G. v. W.;
Bergen op Zoom 7, E.
- * *Scopaeus laevigatus* Gyll. 3. — Arnh. 10, de R.
- * *Lithocharis ripicola* Kr. 13. — Rott. 5, Veth.
- * *Sunius pulchellus* Heer (*diversus* Aubé) 17. — Haag 3, E.
- * *Stenus lustrator* Er. † 57. — Breda, H.
- * » *humilis* Er. 71. — Rott. 5, Veth.
- * » *salinus* Bris. 83. — Rott. 8, Sn.; Huissen 5, Agh.
- * » *geniculatus* Grav. † 117. — Breda, H.; Amst. K.
- * » *palustris* Er. 120. — Arnh. 9, d. R.; Tiel, Seipg.;
Breda 6, L.; Middelb., G. v. W.
- * *Bledius bicornis* Germ. † 7. — Domburg 6, L.; Zierikzee 8, Fokk.
- * *Lesteva punctata* Er. 10. — Haagsche bosch 10, onder dorre
bladeren, E.
- * *Coryphium angusticolle* Steph. † 1. — Volgens opgave van
den heer Fauvel in Holland.
- * *Omalium riparium* Thoms. 3. — Haag 10, E.
- * *Anthobium ophthalmicum* Payk 40. — Middelb. 5, La F.
- * *Proteinus limbatus* Mäkl. — Haag 4, E.
- * *Megarthus hemipterus* Ill. † 5. — Tiel, Seipg.
- * *Bythinus bulbifer* Rchb. 24. — Haag 4, onder dorre bladeren, E.
- * *Euplectus signatus* Reichb. 6. — Haag 3, 4, 10. E. en L.
- * » *piceus* Motsch. 13. — Haag 3, 10, L.
- * » *bicolor* Denny 17. — Haag 3, 4, E. en L.
- * » *intermedius* Saulcy. — Haag 4, E.
- * *Eutheia scydmaenoides* Steph. 4. — Delft 4, gemeen onder
dorre bladeren, E. en L.
- * *Colenis dentipes* Gyll. † 1. — Noordwijk 10, Weytlandt.
- * *Liodes axillaris* Gyll. 2. — Bergen op Zoom 6, in zwam-
men, L. en E.
- Clambus Armadillo* de G. 1. — Haag 4, onder dorre bladeren, E.
- * *Comarus enshamensis* Steph. — Utr. Gr.; Middelb. 9, G. v. W.
- * *Trichopteryx thoracica* Gillm. 3. — Haag 3, E.
- * » *grandicollis* Manh. 9. — Haag 4, E.

- * *Millidium trisulcatum* Aubé (*Ptilium minutissimum* Ljungh).
— Haag 10, E.
- * *Hister ruficornis* Grim † 37. — Breda 8, in een fungus, L.
- * *Acritus nigricornis* Hofm. 6. — Haag 10, E.
- * *Cercus rufilabris* Latr. † 8. — Bunde 7 en Nuth 7, M.
- * » *Sambuci* Er. †. — Tellin 5, M.
- * *Carpophilus dimidiatus* F. 10. — Haag, in rijst, E.
- * *Epuraea melina* Er. † 5. — Nuth 8, M.
- * *Meligethes lumbaris* St. † 2. — Maastricht, M.
- * » *Hebes* Heer † 4. — Haag 10, L.
- * » *ochropus* St. 33. — Haag 6, E.; Nuth, M.
- * » *difficilis* Heer 35. — Haag 4, 5, E.
- * » *pedicularius* Gyll. 44. — Zuid-Holl., Per.
- * » *villosus* Bris. 47. — Maastricht, M.
- * » *serripes* Gyll. 50. — Haag 4, E.
- * » *planiusculus* Heer 63. — Wassenaar 7, v. V.
- * » *fuliginosus* Er. 68. — Haag 4, 5, 7, 8. E. en L.
- * » *gagatinus* Er. 83. — Haag 4, E.
- * *Synchita Juglandis* Helw. 1. — Axel, achter boomschors, Sn.
- * *Atomaria plicicollis* Mäkl. — Haag 3, 4, 10. E. en L.
- * » *Herminea* Reitt. — Haag 9, E.
- * » *nigriventris* Steph. (*nana* Er.) 7. — Haag 4, E.
- * » *Rhenana* Kr. 22. — Middelb. La F.; Zuid-Holland, Per.; Haag 5, L.
- * » *peltata* Kraatz 24. — Haag 10, E.
- * » *analisis* Er. 48. — Haag 3, 9, 10. E.; Rott. 5, Veth.
- * » *testacea* Steph. — Haag 10, E.
- * *Holoparamesus Kunzei* Aubé. † — Uit rijst, v. V.
- * *Lathridius alternans* Manh. † 11. — Middelb. 6, L.; Vorden, G.
- * » *ruficollis* Marsh. 21. — Haag 5, E.
- * *Corticaria impressa* Ol. 12. — Niet zeldzaam bij den Haag, E. en L.
- * » *serrata* Payk † 18. — Breda 8, L.
- * » *crocata* Manh. 49. — Haag 7, 9. E.; Rott. Veth.; Noordw. Weytl.; Nuth 7, M.; Hilversum 7, L.
- * » *latipennis* Sahlb. — Haag 10, E.

- * *Monotoma longicollis* Gyll. 15. — Haag 10, E.; Middelb. G. v. W.
- * *Murmidius ovalis* Beck. — Uit rijst, v. V.
- * *Aphodius borealis* Gyll. 24. — Texel en Vlieland, Rits. en Roelofs.
- * » *Scrofa* F. 78. — Arnh. 5, d. R.; Breda, H.
- * » *tristis* Panz. 79. — Wassenaar 5, E.; Middelb. G. v. W.
- * » *consputus* Creutz. 100. — Oranjezon 10, G. v. W.
- * *Agrilus viridis* L. 10. — Velp, Rits.
- * *Cryptohypnus tetragraphus* Germ. 9. — Bunde 7, M.
- * » *dermestoides* Hrbst. † 21. — Bunde 7, M.
- * *Cardiophorus nigerrimus* E. † 32. — Kerkrade 6, M.
- * *Athous crassicollis* Lac. — Tiel, Seipg.; Middelb. G. v. W.; Zierikzee, Fokk.
- * *Corymbites Quercus* Gyll. † 13. — Breda, H. en L.
- * *Adrastus axillaris* Er. † 2. — Haagsche bosch 7, L.
- * *Cyphon nitidulus* Thoms. 2. — Middelb. 5, La F.
- * *Eucinetus haemorrhoidalis* Germ. 1. — Middelb. La F.
- * *Malthodes Maurus* Cast. 32. — Rott. 6, Piag.
- * *Ebaeus thoracicus* Ol. 7. — St. Pieter 7, M.
- * *Clerus 4-maculatus* F. 6. — Middelb. 5, La F.
- * *Cis festivus* Panz. 27. — Schev. 8, Six.
- * *Aspidiphorus orbiculatus* Gyll. 1. — Middelb. 6, E.
- * *Ptinus pusillus* St. 34. — Breda, H.
- * *Cistela ceramboides* L. † 13. — Arnh. d. R.; Oirschot 6, M.
- * *Rhipiphorus paradoxus* L. † 1. — Soest door den heer v. d. Honert.
- * *Asclera coerulea* L. 4. — Utrecht, in huis gevangen, 5.
- * *Liophloeus Herbstii* Gyll. — † Nuth 7, M.
- * *Strophosomus retusus* Marsh. 5. — St. Pieter 7, M.
- * » *curvipes* Thoms. — Wolfheze 9, d. R.
- * *Sitones tibialis* Hrbst. 16. — Rott. Sn.; St. Pieter 7, M.; Haag 4, Hait.; Velp, Rits.; Vorden 7, G.
- * *Metallites atomarius* Ol. 6. — Ellecom 6, Hait.
- * *Polydrosus flavovirens* Gyll. 24. — Ellecom 6, op wilgen K.; Middelb. La F.
- * *Otiorhynchus tenebricosus* Hrbst. 39. — Maastr. (St. Pietersb.) gemeen, M. en G.

- * *Trachyphloeus scaber* L. 2. — Hilversum 7, L.; Oudenbosch, Weytl.; Bunde 7, M.; Texel 7, Roelofs.
- * » *squamulatus* Ol. 10. — Middelb. La F.; St. Pieter, M.
- * *Phyllobius Artemisiae* Desbr. †. — Sluys-Kill (Staats-Vlaanderen) M. v. d. Broeck.
- * *Hylobius fatuus* Rossi 8. — Rotterd. Sn.
- * *Dorytomus maculatus* Marsh. 23. — Middelb. 6, E.
- * » *nebulosus* Gyll. 35. — Holl. v. V.
- * *Bagous subcarinatus* Gyll. 9. — Rott. Sn.
- * » *tempestivus* Hrbst. 20. — Utr. S.
- * » *cylindrus* Payk † 31. — Amby 4, M.
- * *Anoplus Roboris* Suf. 2. — Gelderland 6. Sn.
- * *Apion opeticum* Bach. 2. — Vian. 6, E.; Zuid-Holl., Sn.
- * » *Caullei* Wenck. 18. — Wassen. 10, v. V.
- * » *confluens* Kirby † 25. — Buiksloot 8, K.
- * » *pubescens* Kirby 41. — Rott. 9, Sn. en Veth.; Walch. 7, G. v. W.
- * » *vicinum* Kirby † 43. — Haag 2, L.; Breda, H.
- * » *pallipes* Kirby † 62. — Maastr. 6, Gr.
- * » *cruentatum* Walton 89. — Vianen 6, E.
- * » *sanguineum* d. G. 91. — Haag 4, Hait.; Wasse- naar 11, Per.
- * » *Ononidis* Gyll. 98. — Haag 5 en Bergen op Zoom, E. op *Ononis repens*; Zierikzee, Fokk.; Breda, H.; Ellecom 6, Hait.
- * » *difforme* Germ. 114. — Haag 4, 5, E. en L.
- * » *Meliloti* Kirby † 133. — Bunde 7, M.
- * » *simile* Kirby 139. — Haag 5 en Steeg 8, E.; Leid. v. V.; Ellecom 6, Hait.; Middelb. La F.; Hillegom 5, K.
- * » *aethiops* Hrbst. † 167. — Maastr. M.
- * » *punctigerum* Germ. 169. — Valkenburg 6, Roel.
- * » *ebeninum* Kirby 177. — Hilvers. 7, E.; Breda 8, L.
- * » *Sedi* Germ. 185. — Haag 4, duinen op *Sedum acre*, Sn. en E.
- * » *affine* Kirby 193. — Middelb. 6 en Rozendaal, E. en L.; Breda 5, H.

- * *Diodyrhynchus austriacus* Germ. 1. — Arnh. 5, d. R.; Middelb. La F.
- * *Magdalinus violaceus* L. † 2. — Breda 6, L.
- * » *phlegmaticus* Hrbst. † 7. — Bergen op Zoom 6, L.
- * » *carbonarius* L. 4. — St. Oedenrode 7, Veth.
- * *Anthonomus Ulmi* d. G. 1. — Arnh. 4, de R.
- * *Orchestes melanocephalus* Ol. 9. — Middelb. 11 en Koudekerke 6, G. v. W.; Noordwijk, Weytl.
- * *Gymnetron melanarius* Germ. † 15. — Middelb. 6, L.
- * » *longirostris* Gyll. 39. — Breda 6, v. Hall.; Maastr. 5, Gr.
- * » *Campanulae* L. 44. — Ulvenhout 5, Piaget.; Bergen op Zoom 6, L.; Oirschot 6, M.; Breda 5, H.; Ginneke 7, v. V.; Vorden 8, Gr.
- * *Acalles ptinoides* Marsh. † 22. — Wolfheze 5, Putzeys.
- * *Cæliodes exiguus* Oliv. 19. — Middelb. 7, G. v. W.
- * *Rhytidosomes globulus* Hrbst. † 1. — Middelb. 6, Weytl.
- * *Ceuthorhynchus melanarius* Steph. 6. — Amst. 2, onder dood riet, K.; Rott. 5, Veth.
- * » *frontalis* Bris. 17. — Middelb. La F.; Zierikzee 5, Fokk.
- * » *alboscuteollatus* Gyll. 38. — Arnh. 4, d. R.
- * *Phytobius Comari* Hrbst. 9. — Rott., Sn.
- * *Rhinoncus denticollis* Gyll. — Middelb. La F.; Breda 6, L.
- * *Baridius cuprirostris* F. † 30. — St. Pieter 7, M.
- * *Rhyncolus truncorum* Germ. † 10, — Uit eene inl. coll. afkomstig van den heer v. Eyndhoven te Zutphen, K.
- * *Phloeophorus Spartii* Nordl. † 3. — Haag 4, Hait.
- * *Scolytus pygmaeus* Hrbst. † 3. — Breda 11, L.
- * *Cryphalus granulatus* Ratz. 7. — Huissen 7, de R.
- * *Dryocætus cryptographus* Ratz. † 2. — St. Pieter 8, M.
- * *Tropideres albirostris* Hrbst. † 1. — Arnh. 5, d. R.
- * » *cinctus* Payk. 11. — Huissen 6, Agh.
- * *Bruchus luteicornis* Ill. 85. — Middelb. en Bergen op Zoom 6, E.
- * *Clytus detritus* L. 1. — Zwolle, v. Tuin.

- * *Obrium cantharinum* L. † 1. — Maastr. 6 en Venlo 6, M.
- * *Leptidia (Gracilia) brevipennis* Muls. 3. — Middelb. 7, G. v. W.
- * *Rhamnusium Salicis* F. 1. — Haag, Vosmaer.
- * *Strangalia attenuata* L. 7. — Middelb. La F.
- * *Grammoptera praeusta* F. † 7. — Venlo, v. d. Brandt.
- * *Cryptocephalus flavescens* Schneid. 97. — Nuth. 7, M.
- * *Lina cuprea* F. † 6. — Kerkrade 5, M.
- * *Galeruca xanthomelaena* Schr. † 3. — St. Pieter, M.
- * *Luperus circumfusus* Marsh. † 1. — Bunde 7, M.
- * *Coccinella 14-pustulata* L. 1. — Gronsveld 7, M.
- * » *labilis* Muls. (*magnifica* Redt.) 12. — Verscheidene exemplaren bij St. Oedenrode 7, Veth.
- * *Epilachna Argus* Geoff. (*11-maculata* F.) 1. — Meerssen 6, Veth; Kerkrade 5, M.
- * *Scymnus marginalis* Rossi † 14. — Maastr M.
- * *Alexia globosa* Sturm. 1. — Rott. Sn.

NEDERLANDSCHE HALTICIDEN. ¹⁾

PODAGRICA Foudr.

- * 1. *fuscipes* F. † 1. — St. Pieter, M.
- 2. *fuscicornis* L. 8. — Niet zeldzaam.

MANTURA Steph. (*Balanomorpha* Chevr.)

- * 1. *rustica* L. — Haag 5, 4, 10. Hait., L. en E.; Gorinchem 5, E.; Utr. 6, G.
- 2. *Chrysanthemi* Koch ²⁾ 2. — Niet zeldzaam.

CREPIDODERA Chevr.

- * 1. *Salicariae* Payk 5. — Vorden 6 en Utr. 7, Gr.; Breda 5, H.; Middelb. 6, E.

1) De bewerking der Halticiden door Mr. A. F. A. Leesberg naar de monographiën van Foudras, Kutschera en Allard maakt een nieuw overzicht dezer groep noodzakelijk. De genera zijn volgens den catalogus van Gemminger en Harold overgenomen; de soortnamen eveneens met verwijzing naar den catalogus van de Marseul.

2) De in de lijst vermelde *M. obtusata* moet vervallen.

2. *transversa* Marsh. ¹⁾ 8. — Niet zeldzaam.
3. *ferruginea* Scop. 9. — Gemeen.
- * 4. *helxines* L. 24. — Zeldzaam. Amst. Smit; Bunde en Amby, M.
5. *aurata* Marsh. ²⁾ 25. — Zeer gemeen.
6. *chloris* Foudr. 26. — Gemeen. De blauwe varieteit bij Rott., Veth en Sn.
- * 7. *smaragdina* Foudr. 27. — Ellecom 7, Hait.; Breda 7, H.; Vorden 6, G.; in Holland, Sn.
8. *Modeeri* L. 29. — Gemeen.

EPITRIX Foudr.

1. *pubescens* Koch 30. — Gemeen op *Solanum*-soorten. Vianen 6, E.; Haag, L. en E.; Rott. 4, Sn.; de varieteit bij den Haag, E. en L.

HALTICA Geoff. (*Graptodera* Chevr.)

1. *Quercetorum* Foudr. ³⁾ (*Erucae* Oliv.) 1. — Gemeen op eik.
2. *ampelophaga* Guér. 4. — Ginneken, v. V.; Haag, E., L. en Hait.; Bergen op Zoom 6, E.; Arnh., Sn.; Rott., Veth.; Z.-Holl., Per.; Wolfh. 7, Sn.
- * 3. *Lythri* Aubé 6. — Verspreid. Op *Epilobium*.
4. *Tamaricis* Schr. (*Hippophaës* Aubé) 8. — Breda, H.; Rott., Sn.; Maastr., M.; Ellecom 6, Hait.
5. *oleracea* L. 11. — Gemeen.

LONGITARSUS Latr. (*Thyamis* Steph.)

- * 1. *tabidus* F. (*Verbasci* Pz.) 1. — Arnh. 5, d. R.
- * 2. *niger* Koch 4. — Haag 4, E.; St. Pieter 6, M.

1) Deze soort werd ten onrechte *Cr. impressa* F. genoemd. De laatste komt alleen in Zuid-Europa voor.

2) Deze soort, met *Cr. chloris* en *smaragdina* vermengd, was steeds voor *Haltica helxines* L. gehouden.

3) De 5 hier opgenoemde soorten waren verward onder *H. oleracea* L. en *Erucae* Oliv.

3. *atricapillus* Duft. (*melanocephalus* All.) 5. — Zeer gemeen.
- * 4. *melanocephalus* de Geer (*atriceps* Kuts.) 8. — Leid. 4, E.; Middelb. 6, E.; Haag 8, L.; Vorden 5, G.; Z.-H., Per.
- * 5. *holsaticus* L. 11. — Utr. 4, Drieb. 10 en Wassen. 5, S.; Breda, H.; Haag 9, E.
6. *atricillus* L. 21. — Niet zeldzaam.
7. *brunneus* Dfts. 25. — Gemeen in alle varieteiten.
- * 8. *flavicornis* Steph. 40. — Haag 10, L.; Rott., Sn.
9. *laevis* Dfts. 41. — Haag 8, 10, E. en L.; Breda, H.; Z.-Holl., Per.; de Steeg 8 en Rozendaal 6, E.
- * 10. *Medicaginis* All. 55. — Breda, H.; Haag, L. en E.; Gorinchem, E.; Amersfoort, Six.; Leid. 7, v. d. W.
11. *pusillus* Gyll. 29. — Gemeen.
12. *Anchusae* Payk. 64. — Gemeen.
13. *luridus* Scop. 70. — Gemeen.
- * 14. *fulgens* Foudr. 71. — Vian. 6, E.
- * 15. *piciceps* Steph. † 75. — Haag, Hait.; Amst., K.; ook de var. *Poweri* All.
- * 16. *canescens* Foudr. 79. — Haag, v. V. en v. d. W.; Z.-Holl., Per.; Warmond 7, Rits.
17. *Nasturtii* F. 80. — Verbreid.
- * 18. *suturellus* Dfts. (*thoracicus* Steph.) 83. — Breda, H.; Gorinch. 10, E.; Utr. 5, G.; Vian. 6, E.; Haag 4, 5, E. en L.
- * 19. *patrueilis* All. † 88. — Bergen op Zoom, H.
20. *Jacobeae* Waterh. (*tabidus* Ol.) 92. — Gemeen op *Senecio Jacobea*.
- * 21. *ochroleucus* Marsh. 95. — Bergen op Zoom 6, E.; Haag, v. d. W.; Utr. 5, G.
- * 22. *gracilis* Kutsch. 97. — Leiden 7, v. d. W.; Wassen. 8, Per.
23. *ater* F. (*parvulus* Payk) 103. — Zeer gemeen.
- * 24. *suturalis* Marsh. † 81. — Haag, L. en Hait.
- * 25. *Juncicola* Foudr. 74. — Haag, L. en E.

* 26. *candidula* Foudr. 30. — Valkenburg, Per. ¹⁾

APHTHONA Chevrol.

- * 1. *Cyparissiae* Koch 5. — Haag 8, Hait.; Brumm. v. V.; Maastr., M.
- * 2. *lutescens* Gyll. † 10. — Breda, H.; Utr. 6, Gr.; Goor 7, Hait.
- 3. *albinea* Foudr. ²⁾†. — Een exemplaar zonder nadere vindplaats in de collectie der Ned. Ent. Vereeniging.
- 4. *nonstriata* Goeze (*coerulea* Fourcr.), 14. — Gemeen op *Iris pseudacorus*.
- * 5. *venustula* Kutsch. (*Euphorbiae* Schrk.) 26. — Amby 8, M.; Renkum 10, G.; Huissen 4, Agh.
- * 6. *atrocoerulea* Steph. 28. — Utr. G.; Haag 10, E. en L.; Middelb. E. en La F.
- * 7. *violacea* Koch. 30. — Haag 6, E.
- 8. *hilaris* Steph. ³⁾ 36. — Zeer gemeen.

PHYLLOTRETA Foudr.

- 1. *nodicornis* Marsh. ⁴⁾ (*antennata* Koch) 1. — Breda 6, H. en L. op *Silene*.
- 2. *aterrima* Koch (*atra* Payk) 4. — Gemeen.
- 3. *Cruciferae* Goez. (*obscura* Ill.) 5. — Zeer gemeen.
- 4. *diademata* Foudr. 7. — Renkum, Wtt.; Haag 4, 5, 8, E. en L.; Ellecom, Hait.
- 5. *nigripes* F. (*Lepidii* Koch) 10. — Niet zeldzaam.
- * 6. *melaena* Ill. 12. — Middelb. 6, E. en L.
- 7. *ochripes* Curt. 16. — Gemeen.
- 8. *sinuata* Steph. 17. — Holl. Wtt.; Haag, E., L. en Hait.;

1) De drie laatstgenoemde soorten zijn als zoodanig door den heer E. Allard gedetermineerd. De juistheid der 2de soort is door mij nog niet met zekerheid aangenomen, tevens betwijfel ik de opgave door dien heer van twee exemplaren van *L. patruelis* door de heeren Leesberg en Haitink bij den Haag gevangen, die te veel van het door den heer Heylaerts bij Bergen op Zoom gevangen exemplaar afwijken.

2) Was ten onrechte gebracht tot het genus *Longitarsus* door Foudras. Ik betwijfel echter deze determinatie van den heer E. Allard.

3) Deze soort werd ten onrechte genoemd *A. Euphorbiae*.

4) Ten onrechte werd deze soort als gemeen opgegeven; lees daarvoor *Th. cruciferae* Goez.

Vian. 6, E.; Ellecom, Hait.; Z.-Holl., Per.;
Bergen op Zoom 6, E.

9. *nemorum* L. ¹⁾ 19. — Breda, H.; Oud-Vroenh., M.;
Haag, E. en L.; Z.-Holl., Per.; Vian. 6, E.
- * 10. *Vittula* Redt. 20. — Haag 10, E. en Hait.
11. *undulata* Kutsch. 21. — Zeer gemeen.
12. *flexuosa* Ill. 22. — Breda, H. (in *quisquiliis*); Leid.
v. V.; var. *tetrastigma* Comolli, Haeren, M.;
Holl., v. V.; Vian. 6, E.; Haag, L.; Rott. 4, Sn.
13. *Exclamationis* Thnb. (*Brassicae* F.). — Breda, H.; Hilvers.
7, E.; Utr., S.; Haag L. en E.

CHAETOCNEMA Steph. (*Plectroscelis* Redt.)

1. *concinna* Marsh. (*dentipes* Hoffm.) 6. — Zeer gemeen.
- * 2. *Mannerheimi* Gyll. 15. — Haag 6, L; St. Pieter, M.;
Rott. 5, Veth.
3. *aridula* Gyll. 16. — Niet zeldzaam.
- * 4. *confusa* Bohm. (*arida* Foudr.) 17. — Haag, E., L. en Hait.
- * 5. *Sahlbergi* Gyll. † 21. — Amst., K.; Haarl. 9, G.
6. *hortensis* Fourcr. (*aridella* Payk.) — Zeer gemeen.

APTEROPEDA Chevr.

- * 1. *orbiculata* Marsh. (*ciliata* Oliv.) 1. — N.-Brab., Sn.;
Breda 10, H. op *Medicago sativa*.

SPHAERODERMA Steph.

1. *Cardui* Gyll. 1. — Gemeen.
2. *testacea* F. 2. — Niet zeldzaam.

DIBOLIA Latr.

1. *Cynoglossi* Koch † 10. — Eenmaal gemeen op de duinen
bij den Haag, v. V.
- * 2. *occultans* Koch 13. — Breda, H.; Haag 4, L. en E.

1) Onder deze soort, die niet gemeen is, werden gerekend *Th. sinuata*, *ochripes*
en *undulata*.

PSYLLIODES Latr.

1. *Chrysocephala* L. — Gemeen. Op koolzaad, L.; var. *nigricollis* Marsh. 1, Haag, E., L. en Hait.; Rott. 9, Sn.; Arnh. 6, d. R.; Utr. S. en G.; Steeg 8, Sn.; Z.-Holl. Per.
2. *Rapae* Ill. (*Napi* Koch 7.) — Gemeen.
- * 3. *cuprea* Koch 14. — Breda 8 en Haag 6, L.; Ellec. 6, Hait.; Arnh. 5, d. R.
- * 4. *instabilis* Foudr. 19. — Arnh. 6, d. R.; Haag 6, L.
- * 5. *attenuata* Koch 21. — Bommelerwaard 5 op hop, Sn.; St. Pieter, M.
- * 6. *nucea* Ill. 22. — Haag, 5, 6, L.; de Steeg, E.
7. *marcida* Ill. 24. — Gemeen langs de zeekust.
8. *affinis* Payk 25. — Zeer gemeen.
- * 9. *Allardi* Bach (*rufilabris* All.) 28. — Scheven., E.
10. *Dulcamarae* Koch 34. — Vian. 6, E.; Rott. 5, Sn.
- * 11. *chalconera* Ill. 35. — Vian. 6, E.; Utr. 10, Gr.; Z.-Holl., Per.; Amst., K.; Haag, Hait.; Huissen, Agh.; Heemstede, v. V.
12. *picina* Marsh. 38. — Velzen 6, E.; St. Pieter, M.; Holl., Blume.
- * 13. *luteola* Müll. 39. — Steeg 8, E.; Breda 12, H.
14. *cucullata* Ill. 44. — Noordw., v. V.; Renkum en Vorden 7, Gr.; Haag 8, v. V. en Hait.

SOORTEN WELKE UIT MIJNE LIJST MOETEN
VERVALLEN.

Dyschirius apicalis Puts. wordt *aeneus* Dej.

Philonthus aerosus Kies. wordt *atratus* Grav.

» *corvinus* Er. wordt *immundus* Gyll.

Stilicus affinis Er. is eene var. van *orbiculatus* Payk.

Anthobium scutellare Er. synoniem met *torquatum* Kr.) volgens den

Proteinus brevicollis Er. id. met *ovalis* Steph.) heer Fauvel.

Corticaria piligera Manh. is syn. met *pubescens* Ill.

Monotoma spinicollis Aubé wordt *picipes* Hrbst.

Anaspis assimilis Voll. is volgens den heer Emery te Napels eene var. van *A. frontalis* L.

» *testacea* Voll., als voren van *A. maculata* Geoff.

Otiorhynchus fuscipes Ol. wordt *tenebricosus* Hrbst.; beide soorten zijn zeer verwant en wellicht varieteiten.

Apion subulatum Kirby moet zijn *opeticum* Bach.

» *ruficrus* Germ. (var. van *Trifolii*) is nog niet aangetroffen.

» *filirostre* Kirby was slechts een afgewreven exemplaar van *simile* Kirby.

In mijne Lijst der in Nederland voorkomende Schildvleugelige insecten zijn vermeld 2145 soorten.

Af: de daaronder begrepen Halticiden. . . . 53 »

Blijft 2092 »

In dit Supplement zijn opgenomen. . . . 229 »

en bij de nieuwe rangschikking der Halticiden

zijn deze gebracht tot 90 »

Te zamen 2411 »

terwijl daarentegen uit de lijst moeten

wegvallen. 14 »

Blijft alzoo voor de gezamenlijke soorten van Coleoptera, die als bewoners van ons

land bekend zijn, een getal van 2397 »

Ten overvloede wensch ik hieronder nog aan te duiden de soorten welke in het buitenland nabij de Nederlandsche grenzen zijn aangetroffen, in zooverre het mogelijk was eenige opgave daarvan te verkrijgen.

Calosoma sericeum F.

» *reticulatum* F.

Cychrus attenuatus F.

Cymindis Vaporariorum L.

Chlaenius agrorum Ol.

» *holosericeus* F.

Badister peltatus Panz.

Feronia parumpunctata Germ.

Amara sylvicola Zimm.

Hydrophilus aterrimus Esch.

Aleochara rufitarsis Heer.

Homalota aquatica Thoms.

Homalota laticeps Thoms.	Quedius laevigatus Gyll.
» aegra Heer.	» umbrinus Er.
» gemina Er.	» auricomus Kies.
» angusticollis Thoms.	Staphylinus latebricola Grav.
» Aubei Bris.	» fossor Scop.
» indubia Sharp.	Ocypus fuscatus Grav.
» subaenea Sharp.	Philonthus nitidulus Grav.
» ignobilis Sharp.	» rufimanus Er.
» dilaticornis Kr.	» rubripennis Kies.
» inquinula Er.	» astutus Er.
» marcida Er.	Erichsonius prolixus Er.
» laevana Muls.	Leptacinus parumpunctatus
» pulchra Kr.	Gyll.
Placusa pumilio Grav.	Baptolinus pilicornis Payk.
Oligota granaria Er.	Lathrobium dilutum Er.
» flavicornis Lac.	» angusticolle Lac.
Encephalus complicans Wstw.	Dolicaon biguttulus Lac.
Gyrophæna laevipennis Kr.	Lithocharis castanea Grav.
» minima Er.	» diluta Er.
» strictula Er.	» picea Kr.
» manca Er.	Stenus argentellus Thoms.
» Boleti L.	» incanus Er.
» laevicollis Kr.	» sylvester Er.
Myllaena brevicornis Math.	» fossulatus Er.
» elongata Math.	Oxyporus maxillosus F.
Gymnusa brevicollis Payk.	Bledius pallipes Grav.
» variegata Kies.	» erraticus Er.
Trichophya pilicornis Gyll.	» rufipennis Er.
Hypocyptus discoideus Er.	Platystethus capito Heer
» seminulum Er.	Oxytelus fulvipes Er.
Lamprinus saginatus Grav.	Trogophloeus exiguus Er.
» haematopterus Kr.	Anthophagus testaceus Grav.
Tachinus rufipennis Gyll.	Lesteva pubescens Manh.
» scapularis Steph.	Olophrum fuscum Grav.
» elongatus Gyll.	» assimile Payk.
Tachyporus transversalis Grav.	Lathrimaeum melanocephalum Ill.
Cenurus bipunctatus Grav.	Acidota cruentata Manh.
Bolitobius pulchellus Man.	Arpedium quadrum Grav.
» trinotatus Er.	Philorinum sordidum Steph.
Megacronus striatus Ol.	Omalium minimum Er.
» inclinans Grav.	» brunneum Payk.
» cernuus Grav.	» pygmaeum Payk.
» rufus Er.	Anthobium Marshami Fauv.
Mycetoporus lucidus Er.	» rectangulum Fauv.
» angularis Muls.	» longipenne Er.
» nanus Er.	» Primulae Steph.
Acylophorus glabricollis Grav.	Prognatha quadricornis Kirby.
Euryporus picipes Payk.	

Scydmaenus angulatus M. et K.	Anobium pertinax L.
Agathidium nigripenne Kug.	Oligomerus brunneus Ol.
Hister succicola Thoms.	Salpingus ater Payk.
Carpophilus sexpustulatus F.	Otiorhynchus ligneus Ol.
Dermestes bicolor F.	Omius mollicornis Ahr.
Pomatinus substriatus Mull.	Apion Limonii Kirby.
Aphodius arenarius Ol.	Platyrhinus latirostris F.
Odontaeus mobilicornis F.	Tropideres niveirostris F.
Homalopia ruricola F.	Sphindus dubius Gyll.
Cryptohypnus minutissimus	Cryptocephalus flavipes F.
Germ.	Crepidodera ventralis Ill. ¹⁾
Limonius Bructeri F.	Engis sanguinicollis F.
Laricobius Erichsoni Ros.	Halysia 12-guttata Poda.

Entomologen welke mij hunne bijdragen voor de Nederl. Fauna toezonden en niet in mijne Lijst zijn aangeduid:

Agh.	Pater Aghina, thans te Schiedam.
Dreess. . .	de heer W. H. Dreessens te St. Odiliënberg (Ned. Limburg).
Fokk. . . . » »	A. J. F. Fokker te Zierikzee.
G v. W. . . » »	H. L. Gerth van Wijk te Middelburg.
v. d. Hon. . . » »	J. van den Honert te Amsterdam.
La F. . . . » »	N. La Fontijn te Vlissingen.
Seipg. . . . » »	Emile Seipgens te Zutfen.
Sw. » »	K. N. Swierstra te Amsterdam.
v. Tuin . . » »	H. van Tuinen Hz. te Zwolle.
Veth. . . . » »	H. J. Veth te Rotterdam.
Weytl. . . . » »	A. J. Weytlandt te Noordwijk.

(Voer de overige verkortingen zie mijne Lijst.)

1) De overige Halticiden die hier te lande waarschijnlijk voorkomen zullen spoedig in dit Tijdschrift worden opgenomen.



Everts, Edouard Jacques Guillaume. 1877. "Supplement op de lijst der in Nederland voorkomende schildvleugelige insecten (Coleoptera)." *Tijdschrift voor entomologie* 20, 168–185.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/55006>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/56531>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.