

PRODROMUS ORNITHOLOGIAE PAPUASIAE ET MOLUCCARUM

AUCTORE

THOMA SALVADORIO

IX.

MENURIDAE — CERTHIIDAE — NECTARINIIDAE — DICAEDAE — MELIPHAGIDAE.

Fam. MENURIDAE.

Menuridarum familia in Papuasiam speciem unam tantum generis *Orthonycis* praebet, quae *O. temminckii* Novae Hollandiae valde affinis est. Beccarius Bruijni venatores illius speciei sex specimina collegerunt.

1. *Orthonyx novae guineae*, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXIX, p. 74, 83 (1874).

Hab. in Papuasiam — Nova Guinea (*von Rosenberg*), Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*) Specim. 6

Fam. CERTHIIDAE.

Certhiidarum familiae duo genera, *Climacteris* et *Sittella*, quae etiam in Nova Hollandia vivunt, in Papuasiam inveniuntur; unumquodque genus speciem unam tantum, aliis speciebus in Nova Hollandia viventibus affinem, continet. D'Albertisius, speciem unam, *C. placentem*, a Sclaterio descriptam, detexit; ipse et Beccarius quatuor specimina collegerunt.

1. **Climacteris placens**, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 693.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*D'Albertis, Beccari*)
Specim. 4.

2. **Sittella papuensis** (Schleg.), Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 47
(1871).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Montibus peninsulae septentrionalis
(*Mus. Lugd.*), Monte Arfak (*Bruijn*) Specim. 0.

Fam. NECTARINIIDAE.

Septemdecim Nectariniidarum familiae species in Papuasias et in Moluccis reperiuntur, quae ad duo genera pertinent, quorum unum, *Cyrtostomus* appellatum, in Indica quoque regione invenitur, alterum, *Hermotimia* dictum, subregionis Austro-mala-yensis dumtaxat proprium est; species una, *C. frenatus*, in Moluccis septentrionalibus et in Papuasias non solum, sed etiam in Celebes et in Nova Hollandia vivit, dum reliquae plagis plus minusve latis continentur ⁽¹⁾.

Rerum naturalium investigatores, quos saepe memoravi, specimina centumnonagintaseptem, ad decem species pertinentia, collegerunt; quarum tres a me, una a Shelleyo descriptae fuerunt; praeterea duas species novas, unam a Brownio, alteram in insula D'Urvillei a Bruijni venatoribus collectas, sed ad Museum Civicum Januense non missas, ipse descripsi ⁽²⁾.

1. **Hermotimia theresia**, Salvad., Atti R. Ac. Sc. Tor. X, p. 208, 214, tab. f. 1 (1874).

Hab. in Papuasias — insulis Kei (*Beccari*) Specim. 5.

(¹) Quid *Nectarinia sordida*, Rosenb., Reist. naar Geelwinkb. p. 7 (1875) ex Ternate? (descr. nulla).

(²) Hae sunt species novae:

1. **Hermotimia theresia**, Salvad. (*Beccari*).
2. » **cornelia**, Salvad. (*Bruijn*).
3. » **chlorocephala**, Salvad. (*Beccari*).
4. » **corinna**, Salvad. (*Brown*).
5. » **nigriscapularis**, Salvad. (*Beccari*).
6. » **salvadorii** (Shelley) (*Bruijn*).

2. **Hermotimia maforensis** (Meyer), Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 123 (1874).

Hab. in Papuasias — Mafoor (Meyer) Specim. 0.

3. **Hermotimia mysorensis** (Meyer), Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 124 (1874).

Hab. in Papuasias — Mysori (Meyer, Beccari) Specim. 10.

4. **Hermotimia jobiensis** (Meyer), Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 124 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (Meyer) Specim. 0.

5. **Hermotimia aspasia** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, p. 676, pl. 30, f. 4 (1826-1828).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (Lesson, Beccari, Bruijn), Andai (Meyer, Bruijn), Lobo (S. Müller), Sorong (D'Albertis, Beccari, Bruijn); Salvatti (Bruijn); ? Waigiou (Wallace); Koffiao (Beccari); Mysol (Wallace); Nova Guinea meridionali, ad flumen Fly (D'Albertis), prope Naiabui (D'Albertis), ad flumen Laloki (Morton). Specim. 37.

6. **Hermotimia cornelia**, Salvad., Atti R. Ac. Sc. Tor. XIII, p. 319 (1878).

Hab. in Papuasias — ins. Tarawai, seu ins. D'Urvillei, prope litus septentrionale Novae Guineae (Bruijn) Specim. 0.

7. **Hermotimia chlorocephala** (Salvad.), Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 78 (1874).

Hab. in Papuasias — ins. Aru (Wallace, Beccari) Specim. 1.

8. **Hermotimia corinna**, Salvad., Atti R. Ac. Sc. Tor. XIII, p. 522 (1878).

Hab. in Papuasias — ins. Ducis York (Brown, Hübner). Specim. 0.

9. **Hermotimia aspasioides** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1860, p. 348.

Hab. in Moluccis — Amboina (S. Müller, Wallace, Beccari, Challenger); Ceram (von Rosenberg); Goram (von Rosenberg, D'Albertis) ⁽¹⁾; Matabello (Mus. Lugd.); ? Banda (S. Müller). Specim. 4.

⁽¹⁾ *Chalcostetha goramensis*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 85 (1874).

10. **Hermotimia proserpina** (Wall.), P. Z. S. 1863, p. 32 (descr. errata).

Hab. in Moluccis — Buru (*Wallace*) Specim. 0.

11. **Hermotimia nigriscapularis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 937 (1875).

Hab. in Papuasie — Miosnom (*Beccari*) Specim. 12.

12. **Hermotimia salvadorii** (Shelley), Mon. Nectar. p. 105, pl. 35, f. 2 (1877).

Hab. in Papuasie — Jobi, prope Anus (*Bruijn*) Specim. 2.

13. **Hermotimia auriceps** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1860, p. 348.

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Kaioa (*Wallace*); Ternate (*Wallace*, *Beccari*, *Bruijn*, *Challenger*); Halmahera (*Wallace*); Guebeh (*Bernstein*); Tifore (*Bruijn*); Obi (*Bernstein*); ? Morty (*Bernstein*) — Ins. Sulla (*Wallace*, *Bernstein*) Specim. 12.

14. **Hermotimia morotensis** (Shelley), Mon. Nectar. p. 101, pl. 34, f. 2 (1877) ⁽¹⁾.

Hab. in Moluccis — Morty (*Wallace*) Specim. 0.

15. **Cyrtostomus zenobia** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, p. 679, pl. 30, f. 3 (1826-1828).

Hab. in Moluccis — Amboina (*Lesson*, *S. Müller*, *Wallace*, *Beccari*); Ceram (*Wallace*); Ceram-laut (*Beccari*); Buru (*Wallace*, *Bruijn*); in Papuasie — ins. Kei (*Wallace*, *Beccari*) Specim. 27.

16. **Cyrtostomus frenatus** (S. Müller), Verhandl. Nat. Gesch. Overz. Bez. Land- en Volkenk. p. 173 (nota) (1843).

Hab. in Celebes (*Forsten*, *Wallace*, *Beccari*); ins. Sulla (*Wallace*); in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Kaioa (*Wallace*); Ternate (*Wallace*, *Beccari*); in Papuasie — Waigiou (*Beccari*); Batanta (*Beccari*); Salvatti (*Bruijn*); Mysol (*Wallace*); Nova Guinea, Lobo (*S. Müller*), Sorong (*D'Albertis*, *Bruijn*), prope sinum Segaar (*Gazelle*), Dorei (*Beccari*, *Bruijn*), Mansinam (*Beccari*), ad sinum Humboldti (*Beccari*); Krudu (*Beccari*); Jobi (*Meyer*, *Beccari*); Miosnom (*Beccari*); Miori (*Beccari*); ins. Aru (*Wallace*, *Beccari*); Nova Guinea meridionali, ad flumen Fly (*D'Albertis*), ad flumen Kataw (*D'Albertis*), Naiabui (*D'Albertis*), prope Portum Moeresby (*Stone*); ins. Yule

(¹) Species non satis cognita, forsan ab *H. auricipiti* revera non diversa.

(*D'Albertis*); Nova Britannia (*Layard*); Nova Hibernia (*Lesson*, *Sulphur* ⁽¹⁾, *Brown*); ins. Ducis York (*Hübner*, *Brown*); ins. Admiralitatis (*Challenger*); ins. Salomonis (*Cockerell*) — ins. Freti Torresi (*Macgillivray*); Nova Hollandia septentrionali, ad Caput York (*Gould*) ⁽²⁾, prope sinum Rockingham (*Ramsay*), prope Portum Denison (*Ramsay*) . . . Specim. 17.

17. **Cyrtostomus melanocephalus** (*Ramsay*), *Nature*, XX, 1879, p. 125 ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — Ins. Salomonis (*Cockerell*, *Layard*). Specim. 0.

Fam. DICAETIDAE.

Ex Dicaetidarum familia hactenus tres et viginti species diagnosuntur ad Papuasiam et Moluccas pertinentes. Rerum naturalium cultores exploratoresque toties commemorati sex supra centum exemplaria collegerunt ad duo de viginti species attententia, quarum septem a me, et duae a me simul et a *D'Albertis* fuere descriptae; insuper unam, *Melanocharis unicolor*, quam in Lugduni Batavorum Museo inveneram, praeterea *Dicaetum layardorum* hoc in prodromo et *Oreocharis stictoptera*, quam postea *Pari arfaki* foeminam nondum editam esse cognovi, ipse descripsi ⁽⁴⁾. Haec de genere *Oreocharis* est unica

⁽¹⁾ *Nectarinia flavigaster*, Gould, P. Z. S. 1843, p. 104 (♀).

⁽²⁾ *Nectarinia australis*, Gould, P. Z. S. 1850, p. 201.

⁽³⁾ *Cinnyris dubia*, Ramsay (nec Bechst. 1812), Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV. p. 83 (1879).

Cinnyris melanocephalus, Ramsay, *Nature*, 1879, p. 125.

Hermotimia melanocephala, Layard, *Ibis*, 1880, p. 306.

Species haec, cujus specimen unicum non bene adultum, a clarissimo Tristramo missum, inspexi, mihi videtur ad genus *Cyrtostomus* pertinere.

⁽⁴⁾ Hae sunt species novae :

1. **Dicaetum layardorum**, Salvad. (*Layard*).
2. » **maforense**, Salvad. (*Beccari*).
3. » **mysoriense**, Salvad. (*Beccari*).
4. » **jobiense**, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
5. » **rubrigulare**, D'Alb. et Salvad. (*D'Albertis*).
6. » **albopunctatum**, D'Alb. et Salvad. (*D'Albertis*).
7. » **keyense**, Salvad. (*Beccari*).
8. **Melanocharis unicolor**, Salvad. (*Mus. Lugd.*).
9. » **chloroptera**, Salvad. (*Beccari*).
10. **Urocharis longicauda** (Salvad.) (*Beccari*, *Bruijn*).
11. **Rhamphocharis crassirostris**, Salvad. (*Beccari*).

species, quae cognoscatur, cujus locum in systemate adhuc incertum est; haec procul dubio ad Paridarum familiam non pertinet, sed num ad illam Dicaeidarum referenda sit, incertus sum. Genera *Melanocharis*, *Urocharis*, *Pristorhamphus*, *Rhamphocharis* et *Oreocharis* in Nova Guinea tantum inveniuntur; genus vero *Dicaeum*, praeterquam quod in Papuasias et Moluccis, in Nova etiam Hollandia et in regione Indica degit.

1. ***Dicaeum vulneratum***, Wall., P. Z. S. 1863, p. 32 (nota).

Hab. in Moluccis — Ceram (*Wallace*); Amboina (*Beccari*, *Hoedt*, *von Rosenberg*); Monawolka (*von Rosenberg*); ? Goram (*von Rosenberg*) Specim. 3.

2. ***Dicaeum layardorum***, Salvad., MS. (1).

Hab. in Papuasias — Nova Britannia (*Layard*) . . . Specim. 0.

3. ***Dicaeum schistaceiceps***, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 349.

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Halmahera (*Wallace*) Specim. 0.

4. ***Dicaeum erythrothorax***, Less., Voy. Coq. Zool. I, p. 672, pl. 30, f. 1, 2 (1826-1828).

Hab. in Moluccis — Buru (*Lesson*, *Wallace*, *Bruijn*) . . . Specim. 3.

5. ***Dicaeum pectorale***, Müller et Schleg., Verh. Land- en Volkenk. p. 162 (nota) (1839-1844).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Lobo (*S. Müller*), Sorong (*Bruijn*), Ramoi (*Beccari*), Dorei-Hum (*Beccari*), Dorei (*Meyer*, *Bruijn*), Andai (*Bruijn*), Monte Arfak (*Bruijn*, *Beccari*), Passim (*Meyer*); Mysol (*Wallace*); Salvatti (*Wallace*, *Bruijn*); Batanta (*Bruijn*); Waigiou (*Wallace*) . . . Specim. 20.

6. ***Dicaeum maforense***, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 944 (1875) (2).

Hab. in Papuasias — Mafor (*Beccari*, *Meyer*) . . . Specim. 1.

7. ***Dicaeum mysoriense***, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 945 (1875) (3).

Hab. in Papuasias — Mysori (*Beccari*, *Meyer*) . . . Specim. 10.

(1) *Dicaeum* sp., Layard, Ibis, 1880, p. 308.

Dicaeum D. vulnerato, Wall., ut videtur, affine, sed lateribus olivaceo-flavidis distinguendum.

(2) (3) *Dicaeum geelwinkianum*, part., Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 120 (1874).

8. **Dicaeum jobiense**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 945 (1875) ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasia — Jobi (*Beccari, Bruijn, Meyer*) . . . Specim. 2.

9. **Dicaeum rubrocoronatum**, Sharpe, Nature, 17 Aug. 1876, p. 339.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, prope Portum Moresby (*Macleay, Broadbent et Petterd, Stone*), prope Naiabui (*D'Albertis*); ins. Yule (*D'Albertis*) . . . Specim. 10.

10. **Dicaeum rubrigulare**, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 74 (1879).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali, ad flumen Fly (*D'Albertis*) . . . Specim. 4.

11. **Dicaeum albopunctatum**, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 75 (1879).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali, ad flumen Kataw (*D'Albertis*) . . . Specim. 1.

12. **Dicaeum ignicolle**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 173.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru (*Wallace, Beccari*) . . . Specim. 3.

13. **Dicaeum keiense**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 314 (1874).

Hab. in Papuasia — Ins. Kei (*Beccari, Mus. Lugd.*) . . . Specim. 2.

14. **Dicaeum eximium**, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 102, pl. 14, f. 2.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia (*Brown*) . . . Specim. 0.

15. **Dicaeum aeneum**, Pucher. et Jacq., Voy. Pole Sud, Zool. III, Ois. p. 37 (1853).

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, ins. Sancti Georgi (*Hombron et Jacquinet*), Gaudalcanar (*Cockerell*), Makira (*Richards*) . . . Specim. 0.

16. **Melanocharis unicolor**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 333 (1878).

⁽¹⁾ *Dicaeum geelwinkianum*, part., Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 120 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (von Rosenberg, ? Beccari); ? Miosnom (Beccari) ⁽¹⁾ Specim. 2.

17. **Melanocharis bicolor**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 276 (1878) ⁽²⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea meridionali orientali, ad flumen Goldie (Broadbent) Specim. 0.

18. **Melanocharis nigra** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, p. 673 (1828).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea septentrionali, Dorei (Lesson, Meyer, Bruijn), Andai (Meyer, Bruijn, Beccari), Mansema (Monte Arfak) (Bruijn), Amberbaki (Laglaize), Wa Samson (Beccari), Sorong (Bruijn), Lobo (S. Müller), ? Passim (Meyer), ? Rubi (Meyer); Waigiou (Wallace); Mysol (Wallace) Specim. 13.

19. **Melanocharis chloroptera**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 977 (1875).

Hab. in Papuasias — ins. Aru (Beccari, Wallace); in Nova Guinea meridionali, ad flumen Fly (D'Albertis) Specim. 13.

20. **Urocharis** ⁽³⁾ **longicauda** (Salvad.), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 942 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (D'Albertis, Beccari, Bruijn) Specim. 3.

21. **Pristorhamphus versteri**, Finsch, P. Z. S. 1875, p. 641 (♀).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (Finsch, Bruijn, Beccari), Karons (Laglaize) Specim. 5.

22. **Rhamphocharis crassirostris**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 943 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (Beccari). Specim. 10.

⁽¹⁾ Foeminae duae generis *Melanocharis*, in Jobi et in Miosnom a Beccario collectae, foeminis *M. nigrae* simillimae sunt, sed forsitan ad *M. unicolorem* pertinent.

⁽²⁾ Species non satis cognita.

⁽³⁾ Novum genus *Urocharis*, inter genera *Melanocharim* et *Pristorhamphum* intercedens, differt ab illo ob rostrum latius et brevius, et ob caudam longiorem, ab altero ob caudam non graduatam, sed fere aequalem.

23. *Oreocharis arfaki* (Meyer), Sitz. Isis Dresd. 1, p. 24 1875 ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Mus. Lugd.*) Specim. 1.

Fam. MELIPHAGIDAE.

In Papuasias et Moluccis hujus familiae species octoginta-novem inveniuntur. Beccarius, D'Albertisius Bruijnique venatores sexcenta et duodecim Meliphagidarum familiae ad quinquaginta quatuor species pertinentia exemplaria collegerunt, quarum una et viginti prorsus novae a me, vel a Sclaterio, descriptae sunt; praeterea tredecim alias species, quas ineditas in Britannico et Lugduni Batavorum Museis, seu a Meyero collectas, reperi, ipse descripsi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Parus* (?) *Arfaki*, Meyer, l. c. (♂).

Oreocharis stictoptera, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 939 (1875) (♀).

Chloromyias Laglaizei, Oust., Bull. Ass. Sc. de France, 1880, p. 173, (♀).

Species incertae sedis, sed ad Paridarum familiam certe non pertinens.

⁽²⁾ Hae sunt species novae:

1. *Myzomela adolphinae*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
2. » *infuscata*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
3. » *rubroincta*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
4. *Glyciphila nisoria*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
5. *Glycichaera fallax*, Salvad. (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*).
6. » *poliocephala*, Salvad. (*D'Albertis*).
7. *Oedistoma pygmaeum*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
8. *Melilestes iliolophus*, Salvad. (*Beccari*).
9. » *affinis*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
10. *Melipotes gymnops*, Sclat. (*D'Albertis*).
11. *Melidectes torquatus*, Sclat. (*D'Albertis*).
12. *Stigmatops chloris*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
13. » *squamata*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
14. *Ptilotis flavirictus*, Salvad. (*D'Albertis*).
15. » *albonotata*, Salvad. (*D'Albertis*).
16. » *montana*, Salvad. (*Bruijn, Beccari*).
17. » *subfrenata*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
18. » *erythropleura*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
19. » *cinerea*, Sclat. (*D'Albertis*).
20. » *ixoides*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
21. *Pycnopygius stictocephalus* (Salvad.) (*D'Albertis*).
22. *Xanthotis fusciventris*, Salvad. (*Beccari, Bruijn*).
23. » *meyeri*, Salvad. (*Meyer*).

Tantummodo in Papuasiam vitam vivunt genera *Glycichaera*, *Oedistoma*, *Melilestes*, *Melipotes*, *Melidectes*, *Melirrhophetes*, *Meliarchus*, *Pycnopygius* et *Euthyrhynchus*, genus *Melithograis* in Moluccis septentrionalibus; in tota regione australiana diffusa sunt genera *Myzomela* et *Glyciphila*; Papuasiae et Novae Hollandiae communia genera *Conopophila*, *Xanthotis*, *Philemonopsis*, *Philemon*, *Tropidorhynchus* et *Melithreptus*; denique regionibus Australiana, Indica et Aethiopicae commune est genus *Zosterops*.

1. **Myzomela nigrata**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, pp. 173, 190.

Hab. in Papuasiam — Ins. Aru (*Wallace*, *Beccari*, *Challenger*); Nova Guinea, ad Flumen Fly (*D'Albertis*), ad Flumen Goldie (*Goldie*), Dorei (*Wallace*), Rubi (*Meyer*); Jobi (*Bruijn*, *Beccari*) ⁽¹⁾; Miosnom (*Beccari*) ⁽¹⁾
Specim. 19.

2. **Myzomela pammelaena**, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 553, n. 6.

Hab. in Papuasiam — Ins. Admiralitatis (*Challenger*); ? ins. Salomonis (*Richards*) Specim. 0.

3. **Myzomela forbesi**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, (Dic. 1879) ⁽²⁾.

Hab. in Papuasiam — Ins. Woodlark dicta (*Ramsay*). Specim. 0.

4. **Myzomela rosenbergii**, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 38 (1871).

Hab. in Papuasiam — Nova Guinea, Peninsula septentrionali (*von Ro-*

- 24. **Philemonopsis meyeri** (Salvad.) (*Meyer*).
- 25. **Zosterops fuscifrons**, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
- 26. » *hypoleuca*, Salvad. (*Mus. Brit.*)
- 27. » *novae guineae*, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
- 28. » *aureigula*, Salvad. (*Meyer*).
- 29. » *chrysolaeama*, Salvad. (*Beccari*).
- 30. » *frontalis*, Salvad. (*Mus. Lugd. Batav.*).
- 31. » *burnensis*, Salvad. (*Mus. Brit.*).
- 32. » *fuscicapilla*, Salvad. (*Beccari*, *Bruijn*).
- 33. » *brunneicauda*, Salvad. (*Beccari*).
- 34. » *uropygialis*, Salvad. (*Beccari*).

⁽¹⁾ *Myzomela pluto*, Salvad., in Forbes, P. Z. S. 1879, p. 266.

⁽²⁾ Species mihi non satis cognita, forsitan a *M. nigrata* non diversa. Specimen uti mas descriptum mihi videtur esse foemina *M. nigratae*.

senberg), Montibus Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*), Nova Guinea meridionali, prope Montem Epa (*D'Albertis*) Specim. 40.

5. **Myzomela cruentata**, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien LXX, p. 3 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Bruijn*)
Specim. 1.

6. **Myzomela coccinea**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 106 (1878).

Hab. in Papuasias — Ins. ducis York (*Ramsay*) Specim. 0.

7. **Myzomela erythrina**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 107 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Hibernia (*Ramsay, Brown*) Specim. 0.

8. **Myzomela sclateri**, Forbes, P. Z. S. 1879, p. 265, pl. 25, f. 2.

Hab. in Papuasias — Ins. Palakuru, prope Novam Britanniam (*Brown*)
Specim. 0.

9. **Myzomela lafargei**, Pucher. et Jacq., Voy. Pole Sud, Zool. III, Ois. p. 98 (1853).

Hab. in Papuasias — Ins. Salomonis (*Hombon et Jacquinet*) Specim. 0.

10. **Myzomela boiei**, S. Müll., Verh. Land- en Volkenk. p. 172 (1839-1844).

Hab. in Moluccis — Banda (*S. Müller, Wallace, Challenger*). Specim. 0.

11. **Myzomela adolphinae**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 946 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari, Bruijn*)
Specim. 4.

12. **Myzomela erythrocephala**, Gould, P. Z. S. 1839, p. 144.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gilbert, Gould, Ramsay*); ins. freti Torresi (*G. R. Gray*); in Papuasias — Nova Guinea meridionali, prope sinum Hall (*D'Albertis*), ad flumen Kataw (*Chevert*); ins. Yarru (*D'Albertis*) Specim. 2.

13. **Myzomela infuscata**, Salvad. in Forbes, P. Z. S. 1879, p. 263 ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Ins. Aru (*Wallace, von Rosenberg*). Specim. 0.

14. **Myzomela eques** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, p. 678, pl. 31, f. 1 (1826-1828).

Hab. in Papuasias — Waigiou (*Lesson, Wallace, Bernstein*); Salvatti (*von Rosenberg, Bruijn*); Mysol (*Wallace, Hoedt*); Nova Guinea (*Lesson, Wallace, Meyer*), Sorong (*Bernstein*), Wa Samson (*Beccari*), Rubi (*Meyer*), Passim (*Meyer*) Specim. 11.

15. **Myzomela obscura**, Gould, P. Z. S. 1842, p. 136.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gilbert, Gould, Masters, Ramsay*); in Papuasias — Nova Guinea, ad flumen Laloki (*Ramsay*), prope Naiabui (*D'Albertis*), ad flumen Kataw (*Chevert*), ins. Yarru *D'Albertis*, Utanata (*S. Müller*), Seleh (*Bernstein*); Mysol (*von Rosenberg*); ins. Aru (*von Rosenberg*). Specim. 2.

16. **Myzomela cineracea**, Sclat., P. Z. S. 1879, pl. 448, pl. 37, f. 1.

Hab. in Papuasias — Nova Britannia (*Brown*) Specim. 0.

17. **Myzomela simplex**, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 349.

Hab. in Moluccis — Batcian (*Wallace*); Halmahera (*Bernstein*); Ternate (? *von Rosenberg* ⁽²⁾), *Bruijn, Mus. Turati*); Tidore (*von Rosenberg, Bernstein*); Dammar (*Bernstein*); ? Morty (*Bernstein*) Specim. 0.

18. **Myzomela rubro-tincta**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 334 (1878).

Hab. in Moluccis — Obi (*Bernstein*) Specim. 0.

19. **Myzomela rubro-brunnea**, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 203 (1874).

Hab. in Papuasias — Mysori (*Meyer, Beccari*) Specim. 4.

20. **Glyciphila modesta**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 174.

Hab. in Papuasias — ins. Aru (*Wallace, Beccari*); Nova Guinea, ad flumen Fly (*D'Albertis*), prope Portum Moeresby (*Morton*), Warbusi (*Bec-*

⁽¹⁾ Species non satis cognita.

⁽²⁾ ? *Nectarinia sordida*, Rosenb., Reist. naar Geelwinkb, p. 7 (1875) (descr. nulla).

cari), Passim (*Meyer*), Sorong (*Bernstein, Bruijn*) — in Nova Hollandia, ad caput York (*Mus. Aug. Taurin.*); ins. Gould, prope sinum Rockingham (*G. R. (Gray)*) Specim. 16.

21. **Glyciphila nisoria** (S. Müll.). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 335 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*S. Müller*). Specim. 0.

22. **Conopophila albigularis** (Gould), P. Z. S. 1842, p. 137.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea, Lobo (*S. Müller*), ad flumen Fly (*D'Albertis*), Naiabui (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Stone*); ins. Aru (*von Rosenberg*). Specim. 6.

23. **Glycichaera fallax**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 335 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Andai (*Bruijn*), ad flumen Fly (*D'Albertis*), Naiabui (*D'Albertis*), ad flumen Goldie (*Goldie*); ins. Aru (*Beccari*) Specim. 5.

24. **Glycichaera poliocephala**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 335 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Andai, Hatam (*D'Albertis*). Specim. 2.

25. **Oedistoma pygmaeum**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 952 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari, Bruijn*) Specim. 2.

26. **Melilestes megarhynchus** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1875, p. 174 ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Ins. Aru (*Wallace, Beccari*); Nova Guinea, ad flumen Fly (*D'Albertis*), Warbusi (*Beccari*), Dorei (*Wallace*), Andai, Rubi, Nappan, Passim (*Meyer*); Salvatti (*Bruijn*); Waigiou (*Wallace, Bernstein, Bruijn*) Specim. 15.

27. **Melilestes novae guineae** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, p. 677 (1828).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (*Lesson, Meyer, Beccari*), Andai (*Bruijn*), Monte Arfak (*Bruijn Beccari*), Wa Samson (*Beccari*), Lobo

⁽¹⁾ *Arachnothera vagans*, Bernst., Journ. f. Orn. 1864, p. 405.

Ptilotis rostrata, Wall., P. Z. S. 1865, p. 478.

(*S. Müller*); Waigiou (*Wallace, Bernstein*); Salvatti (*von Rosenberg*); Mysol (*Wallace*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*) Specim. 17.

28. **Melilestes iliolophus**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 951 (1875).

Hab. in Papuasias — Miosnom (*Beccari*); Jobi (*Beccari*). Specim. 10.

29. **Melilestes affinis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 952 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari, Bruijn*); Sorong (*Bernstein*); Waigiou (*Beccari*) Specim. 4.

30. **Melipotes gymnops**, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 695, pl. 56.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Hatam (*D'Albertis, Meyer, Beccari, Bruijn*) Specim. 67.

31. **Melidectes torquatus**, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 694, pl. 55.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*D'Albertis, Meyer, Beccari*) Specim. 5

32. **Melirrhophetes leucostephes**, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 110 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*), Karons (*Laglaize*) Specim. 12.

33. **Melirrhophetes ochromelas**, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 111 (1874).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Meyer, Beccari, Bruijn*), Karons (*Laglaize*) Specim. 7.

34. **Meliarchus** ⁽¹⁾ **sclateri** (G. R. Gr.), Ann. and Mag. N. H. 1870, p. 327.

Hab. in Papuasias — Ins. Salomonis (*Sclater*), ins. S.^{ti} Christophori (*Brenchley*), Makira (*Richards*) Specim. 0.

35. **Stigmatops ocularis** (Gould), P. Z. S. 1837, p. 154.

Hab. in Nova Hollandia (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea (*Bonaparte*); Ins. Aru (*Wallace*) — Timor (*Bonaparte, Wallace*); Lomboek (*Wallace, Mus. Brit.*) Specim. 0.

(¹) Genus novum *Meliarchus* ad genus *Melirrhophetes* proxime accedit, sed ob genas plumosas et ob gulam carunculis destitutam differt.

36. **Stigmatops albo-auricularis**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 75 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea meridionali-orientali (*Ramsay*).

Specim. 0.

37. **Stigmatops argentaureus** (Finsch), Abh. Naturw. Ver. Brem. II, p. 364 (1870).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea? (*von Rosenberg*); Waigiou (*Bruijn*).

Specim. 1.

38. **Stigmatops chloris**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 337 (1878).

Hab. in Papuasias — Guebeh (*Bernstein*); Mysol (*Hoedt*); in Moluccis — Dammar (*Bernstein*). Specim. 0.

39. **Stigmatops squamata**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 337 (1878).

Hab. in Moluccis — Koor (*von Rosenberg*) Specim. 0.

40. **Ptilotis analogus**, Rehb., Handb. Spec. Orn. *Meropinae*, p. 103, sp. 235, tab. 467, f. 3332 (1 Martii 1852).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, parte occidentali (*Hornum et Jacquinet*), Lobo (*S. Müller*), Ramoi (*Beccari*), Dorei-Hum (*Beccari*), Dorei (*Wallace, Bruijn, Beccari*), Andai (*D'Albertis, Bruijn, Beccari*), Mansema (*Beccari*), Profi (Arfak) (*Beccari*); Waigiou (*Wallace, Bernstein, Bruijn, Beccari*); Batanta (*Beccari, Bruijn*); Salvatti (*Bruijn*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*); Jobi (*Beccari, Bruijn*); Miosnom (*Beccari*); Nova Guinea meridionali, ad Flumen Fly (*D'Albertis*), prope sinum Hall (*D'Albertis*) — Nova Hollandia septentrionali (*Gould, Ramsay*) Specim. 67.

41. **Ptilotis flavirictus**, Salvad., nov. sp. (1).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, ad flumen Fly (*D'Albertis*)

Specim. 1.

42. **Ptilotis albonotata**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 33 (1876).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, prope Naiabui (*D'Albertis*), Ramoi (*Beccari*), Dorei (*von Rosenberg, Bruijn*) Specim. 10.

(1) *Ptilotis P. analogae* similis, sed minor, superne virescentior, inferne flavicantior, macula flava prope rictum laetior et auricularibus albo-flavicantibus sericeis diversa.

43. **Ptilotis montana**, Salvad., nov. sp. (1).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Bruijn*, *Beccari*)

Specim. 5.

44. **Ptilotis versicolor**, Gould, P. Z. S. 1842, p. 136.

Hab. in Nova Hollandia (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea, ad flumen Kataw (*D'Albertis*), ad flumen Laloki, prope portum Moresby (*Ramsay*)

Specim. 1.

45. **Ptilotis sonoroides**, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 428 (2).

Hab. in Papuasias — Waigiou (*Wallace*, *Bernstein*); Batanta (*Bruijn*); Salvatti (*Bernstein*); Mysol (*Wallace*); Sorong (*D'Albertis*); Karanton (*Bruijn*); Nova Guinea, Ramoi (*Beccari*), Dorei Hum (*Beccari*), Dorei (*Bruijn*)

Specim. 14.

46. **Ptilotis germana**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 39 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, ad flumen Laloki, prope Portum Moresby (*Stone*) Specim. 0.

47. **Ptilotis subfrenata**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 948 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari*, *Bruijn*), Karons (*Laglaize*) Specim. 2.

48. **Ptilotis erythropleura**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 949 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari*, *Bruijn*), Karons (*Laglaize*) Specim. 9.

49. **Ptilotis cinerea**, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 693.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*D'Albertis*, *Meyer*, *Beccari*, *Bruijn*) Specim. 8.

50. **Ptilotis ixoides**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 338 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Sorong (*Bernstein*) . . . Specim. 0.

(1) Differt a *P. albonotata* ob remiges intus rufescente marginatis et ob colorem olivaceum alarum saturatiorem.

(2) *Ptilotis striolata*, S. Müll. in Mus. Lugd.

Ptilotis melanophrys, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 693.

51. **Pycnopygius** ⁽¹⁾ **stictocephalus** (Salvad.), Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 34 (1876).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Naiabui (*D'Albertis*), ad flumen Goldie (*Goldie*); Salvatti (*Mus. Lugd., Bernstein*) . . . Specim. 1.

52. **Euthyrhynchus griseigula**, Schleg., Ned. Tijdsch. Dierk. IV, p. 39 (1871) ⁽²⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Sorong (*Bernstein*), Andai (*von Rosenberg, Bruijn*) . . . Specim. 3.

53. **Euthyrhynchus flavigula**, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 40 (1871) ⁽³⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, ad litora occidentalia Sinus Geelwinkiani (*von Rosenberg*), Sorong (*Bernstein*), Ramoi (*Beccari*) Specim. 1.

54. **Euthyrhynchus fulvigula**, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 40 (1871) ⁽⁴⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*Mus. Lugd. Batav.*), Monte Arfak (*Bruijn, Beccari*) . . . Specim. 2.

55. **Xanthotis** (?) **polygramma** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1861, p. 429 ⁽⁵⁾.

Hab. in Papuasias — Waigiou (*Wallace*); Salvatti (*Bernstein*); Mysol (*Wallace*); Nova Guinea, Wa Sanson (*Beccari*), Profi (Arfak) (*Beccari*), Andai (*Meyer*), ad flumen Fly (*D'Albertis*) . . . Specim. 5.

56. **Xanthotis filigera** (Gould), P. Z. S. 1850, p. 278, pl. 34.

Hab. in Nova Hollandia septentrionali (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea, prope Sinum Hall (*D'Albertis*), prope Portum Moresby (*Stone*), ad flumen Fly (*D'Albertis*), Utanata (*S. Müller*); Ins. Aru (*Wallace, Beccari*) . . . Specim. 33.

57. **Xanthotis chrysotis** (Less.), Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 645, pl. 21^{bis} (1826-1828).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Dorei (*Lesson, Wallace, Meyer*,

⁽¹⁾ *Pycnopygius*, Salvad. nov. gen. — Habitus specierum generis *Pycnonoti*; rostro breviusculo, culmine incurvato, alis mediocribus, cauda mediocri, aequali; pedibus parvis; ptilosi laxa, copiosa.

⁽²⁾ *Timeliopsis trachycoma*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 963 (1875).

Nomen *griseigula*, sane ineptum, forsitan non adhibendum est.

⁽³⁾ *Timeliopsis nov. sp.*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 964 (1875).

⁽⁴⁾ *Timeliopsis acutirostris*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 964 (1875).

⁽⁵⁾ *Xanthotis poikilosternus*, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 112 (1874).

Bruijn, Beccari), Andai (*D'Albertis, Beccari, Bruijn*), Mansema (*Beccari, Bruijn*), Monte Arfak (*Bruijn, Beccari*), Wa Samson (*Beccari*), Dorei Hum (*Beccari*), Ramoi (*Beccari*), Sorong (*Bruijn*), Rubi, Passim, Inviorage (*Meyer*);? Mysol (*Wallace*) Specim. 35.

58. **Xanthotis fusciventris**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 947 (1875) (1).

Hab. in Papuasias — Batanta (*Beccari, Bruijn*); Waigiou (*Wallace*)
Specim. 3.

59. **Xanthotis meyeri**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 947 (1875) (2).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer, Beccari, Bruijn*) . . . Specim. 4.

60. **Melithograis gilolensis** (Temm.). — (Bp.), Consp. I, p. 390 (1850) (3).

Hab. in Moluccis — Halmahera (*Bonaparte, Wallace, Bernstein, Meyer, Beccari*); Batcian (*Wallace*) Specim. 5.

61. **Philemonopsis meyeri** (Salvad.), Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 339 (1878) (4).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Rubi (*Meyer*), Mambriok (*Bruijn*), ad flumen Fly (*D'Albertis*) Specim. 9.

62. **Philemon moluccensis** (Gm.), S. N. I, p. 465, n. 21 (1788).

Hab. in Moluccis — Buru (*Commerson, Wallace, Bruijn*). Specim. 5.

63. **Philemon plumigenis** (G. R. Gr.), P. Z. S. 1858, p. 174.

Hab. in Papuasias — Ins. Kei (*Wallace, Beccari*) . . . Specim. 5.

64. **Philemon fuscicapillus** (Wall.), Ibis, 1862, p. 351.

Hab. in Moluccis — Morty (*Wallace*); Halmahera; Batcian (*Finsch, G. R. Gray*) Specim. 0.

(1) *Xanthotis X. chrysotidi* (Less.) simillima, sed corpore subtus minime rufescente, gula purius cinerea, pectore toto viridi-olivaceo et abdomine griseo-fusco diversa.

(2) *Ptilotis pyrrhotis*, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 206. (1874) (nec Less., Rev. Zool. 1840, p. 271).

(3) *Anthochaera senex*, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 439.

Melithograis striata, Sund., Meth. nat. av. disp. tent. p. 50 (1872).

(4) *Tropidorhynchus inornatus*, Meyer (nec G. R. Gr.), Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 212 (1874).

Novum genus *Philemonopsis* a genere *Philemone* praesertim ob nares lineares, elongatas et a membrana obtectas differt.

65. **Philemon albitorques**, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 553.

Hab. in Papuasias — Ins. Admiralitatis (*Challenger*) . . . Specim. 0.

66. **Philemon subcorniculatus** (Hombr. et Jacq.), Ann. Sc. Nat. 1841, p. 314.

Hab. in Moluccis — Ceram (*Hombron et Jacquinet*) . . . Specim. 0.

67. **Philemon cockerelli**, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 104.

Hab. in Papuasias — Nova Britannia (*Brown*) . . . Specim. 0.

68. **Philemon jobiensis** (Meyer), Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 113 (1874).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer, Beccari*) . . . Specim. 1.

69. **Tropidorhynchus novae guineae**, S. Müller, Verh. Land.-en Volkenk. p. 153 (1839-1844) ⁽¹⁾.

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, parte occidentali (*S. Müller*), Tangion Bair (*D'Albertis*), Sorong (*D'Albertis, Bruijn*), Dorei Hum (*Beccari*), Has (*Beccari*), Amberbaki (*D'Albertis*), Dorei (*Wallace, Meyer, Bruijn, Beccari*), Mansinam (*Bruijn, Beccari*), Mansema (*Beccari*), Rubi, Inviorage, Passim, Waweji (*Meyer*), Nirba, Ajomesowar (*Bruijn*), ad flumen Fly (*D'Albertis*), prope sinum Hall (*D'Albertis, Bruijn*); Waigiou (*Wallace, Bruijn*); Bantanta (*Beccari, Bruijn*); Salvatti (*Bruijn*); Koffiao (*Beccari*); Mysol (*Wallace*); ins. Aru (*Wallace, Beccari*) . . . Specim. 95.

70. **Melithreptus albigularis**, Gould, P. Z. S. 1847, p. 220.

Hab. in Nova Hollandia orientali et septentrionali (*Gould*); in Papuasias — Nova Guinea, prope Portum Moresby (*Stone*) . . . Specim. 0.

71. **Zosterops fusca**, Bernst., Journ. f. Orn. 1864, p. 406 ⁽²⁾.

Hab. in Papuasias — Waigiou (*Bernstein*) . . . Specim. 0.

72. **Zosterops atriceps**, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 350.

Hab. in Moluccis — Bateian (*Wallace*) . . . Specim. 0.

73. **Zosterops fuscifrons**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 339 (1878).

Hab. in Moluccis — Halmahera, prope Galela (*Bernstein*) . . . Specim. 0.

⁽¹⁾ *Tropidorhynchus mitratus*, part. S. Müll. — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 158, n. 34 (1857).

Tropidorhynchus marginatus, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 429 (junior).

⁽²⁾ Species non satis cognita.

74. **Zosterops mysorensis**, Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 116 (1874).

Hab. in Papuasias — Mysori (*Meyer, Beccari*). Specim. 5.

75. **Zosterops hypoleuca**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 340 (1873).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea (*Franck*) Specim. 0.

76. **Zosterops grayi**, Wall., P. Z. S. 1863, p. 494.

Hab. in Papuasias — Ins. Kei (*Wallace, Beccari*); Ins. Aru (*von Rosenberg*) ⁽¹⁾ Specim. 6.

77. **Zosterops albiventris**, Rchb., Handb. Spec. Orn. *Meropinae*, p. 92, sp. 195, t. 461, f. 3298 (1 Martii 1852).

Hab. in Papuasias — Ins. Warrior, prope litus meridionale Novae Guineae (*Hombroon et Jacquinet*) ⁽²⁾. Specim. 0.

78. **Zosterops novae guineae**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 341, sp. 27 (1878).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Montibus Arfak (*Beccari, Bruijn*) Specim. 8.

79. **Zosterops aureigula**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 340, sp. 26 (1878).

Hab. in Papuasias — Jobi (*Meyer*) Specim. 0.

80. **Zosterops chrysolaema**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 954, sp. 41 (1875).

Hab. in Papuasias — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari*). Specim. 6.

81. **Zosterops frontalis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 342, sp. 29 (1878).

Hab. in Papuasias — Ins. Aru (*von Rosenberg*). Specim. 0.

82. **Zosterops intermedia**, Wall., P. Z. S. 1863, p. 486.

Hab. in Celebes, prope Macassar (*Wallace*); Lomboek (*Wallace*); in Moluccis — Ternate (*G. R. Gray, Beccari*) Specim. 5.

⁽¹⁾ Insulae Aru mihi videntur locus forsan erratus.

⁽²⁾ Species non satis cognita.

83. **Zosterops chloris**, S. Müller. — Bp., Consp. I, p. 398 (1850).
Hab. in Moluccis — Banda (*S. Müller, von Rosenberg, Challenger*)
 Specim. 0.
84. **Zosterops buruensis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII,
 p. 341, sp. 28 (1878).
Hab. in Moluccis — Buru (*Wallace*). Specim. 0.
85. **Zosterops griseotincta**, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 175.
Hab. in Papuasia — Ins. Ludovicianis (*Macgillivray*) . . . Specim. 0.
86. **Zosterops longirostris**, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.
 III, p. 288, sp. 134 (1879).
Hab. in Papuasia — Ins. Heath (*Broadbent*) Specim. 0.
87. **Zosterops fuscicapilla**, Salvad., Ann. Mus. Civ. VII, p. 355,
 sp. 42 (1875).
Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak (*Beccari, Bruijn*)
 Specim. 3.
88. **Zosterops brunneicauda**, Salvad., MS. (1).
Hab. in Moluccis — Ceram-laut (*Beccari*); Koor (*von Rosenberg*); in
 Papuasia — Pulo Babi (*Beccari*) Specim. 2.
89. **Zosterops uropygialis**, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI,
 p. 78 (1874).
Hab. in Papuasia — Ins. Kei (*Beccari, von Rosenberg*) . . . Specim. 1.

Scripsi Augustae Taurinorum, die vigesimasexta Aug. MDCCCLXXX.

(1) *Zosterops rufifrons*, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 79 (1874).

Nomen *rufifrons* erratum, quia speciminis typici frons, ob id tantum, rufescens
 apparet quod sanguine sordidata.



Salvadori, Tommaso. 1880. "Prodromus Ornithologiae Papuasiae et Moluccarum. IX. Menuridae - Certhiidae - Nectariniidae - Dicaeidae - Meliphagidae." *Annali del Museo civico di storia naturale di Genova* 16, 62–82.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/94436>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/143950>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.