

Sartène je visiterai successivement Zonza et Bavella, Sainte-Marie de Talanne, Zicavo, le Coscione, puis, autour de Sartène, le Monte Rosso, Campo Moro et les bords du Rizzanèse.

Enfin, rentrant à Ajaccio, je repartirai pour Vico, Cargèse, Calanpas et Evisa; ce sera la fin de mon voyage. Il ne me restera plus alors qu'à rentrer en France après avoir visité à peu près toute la Corse, sauf le Cap Corse et les régions de Bonifacio, Porto-Vecchio et une partie de la côte orientale.

Vous voyez, cher Monsieur Malinvaud, que mon correspondant et ami m'a préparé un programme sérieux, et que ce ne sera pas de sa faute si je reviens les mains vides.

M. Gagnepain fait à la Société la communication suivante :

ESPÈCES RARES OU NOUVELLES POUR LA NIÈVRE, PLANTES VASCULAIRES ET CHAMPIGNONS (4^e Note) (1); par **M. F. GAGNEPAIN** (2).

* *Ranunculus fœniculaceus* var. *pseudocircinatus* Arv.-Touvet.
— Mares, à Forêt, Arthonne, près Nancy.

R. aconitifolius L. — Bords de l'Yonne entre Épiry et Montreuillon.

Roripa anceps DC. — Entre La Charité et la Chapelle-Montlinard (Cher).

Obs. — Siliques plus longues que dans les descriptions des auteurs.

× *Roripa terrestris* Tausch = *R. amphibia* × *Nasturtium silvestre*. — Bords de la Nièvre, près du moulin de la Celle.

Obs. — Comparable en tout aux échantillons de Cercy dont l'observation des pollens fait conclure à l'hybridité.

Parnassia palustris L. — Prés du Nohain à Suilly-la-Tour, dans le calcaire!

× *Lychnis vespertina* × *diurna*. — Montreuillon, en quittant le bourg pour se diriger vers la station d'Épiry.

(1) Voy. le Bulletin, t. XLII, 1895, p. 598; t. XLIII (1896), p. 449; t. XLV, 1898, p. 129.

(2) Le signe * indique une espèce nouvelle pour le département.

Obs. — A quelques mètres de la mère, à quelques décimètres du père. Conforme aux échantillons de nos cultures expérimentales.

Dianthus Armeria L. — Épiry.

Stellaria nemorum L. — Ruisseau du Péroux, à Frasnay, près Aunay.

Polygala calcarea Schultz. — Sauvry, Semelins, Rompois, près Saint-Benin-d'Azy, C.

Geranium pyrenaicum L. — Aunay-en-Bazois.

Androsæmum officinale All. — Point culminant de la route entre Montreuillon et la station d'Épiry.

Impatiens Noli-tangere L. — Bords de l'Yonne, à Montreuillon.

* *Sarothamnus scoparius* var. *alba* Gagnep. — Bois-de-Raveau, près La Charité-sur-Loire, RR.

Obs. — Se distingue du vulgaire Genêt à balais par son port plus bas, sa verdure jaunâtre, ses fleurs d'un blanc pur, son fruit longuement soyeux. Un seul individu parmi des milliers d'autres. La rareté qui lui est attribuée n'est point sujette à caution, à cause de l'éclat de ses fleurs qui tranchent et le distinguent de loin à l'époque de la floraison.

Ononis Natrix L. — Côte des Semelins, près Saint-Benin-d'Azy; Suilly-la-Tour.

× *Medicago varia* Martyn (ex Rouy) = *M. falcata* × *sativa*. — Pont Sert-à-rien, près La Charité, à quelques décimètres de la mère, à 50 mètres des luzernières. — Plante robuste comme le père, rampante comme la mère, fruits souvent avortés, les autres ayant de $1\frac{1}{2}$ à 2 tours de spire. La proportion des pollens fertiles sur les stériles est voisine de $\frac{16}{118}$ ou $\frac{4}{7}$.

Trifolium elegans Savi. — Épiry, Montreuillon, C.

Vicia Cracca var. *albiflora*. — Épiry.

Rosa dumosa Pug. — Chalet entre Saint-Benin-d'Azy et Billy.

R. rubiginosa L. — Chasnay.

R. platyphylla Rau. — Chasnay.

R. obtusifolia Desv. — Chasnay.

R. collina Jacq. — Chasnay.

Epilobium palustre L. — Marais de la Sourde, près Champvoux.

Circæa intermedia Ehrh. — Entre les Grands moulins et Montreuillon, bords de l'Yonne.

Sedum Carioni Bor. — Aqueduc de la Robine de Montreuillon, sur l'Yonne.

Turgenia latifolia Hoffm. — Côte du Rompois, à Billy-Chevannes.

Peucedanum Cervaria Lap. — Sauvry, près Saint-Benin-d'Azy.

P. parisiense DC. — Bois de Sainte-Colombe.

Sison Amomum L. — Segoule, près Billy-Chevannes.

Libanotis montana Cr. — Suilly-la-Tour.

Valerianella Morisonii DC. — Champagne de Champvoux.

Doronicum austriacum Jacq. — Bords de l'Yonne entre Épiry et Montreuillon.

Senecio adonidifolius Lois. — Montreuillon.

Centrophyllum lanatum DC. — Champagne de Champvoux.

Carduncellus mitissimus DC. — Suilly-la-Tour.

Lysimachia nemorum L. — Ruisseau du Perroux, près Aunay-en-Bazois; bords de l'Yonne, près Montreuillon.

× *Primula officinalis* × *elatior* = *P. media* Peterm. — Egreuil, près Aunay-en-Bazois.

Gentiana germanica Vill. — Sauvry, les Semelins, près Saint-Benin-d'Azy.

Solanum nigrum var. *miniatum* Bernh. — Champ de foire de La Charité-sur-Loire, dans le département du Cher, avec *S. villosum* var. *humile* Bernh.

× *Linaria vulgaris* × *striata*. — Entre les parents dans un champ, près de Souris, commune de Champvoux.

Obs. — Hybride à rechercher partout où la présence fréquente des parents au même lieu rend possible la fécondation croisée.

Veronica montana L. — Ruisseau du Perroux, près Aunay-en-Bazois; côte de Segoule, près Saint-Benin-d'Azy.

V. persica Poir. — Saint-Benin-d'Azy.

Mentha candicans Crantz. — Bords de l'Yonne à Montreuillon.

Stachys alpina L. — Côte de Rompois, à Billy-Chevannes.

Lamium incisum Willd. — Épiry.

× *Galeopsis Gilloti* Gagnep.

× *G. Wirtgeni* Ludw. — Ensemble, parmi les parents, aux Rapys, devant la maison forestière, près Raveau.

Obs. — C'est, avec la localité de Cercy, l'une des rares localités françaises connues de ces hybrides (1). Elle nous a permis de compléter notre étude de leurs pollens qui ne sont pas toujours bien constitués, ainsi que nous l'avions avancé : 39 bons sur 59 avortés !

Teucrium Scordium L. — Entre Suilly-la-Tour et Saint-Quentin, dans les prés de la rive gauche du Nohain.

Scutellaria minor var. *umbrosa* Gagn. — Bois humides des Bertins, près Narcy.

Obs. — Variation stationnelle de la Scutellaire mineure dont la tige devient élancée, même rampante et dont les feuilles acquièrent des dimensions presque égales à celles de *S. galericulata*.

Polygonum Bistorta L. — Usines, vers Épiry. Plante amenée par l'Yonne hors de ses stations normales et ne donnant plus que des feuilles radicales très développées.

P. amphibium L. — Présente des variations étonnantes dues aux stations différentes : 1° la forme aquatique à feuilles flottantes très glabres, à graines avortant presque toujours par exubérance de l'appareil végétatif ; 2° la variété terrestre très différente d'aspect, ordinairement veloutée ; à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), il nous a été donné de voir une variation à tiges et gaines couvertes de poils durs et serrés, qui envahissant aussi les feuilles, communiquaient à la plante entière un aspect grisâtre. La plante croissait à une exposition torride dans un endiguement de la Loire, et il est certain qu'il y a quelques années c'était la forme aquatique. A Chandoux, commune de Sainte-Colombe, dans des prés marécageux, lits d'anciens étangs, nous avons reconnu la même espèce devenue terrestre et densément velue *glanduleuse*. Il y a une trentaine d'années, alors que les étangs étaient pleins, c'était indubitablement le type aquatique *glabrissime* avec les caractères qu'on lui connaît et qui sont invariables dans cette station. Conclusions : ces variations

(1) Voy. Gagnepain, *Sur les hybrides des Galeopsis dubia et angustifolia* observés à Cercy-la-Tour (Bull. Asscc. fr. bot., 1899, p. 43).

et d'autres analogues sont biologiquement intéressantes et il semble que les herborisants doivent les reconnaître, les décrire, les nommer, partout où ils les rencontrent et dans quelque plante que ce soit. Mais la connaissance de ces variations d'une même plante devrait mettre en garde contre la tendance qu'ont certains botanistes de multiplier les espèces à l'infini en les basant sur des caractères mobiles. Un des principaux buts de la botanique systématique doit être la hiérarchie des entités s'appuyant sur une notion précise et générale des caractères distinctifs.

Quercus pubescens Willd. — Sauvry, les Semelins, près Saint-Benin-d'Azy.

Populus Tremula L. — Bois de Raveau, près La Charité. Variété des stations marécageuses, naine, à jeunes rameaux et feuilles très velus, à pubescence durable.

Paris quadrifolia L. — Ruisseau du Perroux, près Aunay-en-Bazois; bords de l'Yonne, au-dessus des Grands moulins d'Épiry.

Scilla bifolia L. — Ruisseau du Perroux, entre Aunay et Pous-sinol-Blisme.

Aceras anthropophora R. Br. — Sauvry, les Semelins, près Saint-Benin-d'Azy.

Orchis conopea L. — Sauvry, les Semelins, près Saint-Benin-d'Azy.

Epipactis ensifolia Sw. — Le Chalet, près Saint-Benin-d'Azy.

Potamogeton fluitans Roth. — Moulin de Sainte-Colombe.

P. trichoides Cham. et Sch. — Même station et à Forêt, près Narcy.

P. acutifolius Link. — La Sourde, près Champvoux.

Carex laevigata Sm. — Ruisseau du Perroux, près Aunay; bords de l'Yonne, près Montreuillon.

C. Halleriana Asso. — Suilly-la-Tour, Azy, près Saint-Benin.

C. Pseudo-Cyperus L. — Fontaine de Saint-Vincent, près Raveau.

C. brizoides L. — Entre les Grands moulins et Montreuillon, bords de l'Yonne, rive gauche.

C. canescens L. — Egrevil, près Aunay.

Carex pulicaris L. — Fontaine-Rouge, près Raveau.

Scirpus pauciflorus Lightf. — Prés de Sainte-Colombe et Chandoux; de Jeanlard, près Narcy, RR.

Gaudinia fragilis P. B. — Bois de Billy-Chevannes.

* *Molinia cærulea* var. *albiflora* Gagn. — Épi pâle et non violacé. Variation parallèle à *Mibora verna* var. *albiflora* et, comme elle, très rare. Chandoux, près Sainte-Colombe.

Aspidium spinulosum Sw. — Entre Sauvry et Azy, près Saint-Benin.

Equisetum Telmateia Ehrh. — Haut fourneau de Chandoux, près Sainte-Colombe.

Bien que notre attention fût surtout portée sur les espèces vasculaires, les CHAMPIGNONS SUPÉRIEURS, dont l'organisation est si intéressante et l'étude si pratique, ont retenu nos regards à l'occasion lorsque la chaleur de l'été avait détruit les fleurs ou que l'automne répandait à profusion les formes si intéressantes aux couleurs variées de nos *Basidiomycètes*. Ces indications préalables étaient nécessaires pour expliquer la brièveté de la liste qui va suivre et les nombreuses lacunes qu'elle comporte.

CLAVARIACÉS.

Clavaria mucida Pers. — Sur les vieux troncs, au milieu des Mousses et même sur le sol frais des bois, C.

C. falcata Pers. — Bois, à Cercy-la-Tour. — Octobre 1897.

C. canaliculata Fr. — Tronc de Pin renversé. — 17 novembre 1898.

C. pistillaris L. — Bois des Bertins, près Narcy. — Septembre 1897.

C. fragilis Holmsk var. *gracilior* Fr. — Bois calcaire de Sainte-Marie, près Châteauneuf-Val-de-Bargis. — Septembre 1897.

C. inæqualis Fl. dan. — Massue souvent digitée. Bois, à Cercy. — Octobre 1897.

C. aurea Schæff. — Bois de Raveau.

C. Botrys Pers. — Sur le sol dans les futaies, C. — Comestible, mais peu recherché. Vulgairement *Barbe-de-chèvre*, appellation qu'il partage avec l'espèce suivante.

Clavaria flava Schæff. — CCC. dans les bois.

Craterellus cornucopioides Pers. — Bois; en touffes et en lignes.
Bertins et Cercy. — Septembre-octobre.

HYDNACÉS.

Phlebia merismoides Fr. — Bois, sur des branches mortes, R.

Sistotrema confluens Pers. — Bois de la Coulongette, près Cercy.
— Octobre 1897, RR.

Hydnum repandum L. — CCC. Comestible. Vulgairement *Mouton*.

POLYPORÉS.

Dædalea quercina Pers. — Sur les souches tronquées des Chênes dans les futaies, AR.

Polyporus sulfureus Bull. — Sur des Peupliers noirs, à Cercy. — 13 octobre 1898; sur le *Robinia Pseudo-Acacia*, à La Chapelle-Montlinard (Cher). — 12 septembre 1899.

P. lucidus Leyss. — Champignon très remarquable par son chapeau zoné en sabot, son long pédicule de 6 centimètres, le tout d'un rouge-acajou brun luisant très uniforme. Pérennant, Saint-Gratien-Savigny, dans une haie. — 18 octobre 1898.

P. picipes Fr. — Très conforme à la description de la Flore de Otto Wunsche, traduction de Lanessan. Au pied d'un Saule. — Octobre 1899.

P. squamosus Huds. — Sur un vieux tronc. Champignon large de 25 centimètres. Vulgairement *Oreille d'orme*. Garchizy. Juillet 1887.

Fistulina hepatica Fr. — Sur une souche pourrie de Chêne, Bois-de-Raveau, RR.

Boletus aurantiacus Bull. — CCC. sur les routes forestières, en septembre-octobre.

B. fuligineo-cinereus Fl. dan. — Bois-de-Raveau. — 17 septembre 1898, R.

B. edulis Bull. — Sentiers des bois. Chapeau plus ou moins

bronzé ou pâle. Pied plus large que le chapeau dans le jeune âge. Cercy, AC. — Novembre 1898.

Boletus æreus Bull. — Chapeau plus ou moins noir ou bronzé. Sentiers des bois, en général endroits battus. CC. aux environs de Raveau, où on l'appelle « Gros pied » et où on le consomme après avoir enlevé la couche des tubes. Délicat.

B. spadiceus Schæff. — Bois-de-Raveau.

B. chrysenteron Fr. — Bois-de-Raveau. — 15 septembre 1898.

B. badius Fr. — Coulougette, route de Verneuil, près Cercy. Sous les Pins. — Octobre 1898-1899.

B. luteus L. — Chapeau gluant, visqueux; chair blanc crème, devenant violacée au contact; collerette diaphane adhérente au chapeau dans la jeunesse et se détachant par lambeaux. Coulougette, près Cercy. — Octobre 1898-1899.

B. elegans Schum. — Sous les Pins et Sapins, près Cercy. — 20 octobre 1898.

AGARICINÉS.

Schizophyllum commune Fr. — Sur les troncs morts, à la porte des sabotiers, charrons, CC.

Marasmius Rotula Fr. — Bois-de-Raveau, AR.

M. alliaceus Fr. — Même localité. Très abondant sur les feuilles mortes, le lendemain d'une averse.

M. oreades Bolt. — Bois, sur le sol, parmi les feuilles. Cercy, 24 septembre; Thaix, 10 novembre 1898, CC.

Nyctalis parasitica Fr. — CC. dans les endroits frais des bois certaines années chaudes et humides en automne (septembre), toujours sur *Russula adusta* pourrissant.

Cantharellus aurantiacus Wulf. — Champlevois, près Cercy. — 6 novembre 1898.

C. cibarius Fr. — CC. en septembre, parfois en juillet et août dans les bois. Vulgairement *girole*, *girole*. Comestible, mais peu délicat, lourd à digérer.

Russula nauseosa Pers. — Bois; Coulougette, près Cercy. — 3 novembre 1898.

R. lutea Huds. — Bois. — Coulougette, même date.

Russula integra L. — Cercy.

R. emetica Fr. — Bois de Pins, à Cercy. — 17 novembre 1898.

R. cyanoxantha Schæff. — Bois : Raveau, Cercy. — C. en septembre-octobre.

R. rubra DC. — Coulongette et Champlevois, près Cercy, sous les Pins. — 20 octobre 1897, 3 novembre 1898, CC.

Obs. — Suivant la station plus ou moins ombreuse, la couleur passe du violet au vermillon. Lames d'un jaune pâle! arrière-goût très âcre! Peut-être une variété à nommer.

R. lepida Fr. — Sentiers des bois, endroits battus. CC. à Raveau et connu sous le nom de « Biguette rouge »; mangé par quelques personnes.

R. virescens Schæff. — Même station, moins abondante. Vulgairement « Biguette bleue ». Comestible et très délicate!!

Obs. — A Cercy, sous les arbres verts du parc des Brunettes, nous avons recueilli une variété à bords moins enroulés, plus infundibuliforme, à couleur moins franchement verte. Comestible et très délicate!!

R. delica Fr. — Sous les Pins de Couëron, près Thaix. — Octobre 1899.

R. adusta Pers. — Bois de Chênes; Raveau, Murlin, etc. — C. en automne.

Lactarius serifulvus DC. — Cercy.

L. volemus Fr. — Se reconnaît à son chapeau large, *infundibuliforme*, un peu *duveté* au centre, son pied gros et court. Vulgairement *Prévâ*, se mange cuit sur les charbons, assaisonné d'un peu de beurre ou de crème!! L'arrière-goût poivré qui persiste rend la digestion facile! — CC. sous les bois, en juillet-septembre.

L. quietus Fr. — Bois du Croux, près Cercy. — 20 octobre 1898.

L. piperatus Scop. — Bois, succède à *L. volemus* dont il se distingue par ses dimensions moindres, son bord enroulé rarement vertical, son suc laiteux très âcre, l'absence de villosités sur le chapeau. Se mange de même!! Moins bon! Vulgairement « Poivrier, Poivrier ».

L. plumbeus Bull. — Bois-de-Raveau, Murlin, Cercy. — PC. septembre-octobre. — Goût à la fois poivré! et amer! sur le

cru. Vénéneux? En tout cas, sa couleur repoussante ne saurait causer de méprises fatales.

Lactarius pubescens Fr. — Murlin; Raveau; Cercy; Thaix; dans les bois ou dans le gazon avoisinant les lisières, C.

L. deliciosus L. — Sous les Pins. Cercy; Verneuil, etc. — 3 novembre 1898. — Répand un suc orangé qui lui a fait donner le surnom de *Sang-du-Christ*. Comestible, excellent!

Hygrocybe psittacina Schæff. — Prairie de la Coulongette, près Cercy. — 24 octobre 1898.

Limacium eburneum Bull. — Bois, dans la feuille. Chapeau très blanc, visqueux. — Cercy, octobre et novembre 1898.

Paxillus involutus Batsch. — Sous les Pins, à Champlevois et aux Brunettes, près Cercy. — 17 novembre 1898 et 24 octobre 1899.

Gomphidius glutinosus Schæff. — Sous les Pins, à Cercy. — 17 novembre 1898.

Dermocybe raphanoides Pers. — Champlevois, près Cercy, fin septembre.

Inoloma cinereo-violaceum Pers. — Coulongette, près Cercy. — 3 novembre 1898.

Coprinus comatus Fl. dan. — Bords des fossés, pied des murs. — Cercy, 5 novembre 1897 et octobre 1898-1899.

Hypholoma velutinum Pers. — Bois de la Coulongette, près Cercy. — 24 octobre 1898.

H. fasciculare Huds. — Palissade, pieux. — Cercy, octobre 1897.

H. sublateritium Schæff. — Près d'une vieille souche. — Cercy, 24 octobre 1898.

Psalliota hæmatosperma Bull. — Sous les Sapins, aux Brunettes, près Cercy. — 24 octobre 1899.

P. campestris L. — Prés, CCC. — Septembre-octobre, jusqu'aux gelées.

P. silvicola Vitt. — Sentiers herbeux de bois, CC. N'est peut-être qu'une variété du précédent. On les confond souvent sous le nom de « Champignon de rosée ».

P. arvensis Schæffer. — Dans les haies, les landes, CC. Comes-

tible, mais peu délicat! à cause d'un arrière-goût un peu nauséux.

Galera Hypnorum Batsch. — Sur des Mousses, près Cercy. — 6 octobre 1898.

Flammula sapinea Fr. — Sous les Sapins, à Couëron, près Thaix. — 10 novembre 1898.

Hebeloma crustuliniforme Bull. — Bois de la Coulougette, près Cercy. — 24 octobre 1898.

H. sinapizans Fr. — Sous les Pins, à Cercy. — 17 novembre 1898.

Clitopilus Orcella Bull. — Bois-de-Raveau, C.; Cercy, C. — Octobre 1897-1898. — Un peu visqueux par les temps humides. Très délicat!! Demande à être cueilli, pour la table, avant le ramollissement du pied.

Collybia stolonifera Jungh. — Parmi les aiguilles d'arbres verts. — Septembre 1894.

C. esculenta Wulf. — Sables de Loire, à Saint-Hilaire-Fontaine. — 16 avril 1898.

C. radicata Relh. — Bois, près d'une vieille souche, à Cercy. — 3 novembre 1898.

C. longipes Bull. — Bois de Pins de Couëron, près Thaix. — 10 novembre 1898.

C. gilva Pers. — Même station et même localité.

C. squamulosa Pers. — Souvent sur des bois pourris, au bord de l'eau. Cercy, bords de la Loire. — En été.

C. maxima Fl. Wett. — Dans les haies. Bois-de-Raveau, Saint-Gratien. — 24 octobre 1897.

C. phyllophila Fr. — Cercy, sur des feuilles pourrissantes, sous-bois.

C. nebularis Batsch. — Sous les Pins, à Cercy. — 17 novembre 1898.

Tricholoma melaleucum Pers. — Bois, fossés; Cercy. — Octobre 1897.

T. chrysenterum Bull. — Bois sur le bord d'un fossé. Bois-de-Raveau. — Septembre 1892. — Chapeau vert jaunâtre finement veiné de brun; chair peu épaisse, blanc verdâtre;

lames verdâtre pâle; pied fibreux de la couleur des lames surtout vers le haut, RRR.

Tricholoma sulfureum Bull. — Sous les Pins! A Cercy. — Octobre 1899.

T. irinum Fr. — Sous les Pins, à Cercy. — Octobre 1899.

T. albellum F. — Sur l'humus d'un Verne creux. Forêt, près Chasnay. — 21 septembre 1898.

T. terreum Schæff. — Gazon des bois ou du bord des routes. — Cercy, 3 novembre 1898, CC.

Armillaria mellea Fl. Dan. — Bois et haies. — Cercy, 3 novembre 1898, CC.

Lepiota cristata Alb. et Sch. — Sous les arbres verts. — Cercy, 17 novembre 1898. — Espèce qui diffère du type par sa petitesse; mais ne peut être rapportée à un autre.

L. clypeolaria Bull. — Sous les arbres verts, aux Roses, près Cercy. — 6 novembre 1897.

L. excoriata Schæff. — Moissons après la récolte; prés secs, Cercy (10 octobre 1898), Raveau, etc., AC. — Comestible, aussi — délicate que l'espèce suivante!

L. procera Scop. — Sentiers herbeux et routes des bois. — Septembre-octobre, CC. — Comestible et délicate, surtout rôtie sur les charbons! Vulgairement *Commerelle*. — Une variété remarquable, de grandes dimensions, jusqu'à 15 centimètres de haut et de large, se distingue aussi par ses squames très larges et envahissant même le mamelon. Sous les Pins, Couëron, près Thaix. — Octobre 1898-1899.

Amanita vaginata Bull. — Les bois, C.

A. rubescens Fr. — Sous les arbres verts et ailleurs, Cercy (6 novembre 1898), Raveau, etc., AC.

A. muscaria L. — Taillis, bois, CCC. en automne. Vulgairement « Châo Bidault ». — Une femme de Raveau, qui vit encore, ayant mangé de ce Champignon, fut en proie à une sorte de délire qui dura trois jours.

A. Mappa Fr. — Bois sur la mousse; Chasnay, Raveau, Cercy, Thaix (10 novembre 1898), C. — Odeur vireuse, qui rappelle celle des tiges de Pomme de terre écrasées.

A. phalloides Fr. — Bois, Chasnay. — Septembre 1897, PC.

La variété *A. Junquilla* Quélet, sous des Sapins, à Cercy. — Octobre 1899.

A. cæsarea Scop. — Talus des routes forestières, toujours au sec et généralement à l'exposition chaude. C. certaines années chaudes et humides. Si l'automne est froid et humide, le Champignon ne se développe pas ou il est envahi par des Moisissures qui le tuent. Vulgairement « Oronge, Châo ». Une des espèces les plus délicates ! se diminuant le moins à la cuisson.

GASTÉROMYCÈTES.

Tulostoma mammosum Fr. — Gazons secs, AC. — Cercy, Raveau, etc.

Phallus impudicus L. — Bois : Raveau, Fours, Saint-Honoré, etc., PC.

Odeur infecte qui attire les insectes amateurs de viande pourrie. Le bétail qui pâit dans les bois, à cette odeur, brame lamentablement.

Nidularia farcta Fr. — Sur les brindilles pourrissantes : Raveau, Cercy, PC., parce que difficile à apercevoir.

ASCOMYCÈTES.

Helvella lacunosa Afzl. — Gazons des routes, au voisinage des bois. — Cercy, 6 novembre 1898, PC.

Morchella esculenta Pers. — Sols légers : Raveau, R.

Mitrula paludosa Fr. — Sur les feuilles pourrissant dans les fossés d'eau vive : Donjon, près Cercy ; Saint-Honoré-les-Bains. — 9 juin 1898.

UN NOUVEAU STAPHYLEA DU JAPON (*STAPHYLEA FRANCHETI* sp. nova);
par M. H. de BOISSIEU.

L'échantillon sur lequel nous avons établi notre espèce fait partie de la belle collection de M. l'abbé Faurie, acquise par le Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Depuis longtemps, on connaissait au Japon un *Staphylea* décrit par Thunberg (*Fl. Jap.*, p. 8) sous le nom de *Bumalda trifolia*, et reporté par De Candolle (*Prodrome*, II, 2) dans le genre *Sta-*



Gagnepain, F. 1900. "Espèces Rares Ou Nouvelles Pour La Nièvre, Plantes Vasculaires Et Champignons (4 e Note)." *Bulletin de la Société botanique de France* 47, 209–221. <https://doi.org/10.1080/00378941.1900.10828912>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8669>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1900.10828912>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/157899>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.